This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

HARVARD
UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED · BY ·
CHARLES · SPRAGUE · SARGENT
1872

JP

LE

BOTANISTE

CULTIVATEUR.

LE BOTANISTE CULTIVATEUR,

OU

DESCRIPTION, Culture et Usages de la plus grande partie des plantes étrangères, naturalisées et indigènes, cultivées en France et en Angleterre, rangées suivant la méthode de JUSSIEU;

PAR DUMONT-COURSET,

Des Sociétés d'Agriculture et des Arts, de Boulogne-sur-mer, de Paris et d'Amiens; de celle d'Émulation, d'Abbeville; ci-devant Membre de diverses Académies, Correspondant de l'Académie des Sciences, et de la Société de Médecine, de Paris.

TOME QUATRIÈME.

A PARIS,
CHEZ J. J. FUCHS, RUE DES MATHURINS.
AN X. 1802.

K

Rc
44
089

LE BOTANISTE CULTIVATEUR.

PLANTES

DONT LA PLACE EST INCERTAINE.

I. Fleurs monopétales. Ovaire supérieur.

Pénée. *Penæa.*

Cal. à 2 fol. opp., bractéiformes, caduques. Cor. une fois plus longue et plus large, camp. ou infund., à limbe 4-fide et court. 4 étam. insérées sur la corolle, alternes avec ses div. Anthères droites. 1 ovaire sup. 1 style filiforme ou à 4 angles membraneux. Stigmate en tête ou à 4 lobes. Caps. à 4 loges, 4 valves à cloison, 2-spermes, sans axe central.

1 Pénée mucronée. *P. mucronata.*

Feuilles opp. en croix, sessiles, cordiformes, acuminées, embriquées sur 4 rangs. Fleurs terminales, sessiles.

Lieu. *Le Cap.* ♄ fl....

2 P. écailleuse. *P. squamosa.*

Feuilles rhomboïdales, cunéiformes, charnues, en forme d'écailles.

Lieu. *Id.* ♄ fl....

Cult. Orangerie. Ces plantes ont des rapports avec les acanthes.

II. Fleurs monopétales. Ovaire inférieur.

Nigrine. *Chloranthus.*

Cal. presque sup. à 1 dent, à limbe entier non sensible à la vue, à 1 bractée à sa base. Un pétale très-petit, d'un côté posé sur l'ovaire, de l'autre sur la dent cal., en forme d'écaille, concave, à 3 lobes, dont celui du milieu porte 2 étam., et les autres une. 4 anthères sessiles, à 2 valves et adnées au pétale. Ovaire presque inférieur. Style nul. Stigm. en tête. Petite baie sèche, ovale, monosperme, terminée par les vestiges du pétale et de la dent cal.

* Nigrine à feuilles de thé. *C. inconspicuus.*

Petit arbuste traçant, en forme de buisson arrondi, d'un pied. Tiges foibles, les unes couchées, les autres droites, nombreuses et rameuses; les rameaux opposés et noueux. Feuilles opp., dont les pétioles naissent d'une gaîne vaginale et amplexicaule, ovales, pointues, dentées, assez fermes, glabres, et d'un beau vert. Fleurs jaunes, petites, avec une bractée, en panicules term., composées de petits épis sessiles.

Lieu. *La Chine.* ♄ fl. une partie de l'année. Toujours vert.

Cult. Serre chaude—tannée. Cette plante aime une terre substantielle et légère. Le terreau de bruyère lui convient parfaitement. Arrosemens fréquens en été, rares en hiver. Mult. par ses drageons ou rejettons, au printems. Quand on arrache ses rejettons, il ne faut pas séparer le pied et le mettre à nu; on courroit risque de tout perdre, mais enlever ceux qui sont enracinés à l'entour, et les mettre chacun dans un petit pot plongé dans la tannée. On le propage aussi très-aisément de marcottes.

Us. Quoique les fleurs de ce petit arbuste soient très-petites, néanmoins leur nombre et leur couleur ne laissent pas que de faire de l'effet en se peignant sur un beau feuillage.

Cette plante a des rapports avec les rubiacées et le guy.

III. Fleurs polypétales. Ovaire supérieur.

Azime. *Azima*. *Monetia*. L'Héritier.

Cal: ventru, camp., à 3 ou 4 div. 4 pétales linéaires, un peu réfléchis, et alternes avec les div. calicinales. 4 étam. insérées sur le réceptacle, épaissies à leur sommet, alternes avec les pétales. Anthères sagittées et courbées. Ovaire sup. finissant en style court. 1 stigm. pointu. Caps. presque charnue, pisiforme, à une loge et 2 sem. orbiculaires, une souvent avortée.

Azime à 4 épines. *A. tetracantha*. La Marck. *Monetia barlerioides*. L'Héritier, H. K.

Arbuste de 2 à 3 pieds. Ecorce crevassée. Branches tortueuses et courtes, divisées en beaucoup de rameaux qui forment un buisson arrondi. Ceux-ci sont tétragones. Feuilles opp., ovales-lancéolées, entières, terminées par une pointe épineuse, glabres, coriaces, imitant celles du myrte. 2 épines à chaque aisselle formant, avec celles des feuilles, une croix à chaque nœud. Fleurs verdâtres, sessiles, ax., sol., très-petites.

Lieu. *Les Indes or.* ♄ fl. en juillet. Toujours vert.

Cult. Serre chaude—tannée. Terre consistante. Arrosemens fréquens. Mult. par les marcottes et par boutures. Toutes deux s'enracinent aisément. Ces dernières se font à la manière indiquée pour les plantes délicates.

Us. Cet arbuste varie les serres par sa verdure persistante.

Sucepin. *Monotropa*.

Cal. à 4 à 5 fol. colorées. 4 à 5 pétales id., disposées en cylindre. 8 à 10 étam. insérées sur le pistil. 1 style. 1 stigm. Caps. à 4 à 5 sillons, 4 à 5 loges et 4 à 5 valves polyspermes. Sem. nombreuses.

Sucepin multiflore. *M. hypopithis*.

Plante parasite non cultivée, qui croît sous les grands arbres, en touffe, d'une couleur jaunâtre. Ses feuilles sont des espèces d'écailles. Ses fleurs sont disposées en espèce d'épi terminal.

Cette plante a beaucoup de rapports avec l'orobanche, autre plante parasite; mais leurs caractères sont tout-à-fait différens.

Lieu.... Ind. fl. en été.

Dionée. *Dionuea.*

Cal. à 5 fol., persistant. 5 pétales. 10 étam. Anthères obrondes. 1 ovaire sup. 1 style. 1 stigmate ouvert et frangé. Caps. à une loge et plusieurs semences très-petites, fixées au fond de la capsule.

Dionée attrape-mouche. *D. muscipula.*

Plante basse, dont les feuilles disposées en rond sur la terre, sont pét., arrondies, échancrées, à 2 lobes demi-ovales, ciliées en leurs bords, chargées en-dessus de petites glandes rouges, et de 3 ou 4 pointes entre ces glandes, longues de 2 pouces, glabres et succulentes. Leur pétiole est élargi et ailé. Hampe nue, grêle, de 6 à 7 pouces, terminée par 5 à 7 fleurs blanches, en corymbe.

Lieu. *Les lieux humides de la Caroline.* ♃ fl. en juillet et août.

Cult. Serre tempérée. Cette plante est très-difficile à conserver. Je l'ai vue cultivée en Angleterre dans un pot plongé dans une terrine remplie d'eau.

Elle est plus curieuse qu'agréable à la vue. Ses feuilles sont si irritables, que lorsqu'un insecte vient à se reposer sur leur surface supérieure, elles se ferment aussitôt en approchant leurs lobes, croisent les cils de leurs bords, et enferment ainsi l'insecte qui se trouve d'ailleurs retenu par les pointes qui sont entre leurs glandes.

Cette plante a des rapports avec les rossolis.

Euclé. *Euclea.*

Dioïque. Cal. très-petit, à 5 dents. 5 pétales. Fl. mâle. 15 étam. courtes. Fem. 1 ovaire. 2 styles. 4 stigm. dentés. Baie à 2 loges 2-spermes.

Euclé à grappes. *E. racemosa.*

Arbrisseau de 5 à 6 pieds, rameux, glabre. Feuilles alt., ov.-oblongues, obtuses, entières, approchant de celles de l'olivier. Leurs pétioles très-courts, Fleurs en grappes ax. et pendantes.

Lieu. *Le Cap.* ♄ fl. en nov. et déc.

Cult. Orangerie.

Maqui. *Aristotelia.*

Cal. turbiné, couvert intérieurement d'un disque plus large, à limbe 5 à 6-fide. 5 à 6 pétales insérés sur le disque en-dehors. 15 à 18 étam. id., à filamens courts. Anthères oblongues, droites. Très-petit ovaire sup. 3 styles. 3 stigm. Baie pisiforme à 3 loges et à 1 ou 2 sem. convexes d'un côté, anguleuses de l'autre. Embrion plane, dans un périsperme charnu.

* Maqui du Chili. *A. macqui.*

Arbrisseau dont la tige est droite, rameuse et rougeâtre, ainsi que les rameaux dans leur jeunesse. Ceux-ci sont opposés. Feuilles opp., pét., ovales, pointues, légèrement dentées en scie, très-glabres, luisantes et d'un beau vert. Stipules caduques. Fleurs petites, blanches, un peu pendantes, en petites grappes ax. Baies d'un rouge foncé.

Lieu. *Le Chili.* ♄ fl. en avril—juin.

Cult. Orangerie dans le nord de la France. Pleine terre dans son milieu. Cet arbrisseau ne supporte pas sans dommage nos hivers rigoureux. Comme il pousse vers la fin de l'hiver, il doit être placé dans la serre le plus près des jours qu'il est possible, pour qu'il ne s'étiole pas. On le multiplie de marcottes et de bou-

tures. Celles-ci doivent être faites dans le tems qu'il entre en végétation.

Ce genre a des rapports d'une part avec les tilleuls et les cistes, de l'autre avec les nerpruns, les acomats et les blackvalles.

Sarracénie. *Sarracenia.*

Cal. double. L'ext. à 3 fol. petites. L'int. grand, à 5 fol. colorées. Tous deux caducs. 5 pétales hypogyns, grands et obronds. Etam. nombreuses, hypogynes. 1 ovaire. 1 style court, en forme de pédicule. Stigm. très-large, plane et pelté, à 5 angles couvrant les étam. et persistant. Caps. obronde, à 5 loges et à sem. très-petites. Ce genre approche des nénuphars.

1 Sarracénie jaune. *S. flava.*

5 à 7 feuilles radicales de 3 pieds de long, concaves, étroites à leur sommet, en forme de tube ou de capuchon, ayant un large bord qui parcourt toute la longueur du tube, et à la partie arrondie de la feuille un grand appendice droit et d'une couleur brune. Hampe nue, d'un pied de long, soutenant une grande fleur verte.

Lieu. *L'Amérique mérid.* ♃ fl. en juin et juillet.

2 S. pourpre. *S. purpurea.*

Feuilles de 5 à 6 pouces, élargies et renflées. Fleur pourpre en-dehors, verte en-dedans.

Lieu. *Id.* ♃ fl. id.

Cult. Pleine terre ou orangerie. Ces plantes sont très-singulières, mais très-difficiles à cultiver et à conserver dans les jardins, parce qu'elles sont marécageuses et craignent en même-tems le froid. Aussi sont-elles encore rares. Selon Miller, on les obtient difficilement de semences; et quand on les a obtenues, il faut les mettre dans des pots proportionnés à leur force, qu'on rentre sous des chassis en hiver, et qu'on met dans des jattes remplies continuellement d'eau. Leur terre doit être celle des marais, ou de bruyère.

IV. Fleurs polypétales. Ovaire inférieur.

Bégone. *Begonia.*

Monoïque. Cal. à 2 parties, supérieur, coloré. 2 à 6 pétales plus étroits. Fl. mâle. 2 pétales, rarement 3 à 6, alternes avec le calice. Etam. nombreuses, à filamens courts, réunis à leur base. Anthères droites, oblongues. Fem. 3 pétales, rarement 2 à 4, placés au sommet du calice ou du pistil, et inégaux. Ovaire inf., à angles saillans. 3 styles, souvent bifides. 6 stigm. Caps. inf., à 3 angles et 3 loges, à semences très-petites, fixées sur le réceptacle central à 3 parties. 3 valves carenées, à ailes membraneuses, dont une beaucoup plus grande que les autres.

*1 Bégone à feuilles luisantes. *B. obliqua.* L'Héritier. *B. nitida.* H. K.

Plante frutescente qui s'élève à 5 à 6 pieds, glabre sur toutes ses parties. Tiges nombreuses, cylindriques, jaunâtres, tendres. Feuilles alt., pét., échancrées en cœur à leur base, pointues, légèrement dentées ou ondulées en leurs bords, très-obliques; le pétiole est situé vers le tiers de la longueur de la feuille, de manière que celle-ci a une direction verticale; un peu épaisses, charnues, succulentes, d'un vert terne en-dessus, pâles en-dessous, où elles sont souvent rougeâtres en leurs bords. Fleurs d'un rose pâle, de moyenne grandeur, disposées au sommet des tiges en panicules dichotomes. 2 stipules assez grandes accompagnent chaque pétiole à sa base.

Lieu. *La Jamaïque.* ♄ fl. en mai—déc. Toujours vert.

*2 B. velue. *B. hirsuta.*

Tiges droites, succulentes, rougeâtres, rameuses, légèrement velues, de 2 pieds. Feuilles alternes, pét., en cœur à leur base, aussi obliques que celles de la 1re. espèce, pointues, dentées ou crénelées; les crénelures dentées, ciliées et presqu'épineuses en leurs bords, velues sur les deux surfaces. Fleurs blanches, disposées en panicules comme celles de la précédente. Plante dioïque. Les fleurs mâles à 4 pétales; les femelles à 5.

Lieu. *La Guyane, l'Amérique mérid.* ♄ fl. en automne.

3 B. à feuilles rudes. *B. humilis.* H. K.

Cette espèce ne diffère de l'espèce velue que parce qu'elle est monoïque, et que ses capsules n'ont qu'une aile.

Lieu. *Id.* ☉ fl. id.

4 B. à grandes feuilles. *B. macrophylla.* La Marck, H. P.

Tiges droites, cylind., glabres, rougeâtres, noueuses, cassantes. Feuilles de la grandeur de celles du *tussilago petasites*, auriculées, charnues, vertes et glabres en-dessus, blanchâtres en-dessous. Fleurs disposées en corymbe rameux et terminal. Les fleurs mâles à 4 pétales; les femelles à 5.

Lieu. *La Martinique.* ♄.

Cult. Serre chaude—tannée. La 1re. espèce aime la chaleur et craint l'humidité. Sa terre doit être consistante. Elle ne pousse que très-peu de racines, et beaucoup en tiges et en feuilles; elle tient en cela des plantes grasses. On ne doit la dépoter que lorsqu'elle en a absolument besoin, c'est-à-dire quand ses racines tapissent les parois du vase. Les nouveaux pots ne doivent avoir que la grandeur nécessaire pour pouvoir faire passer la terre entre la motte et leurs parois. De plus grands la feroient languir et périr ensuite. On la multiplie par ses rejettons enracinés et par les boutures. Tous deux s'enlèvent ou se coupent dans le cours de l'été. On les met dans de petits pots un peu plus longs que larges, remplis de bonne terre, et qu'on plonge dans une couche d'une bonne chaleur sous chassis; ou dans la tannée de serre chaude. Si ce sont des boutures, il faut les abriter. Ces nouveaux plants ne tardent pas à pousser, et peuvent rester pendant un an au moins dans les mêmes pots.

Les deux espèces suivantes doivent être cultivées de même. On les multiplie aussi par les boutures. La 4e. est aussi de serre chaude.

Us. La 1re. est une jolie plante lorsqu'elle est en fleur. La couleur rose de ses panicules, et leur succession pendant 6 mois au moins, jettent une agréable diversité dans les tannées.

V. Fleurs apétales, hermaphrodites. Ovaire supérieur.

Fustet. Redoul. *Coriaria.*

Cal. à 5 parties. Cor. o. 10 étam. insérées sur le disque ou sur le pistil. Anthères oblongues, droites, à loges séparées à leur base. 5 ovaires réunis. 5 styles saillans. 5 stigm. 5 petites glandes entre les ovaires. 5 caps. conniventes, petites, monospermes, ne s'ouvrant pas, couvertes de côté par les glandes agrandies. Embrion sans périsperme. La radicule droite et montante.

* Fustet des corroyeurs. Redoul à feuilles de myrte. *C. myrtifolia.*

Arbrisseau en forme de buisson élargi, fourni de beaucoup de tiges quadrangulaires, dont les rameaux sont de même et opposés. Feuilles nombreuses, garnissant toute la longueur des rameaux et des tiges, opposées, sessiles, ovales-oblongues, pointues, entières, à 3 nervures, glabres et d'un vert léger. Fleurs petites, axillaires, solitaires ou géminées, en grappes term., accompagnées de bractées. Quelquefois cette plante est monoïque ou dioïque.

Lieu. *La Fr. mérid.* ♄ fl. en mai—août.

Cult. Pleine terre. Le redoul est un peu délicat dans nos pays septentrionaux. Cependant il n'y redoute que les grands froids; et pour peu qu'on ait soin de couvrir son pied dans cette circonstance, on le conserve aisément. Il se plaît dans les bonnes terres franches, et les situations abritées des vents d'est qui leur sont préjudiciables. Mult. par ses drageons et rejettons qu'il donne abondamment, et qu'on enlève en mars pour les planter à demeure.

Us. Cet arbuste forme des buissons assez remarquables par leur feuillage. On peut en garnir les dessous des arbres qui donnent peu d'ombrage. Dans son pays naturel, il est employé à tanner

les cuirs comme l'espèce 1re. des sumacs, et comme nous faisons de l'écorce de chêne dans les pays septentrionaux.

Les feuilles et sur-tout les baies du redoul sont un poison mortel pour les hommes.

Anavinga.

Cal. à 5 part. Cor. o. 8 à 10 étam. Autant d'écailles velues, plus courtes et situées entr'elles. 1 ovaire sup. 1 style. stigm. en tête. Capsule acuminée par le style, coriace, presque trigone, à une loge, et à 3 valves séminifères, polysperme et pulpeuse intérieurement.

On cultive depuis peu de tems une espèce de ce genre au Jardin national, où elle a été apportée par le capitaine Baudin. Elle est de l'Amérique méridionale et de serre chaude.

Samyda.

Cal. 1-phylle, tubuleux, campanulé, à 10 stries, coloré intérieurement, à limbe inégal et 5-fide. Cor. o. 10 à 18 étam., dont les filamens connés forment une couronne insérée au milieu du calice, à 10 à 18 stries, et bordé de 10 à 18 dents anthérifères. Ovaire sup. 1 style. 1 stigm. Capsule coriace, à 1 loge polysperme et 4 à 5 valves séminifères. Les semences entourées d'une pulpe, avec un petit enfoncement à leur base.

1 Samyda pubescent. *S. pubescens.* Lin.
Feuilles ovales, tomenteuses en-dessous.

2 S. en arbre. *S. arborea.* Richard.

3 S. à feuilles d'annone. *S. annonæfolia.* Juss.
Ces trois espèces sont récemment cultivées au Jardin national. Elles y ont été apportées par le capitaine Baudin. Elles sont de l'Amérique méridionale et de serre chaude.

Obs. Selon l'observation que Jussieu fait dans le caractère de ce genre, il paroîtroit que la 1re. espèce que cite Linné, ne doit

pas être de ce genre, parce qu'il dit qu'il n'y a dans les espèces de ce dernier auteur que le *samyda serrulata* qui lui convienne.

VI. Fleurs apétales, dioïques. Ovaire supérieur.

Baquois. *Pandanus.*

Dioïque. Cal. o. Cor. o. Fl. mâle. Thyrse très-rameux. Chaque pédicule terminé par une anthère oblongue et fendue dans sa longueur. Fem. Ovaires nombreux, sessiles, anguleux, rétrécis à leur base, réunis en tête, à chacun 2 stigm. sans style. Autant de fruits que d'ovaires, anguleux, en coin, monospermes, rassemblés, et formant un grand fruit globuleux ou ovale.

Baquois odorant. *P. odoratissimus.*

Aspect de l'ananas. Feuilles lin., pointues, bordées de cils épineux, en faisceau, et d'un vert clair. Tige nue, écailleuse, qui se divise en 2 ou 3 rameaux insérés au même point, de 8 à 9 pieds de haut. Chaque rameau se termine par un faisceau de feuilles, du centre desquelles naissent les fleurs. Les mâles ont une odeur si agréable et si expansive, qu'il ne faut qu'un ou deux chatons pour parfumer longtems un appartement.

Lieu. *Les Indes or., les îles de la mer du Sud.* ♄ fl....

Cult. Serre chaude—tannée. Cette plante est très-rare en Europe. Elle est cultivée au Jardin national de Paris et à Kew en Angleterre. On l'obtient de graines tirées de son pays originaire. Quand on les a reçues, il faut les semer aussitôt, et les conduire comme les plantes très-délicates de serre chaude—tannée. La culture des ananas doit lui convenir, mais elle exige une chaleur plus constante. Lorsqu'elle sera plus répandue, on pourra peut-être la multiplier à la manière des ananas.

Quoique les individus cultivés à Paris soient forts, ils n'ont point encore fleuri.

VII. Fleurs id. Ovaire inférieur.

Cannabine. *Datisca.*

Dioïque. Fl. mâle. Cal. à 5 part. égales. Cor. o. Plusieurs anthères sessiles et saillantes. Fem. Cal. sup. à 2 ou 3 dents. Cor. o. Ovaire inf. saillant entre les dents cal. 3 styles bifides. 6 stigm. Capsule oblongue, trigone, à 3 cornes à son sommet, à une loge polysperme. Semences menues.

* Cannabine glabre. *D. cannabina.*

Aspect du chanvre. Tiges de 6 pieds, droites, glabres, en haut buisson. Feuilles alt., ailées, avec une impaire, à 9 à 11 fol. lancéolées, aigues, dentées; la terminale souvent incisée. Fleurs petites, jaunes, au sommet des tiges, en grappes ax. et terminales.

Lieu. *L'île de Candie.* ♆ fl. en juillet—sept.

Cult. Pleine terre. Tout terrein et toute exposition. Plante très-rustique. Mult par la séparation de ses pieds en automne ou au printems.

Us. La cannabine est d'un beau port, et se distingue dans les grands parterres. Elle est fort amère.

Fin des genres de Jussieu.

APPENDICE.

APPENDICE.

Genres de plantes qui ne sont pas dans Jussieu.

Gingo. *Ginkgo.*

Selon Kempfer, fleurs unisexuelles.

* Gingo du Japon. *G. biloba.*

Grand arbre du port d'un noyer. Ecorce grise, celle des rameaux lisse, jaunâtre. Ceux-ci sont très-ouverts. Feuilles alt. et fasciculées, pét., cunéiformes; le bord sup. arrondi, inégalement crénelé; avec une grande échancrure qui les partage en 2 lobes; glabres, veinées, sans nervure. Fruit ax., péd., sol., en forme de noix ovale, jaunâtre. Cette noix est couverte d'un brou charnu; sa coque est ligneuse et mince. Elle renferme une amande blanche, bonne à manger.

Lieu. *Le Japon, la Chine.* ♄.

Selon La Marck, cet arbre est de la famille des pistachiers.

Cult. Pleine terre. Le gingo aime les terres franches, douces, et d'un bon fonds; il aime aussi la chaleur, et souvent nos hivers détruisent une partie de ses jeunes pousses qui n'ont pu s'aoûter, sa végétation durant jusqu'en automne. Mult. par les marcottes et les boutures. Celles-ci faites en février ou en mars, soit en pot plongé dans une couche de chaleur modérée et abritée, soit en pleine terre à l'ombre, s'enracinent assez facilement. Mais pour être plus sûr de leur reprise, il faut les faire avec le bois de deux ans. Le nouveau étant trop spongieux, les marcottes sont souvent 2 à 3 ans avant de s'enraciner.

Us. Cet arbre n'est remarquable que par la forme singulière de

ses feuilles. Il n'a pas encore fleuri en France. Il étoit si cher dans les premières années qu'on l'a cultivé, qu'on le nommoit l'arbre aux 40 écus, parce qu'on le vendoit ce prix-là. Il est peu de jardins de plantes étrangères où l'on ne le cultive par curiosité.

Pollichia. H. K. Monandrie, 1-gynie. Lin.

Cal. 1-phylle, presque campanulé, à 5 dents. Cor. o. Un seul filament filiforme, de la longueur du calice. Anthère obronde, didyme. Ovaire sup. ovale. Style filiforme. Stigm. bifide. 1 sem. enfermée dans le fond du calice épaissi, et attachée au milieu des écailles du réceptacle. Ces écailles sont obrondes, succulentes, chacune soutenant la fleur dans son milieu, devenant ensuite charnues, oblongues, droites, conniventes, imitant une baie lobée, et ouverte à son sommet.

Pollichia campestris. Neckeria campestris. Gmelin.

Tiges cylindriques, pubescentes, rameuses. Feuilles verticillées, dirigées vers le côté, linéaires, lanc., aigues, très-entières et glabres. Plusieurs stipules membraneuses, persistantes, inégales. Fleurs sessiles, ramassées en tête, situées dans les aisselles de 3 à 4 feuilles.

Lieu. *Le Cap.* ♂ fl. en sept.

Cult. Orangerie.

Curtisia. H. K. 4-andrie, 1-gynie. Lin.

Cal. 1-phylle, à 4 part. ovales, aigues. 4 pétales ovales, obtus, sessiles, plus longs que le calice. 4 étam. insérées sur le réceptacle, subulées, plus courtes que les pétales. Anthères ovales. Ovaire sup. Style subulé. Stigm. 4 à 5-fide. Fruit sec, presque globuleux et glabre. Noix obronde, osseuse, à 4 à 5 loges. Noyau solitaire, oblong.

Curtisia faginea. Relhamia faginea. Gmelin.

Feuilles imitant celles du hêtre, acuminées, dentées, opp.,

pét., entières à leur base, glabres en-dessus, pubescentes en-dessous; les jeunes rameaux aussi pubescens. Fleurs en panicule terminale. Fruit jaune.

Lieu. *Le Cap.* ♄.

Cult. Orangerie.

Ardisia. H. K. 5-andrie, 1-gynie. Lin., Gmelin, Wildenow.

Cal. à 5 fol. oblongues, persistantes. Cor. monopétale; le tube très-court; le limbe à 5 parties alongées, ouvertes et réfléchies. 5 étam. insérées sur le tube, subulées, très-courtes. Anthères grandes, lancéolées, droites. Ovaire sup. globuleux. Style filiforme. Stigm. simple. Fruit sec, globuleux, à 1 seule semence.

Ardisia excelsa. Anguillaria Bahamensis. Gœrtn.

Feuilles presqu'ovales, dentées en scie, à bords cartilagineux. Fleurs en grappes axillaires, simples. Les feuilles imitent celles du laurier.

Lieu. *Madère.* ♄.

Cult. Orangerie.

Plocama. H. K. 5-andrie, 1-gynie. Schreb, Wildenow.

Cal. 1-phylle, très-petit, à 5 dents, persistant. Cor. monopétale, camp., à 5 part. oblongues. 5 étam. insérées sur le tube. Anthères linéaires. Ovaire inf. globuleux. Style filiforme, presqu'en massue. Stigm. simple, obtus. Baie presque globuleuse, à 3 loges. Semences sol., linéaires, oblongues.

Plocama pendula. H. K.

Lieu. *Les îles Canaries.* ♄.

Cult. Orangerie.

Lopezia. 1-andrie, 1-gynie.

Caractère essentiel. Cal. sup. à 4 fol. 5 pétales inégaux. 1 étam. Caps. globuleuse, à 4 loges polyspermes.

Lopézie à grappes. *L. racemosa.* Cav.

Cette plante a le port et l'aspect de la circée. Ses tiges sont rougeâtres et garnies de feuilles alt., pét., ovales, légèrement ondulées en leurs bords, pointues. Ses fleurs sont d'un rouge pâle, en grappes axillaires. Elles sont composées de 5 pétales linéaires, dont deux sont orbiculaires à leur sommet; d'un calice à 4 folioles; d'un nectaire blanc, qui entoure les parties de la fructification, et qui est sensible; d'une étamine avec une anthère, et d'un pistil avec un stigmate velu. Caps. ronde, à 4 loges, 4 valves. Semences menues, attachées aux valves.

Lieu. *L'Amérique.* ☉ fl. en nov. et déc.

Cult. Pleine terre. Cette plante se sème sur couche, et on la plante ensuite dans une terre substantielle, à l'exposition méridienne, où elle fructifie.

Cylista. H. K. Diadelphie, décandrie. Gmelin.

Cal. 1-phylle, très-grand, persistant, à 4 div.; les supérieures réfléchies et bifides à leur sommet; les autres droites, oblongues, aigues. Cor. papillonacée, persistante; l'étendard oblong, échancré, avec 1 lobe de chaque côté à sa base; les ailes oblongues, obtuses, plus courtes que l'étendard, avec une appendice de chaque côté de leur base; la carène oblongue, fendue à son sommet et à sa base, plus longue que les ailes. Etamines diadelphiques, montantes. Anthères obrondes. Ovaire sup. ovale, comprimé. Style subulé. Stigm. presqu'en tête. Légume ovale, obl., comprimé, à 1 loge. Semences ovales.

Cylista villosa. H. K.

Lieu.... ♄ fl. en avril et mai.

Cult. Serre chaude.

Smithia. H. K. Diadelphie, décandrie.

Cal. 1-phylle, à 2 lèvres; les div. ovales-lancéolées, presqu'égales. Corolle papillonacée; l'étendard presqu'en cœur; les ailes obl., un peu plus courtes que l'étendard; la carène linéaire, longue, fendue à sa base, de la longueur des ailes. 10 étam. réunies en 2 faisceaux égaux. Anthères oblongues. Ovaire resserré par la base du calice. Style capillaire, persistant. Stigm. simple. Légume renfermé dans le calice, à 6 à 7 articulations distinctes, orbiculaires, hérissées, contenant chacune 1 semence réniforme, comprimée et glabre.

Smithia sensitiva. H. K.

Tige cylindrique, glabre, couchée; les rameaux très-ouverts. Feuilles alt., ailées, sans impaire, à 4 à 10 fol. ovales-oblongues, garnies de poils sétacés en leurs bords. Stipules géminées, persistantes. Fleurs jaunes, en grappes axillaires, composées de 3 à 6 fleurs. Calice hérissé de tubercules avec des poils sétacés.

Lieu. *Les Indes or.* ☉ fl. en octobre.

Cult. Serre chaude.

Mollavi. *Heritiera.* Monœcie, monadelphie.

Monoïque. Fl. mâle. Cal. 1-phylle, camp., à 5 dents. Cor. 0. Un filament colomniforme, conique, subulé, situé au centre du calice, et entouré sous son sommet de 5 à 10 anthères petites, réunies en cylindre. Fl. fem. Cal. id. Cor. 0. Point de filament. 10 anthères didymes, peut-être stériles, insérées sur le réceptacle, au nombre de 2 entre chaque ovaire. 5 ovaires comprimés et glabres. Styles coniques, courts, réunis à leur sommet. Stigmates en massue. Fruits secs, ovales, planes en-dessus, ailés et carenés, uniloculaires. Semences sol., presque globuleuses, très-grandes.

Mollavi des Indes. *H. littoralis.* H. K. Encycl. *Samandura.* Lin., Fl. zeil., Pluck. et Burm. *Balanopteris tothila.* Gœrtn.

Arbre dont le tronc est gros et les branches rameuses. Feuilles alt., pét., grandes, ovales-oblongues, entières, fermes, épaisses, lisses, d'un beau vert en-dessus, blanchâtres et satinées en-dessous. Fleurs petites, portées sur de courts pédoncules, disposées en panicules axillaires.

Lieu. *Les îles des Indes or.* ♄ Toujours vert.

Cult. Serre chaude.

Litsé. *Litsea.* Dioécie., polyadelphie.

Dioïque. Fl. mâle. Calice à 4 folioles. Cor. o. Etam. nombreuses, à filamens réunis en plusieurs faisceaux velus. Anthères arrondies, didymes. Fem. Cal. id. Cor. o. 5 ovaires et plus., pédiculés, entourés d'étamines courtes, stériles, attachées au pédicule de l'ovaire. Style filiforme. Stigm. obtus. 3 à 5 baies de la forme d'une cerise, pédiculées, pulpeuses, contenant une coque à 1 loge renfermant une amande globuleuse. Ex., La Marck, Encycl.

Litsé de Chine. Faux cerisier de la Chine. *L. Chinensis.*

Arbre élevé, dont les rameaux cylindriques sont garnis de feuilles alt., pét., ovales, un peu obtuses, entières, vertes en-dessus, veinées, réticulées et pâles en-dessous. Fleurs axillaires, péd.; les pédoncules rameux, dichotomes, veloutés.

Lieu. *La Chine.* ♄.

Cult. Serre chaude.

Cet arbre est cultivé au Jardin des plantes de Paris.

Bessi. *Metrosideros.* Banks. Polyandrie, 1-gynie. Gmelin.

Cal. 1-phylle, à 5 dents. Cor. à 5 pétales. Etam. nombreuses, insérées sur le calice. Capsule environnée par le calice sous le réceptacle, à 3 ou 4 loges. Semences, avant leur maturité, nombreuses, linéaires, pailleuses; mûres, en petit nombre, rondes ou anguleuses.

* Bessi à feuilles de diosma. *M. diosmæfolia* ?

Arbrisseau. Tige menue. Ecorce cendrée. Rameaux nombreux, grêles, minces, foibles, un peu pendans. Feuilles nombreuses, garnissant presque toute la longueur des rameaux, opp., presque sessiles, très-étroites, linéaires, subulées, légèrement canaliculées en-dessus, très-entières, vertes, ponctuées, un peu courbées en arc. Fleurs....

Cette espèce a l'aspect, le port et les feuilles du *diosma ericoides*. Il n'a pas encore fleuri dans nos jardins.

Lieu. *La Nouvelle Hollande.* ♄ Toujours vert.

Cult. Orangerie ou serre tempérée. La culture des diosmes lui convient parfaitement, ainsi que celle des mélaleuques. Il reprend de boutures faites dans un pot rempli de bonne terre un peu consistante, et plongé dans une couche ombragée.

Fontainèse. *Fontanesia.* Diandrie, 1-gynie. Lin.

Cal. petit, persistant, à 4 div. obtuses. 2 pétales divisés en deux parties oblongues et concaves. 2 étam. insérées à l'onglet des pétales. Anthères à 2 sillons. 1 ovaire sup. 1 style. 2 stigm. Caps. ovale, comprimée, membraneuse, échancrée, à 2 loges, rarement à 3, et à 3 ailes.

* Fontainèse phylliréoïde. *F. phylliroides.* La Billardière.

Arbrisseau de 12 pieds environ, très-rameux; les rameaux droits et grêles. Feuilles opp., sessiles, ovales-lanc., pointues, très-entières, glabres, ayant beaucoup de rapports à celles d'une variété de filaria. Fleurs petites, peu nombreuses, pédonculées, en grappes axillaires.

Lieu. *La Syrie.* ♄.

Cult. Pleine terre. Cet arbrisseau ne craint pas les grands froids. Il croît assez bien dans la plupart des terreins et à toutes les expositions. On le multiplie facilement de marcottes et de graines semées au printems dans des terrines, ou en pleine terre ou couche sourde à l'exposition du levant. On peut le placer

dans les jardins avec les troënes, les alaternes et les filaria, auxquels il ressemble.

Pittosporum. 5-andrie, 1-gynie.

Cal. caduc, divisé à son sommet en 5 parties réfléchies vers le bas. 5 pétales formant un tube à leur base, ouverts en leur limbe, réfléchis en-dessous. 5 étam. Anthères sagittées Style simple. Stigmate globuleux. Capsule à 2 à 5 valves et à 2 à 5 loges. Semence couverte d'une pulpe.

*1 *Pittosporum undulatum.*

Arbrisseau de 4 à 5 pieds, dont la tige est droite et les rameaux nombreux, disposés ordinairement en verticilles, bruns et glabres. Feuilles alt., éparses, pétiolées, ovales-lancéolées, pointues, ondulées en leurs bords, fermes, d'un vert lisse en-dessus, pâles en-dessous. Elles sont souvent plus rapprochées au sommet des rameaux. Fleurs blanches, disposées en bouquets courts et terminaux, d'une odeur approchant de celle du muguet.

Lieu. *Les îles Canaries.* ♄ fl. en différens tems, souvent deux fois dans l'année. Toujours vert.

2 *P. coriaceum.* H. K.

Feuilles presqu'ovales, obtuses, très-glabres, coriaces. Caps. à 2 valves.

Lieu. *Id.* ♄ Toujours vert.

Cult. Orangerie. Soins ordinaires. Terre consistante, substantielle. Mult. par marcottes, assez longtems à s'enraciner. Les boutures du premier ne m'ont pas réussi.

La première espèce forme un arbuste très-joli. Chaque rameau terminé par un bouquet de fleurs, et ses feuilles d'un beau vert ajoutent à l'ornement des jardins et des serres.

Nolia ?

Arbrisseau grimpant, de la famille des légumineuses.

Tiges grêles, grimpantes, pubescentes. Feuilles alt., pét.,

ailées avec impaire à 5 folioles opp., pét., ovales, elliptiques, très-entières, terminées par une pointe particulière, d'un pouce environ de longueur, tomenteuses sur les deux surfaces, très-douces au toucher. Fleurs très-petites, pédonculées, nombreuses, ramassées en paquets dans les aisselles des feuilles, accompagnées de deux stipules petites et subulées. L'étendard relevé, verdâtre en-dehors, jaune en-dedans, de la longueur des ailes; les ailes jaunes. La carène un peu plus courte que les ailes et verdâtre.

Lieu. *Le Pérou.* ♄.

Cult. Serre tempérée. Cette plante craint le froid. Sa culture n'a rien de particulier. Elle n'est d'ailleurs qu'un objet de curiosité.

Le nom de nolia, sous lequel je l'ai reçue, lui a été donné par les Espagnols.

Planère. *Planera.* Walther.

Monoïque. Cal. à 4 fol. Cor. o. Styles réfléchis. Noix carenée d'un côté, obtuse, écailleuse, à une loge.

* Planère aquatique. *P. aquatica.*

Cet arbrisseau a l'aspect d'un petit orme. Ses rameaux sont menus, d'un brun rougeâtre dans leur jeunesse. Ses feuilles sont alt., pét., ovales, pointues, petites, glabres, dentées en scie. Fleurs....

Lieu. *La Caroline.* ♄.

Cult. Pleine terre ou orangerie, relativement au climat et à la situation. Dans le nord de la France, cette plante est dans sa jeunesse trop sensible au froid pour la mettre en plein air. Ce n'est que lorsqu'elle a pris une tige forte qu'on peut l'y placer, et dans les lieux frais et abrités.

Cadie. *Cadia.* Forskale. 10-andrie, 1-gynie.

Cal. 5-fide. 5 pétales égaux, presqu'en cœur. Légume polysperme.

Cadie à fleurs pourpres. *C. purpurea.* H. K.
Lieu. *L'Arabie.* ♄.

Cult. Serre chaude. Cultivée à Londres.

Selon Jussieu, ce genre a beaucoup de rapports avec celui *prosopis*, avant *hæmathoxylum.* Aiton l'a aussi placé ainsi.

Michauxie. *Michauxia.* 8-andrie, 1-gynie. Gmelin.

Cal. à 16 parties. Cor. en roue, à 8 div. Nectaire à 8 valves staminifères. Caps. à 8 loges polyspermes. *Caractère de l'Héritier.*

Obs. L'Héritier indique le calice à 16 parties; dans la plante que j'ai sous les yeux, il n'en a que 8.

* Michauxie campanuloïde. *M. campanuloides.* L'Héritier.

Tige de 3 à 4 pieds environ, assez droite, ferme, cylindrique, un peu velue, rameuse à son sommet. Feuilles radicales en lyre; les caulinaires semi-amplexicaules, découpées, dentées, ciliées en leurs bords. Fleurs blanches, grandes, pédonculées, ax. et term. Le calice a 8 divisions lancéolées, ciliées, et un peu épineuses sur leurs bords. La corolle est profondément partagée en 8 lanières linéaires, élégamment réfléchies en-dessous. 8 nectaires alternes avec les divisions de la corolle, couverts d'une liqueur mielleuse, larges à leur base, formant par leur rapprochement une espèce de cône, sont terminés par des étamines pétaloïdes, réfléchis en spirale, environnant un style en colonne, long, hispide, et divisé à son sommet en 8 stigmates. Ovaire en anneau à la base du style.

Lieu.... ♃ fl. en juillet.

Cult. Pleine terre. Cette plante se sème sur couche au printems, en plein air, et se repique en pot pour passer à l'abri le premier

hiver, ou dans la place où elle doit rester, dans les climats tempérés. Elle a le port des campanules, et ses fleurs grandes et belles lui donnent un aspect agréable.

Nous pensons qu'elle peut être placée dans l'ordre des lysimachies de Jussieu, auquel elle a plus de rapports qu'à celui des gentianes.

Plante encore inconnue.

Arbre ou arbrisseau qui a le port du cafféyer, et dont les feuilles ont de la ressemblance avec celles du thé vert. Sa tige est droite et brune. Ses rameaux sont longs et horizontaux, et les plus anciens ne sont feuillés que vers leur extrémité comme ceux du cafféyer. Ses feuilles sont opposées, pét., ovales-lancéolées, pointues, bordées de dents peu saillantes et distantes, lisses, luisantes, fermes, remarquables par leurs veines dont les intervalles sont d'un vert foncé.

Cette plante n'a pas encore fleuri en France. On ne sait pas encore le genre auquel elle doit appartenir, ou si elle en forme un nouveau.

Lieu. *La Chine.* ♄ Toujours vert.

Cult. Serre chaude. Cet arbrisseau n'a pas absolument besoin de la tannée; mais il pousse beaucoup mieux dans cette couche, et ne s'y étiole pas. Sa végétation est entièrement semblable à celle du cafféyer. Il vient très-bien dans une terre consistante, substantielle. Son feuillage d'un beau vert et persistant ajoute à la variété de cette serre.

Il pourroit être voisin du genre du citronnier.

Ilicioïdes. N.

Dioïque. Fl. mâle. Cal. à 4 folioles très-petites, concaves. Cor. o. 4 étamines, dont les filamens de la longueur des folioles sont terminés par une anthère à 4 sillons. Les folioles calicinales et les étamines recourbées sur l'ovaire. Ovaire globuleux, dépourvu de style et de stigmate. N.

* Arbrisseau dont la tige est droite, rameuse, d'un brun foncé

dans sa jeunesse. Feuilles alt., pét., ovales, pointues, petites, garnies en leurs bords de petites dents en scie, rares et distantes; molles, vertes sur les deux surfaces. Fleurs très-petites, jaunes, péd., sol., ax. Les pédoncules, jaunes comme les fleurs, sont nus et filiformes.

Lieu. *Le Canada.* ♄ fl. en mars—mai.

Cult. Pleine terre. Très-rustique. Sa végétation est très-lente dans mon jardin.

Cet arbuste a beaucoup de rapports aux houx. C'en est même probablement une espèce.

Xymenia. Cavanilles.

* *Xymenia enceloides.* Cav.

Tiges cylindriques, rameuses, pubescentes. Feuilles alt., assez grandes, ovales, pointues, dentées en scie, d'un vert jaunâtre, portées sur des pétioles amplexicaules, aîlés et courts. Fleurs jaunes, assez grandes, disposées en corymbe terminal.

Cette plante peut être placée dans la 5e. section des corymbifères. Sa fleur a beaucoup de rapports à celle de l'hélénie d'automne.

Cult. Pleine terre. On la sème au printems sur couche, et ensuite on la repique dans la place où elle doit rester tout l'été. Elle est annuelle.

Lygiste. *Lygistum.*

Cal. sup. persistant, 4-fide. Cor. infund., à limbe 4-fide. 4 étam. attachées au tube de la corolle. Anthères oblongues. Ovaire inf. Style filiforme, bifide. Stigmates aigus. Baie presque globuleuse, couronnée, à 2 loges. Semences géminées, ovales-oblongues. *Caractère de La Marck.*

Lygiste à épi. *L. spicatum.* La Marck.

Arbrisseau dont les feuilles sont ovales-oblongues, acuminées. Fleurs en grappe spiciforme et terminale. Corolles velues.

Lieu. *Les Antilles.* ♄.

Cult. Serre chaude. Cultivé au Jardin des Plantes de Paris.

Cette plante me paroît être de l'ordre des rubiacées.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

TOME PREMIER.

Pages 40 et 41. Température.

Aux raisons que j'ai indiquées à l'égard de quelques plantes méridionales qui croissent naturellement dans la Sibérie, il faut y joindre une circonstance essentielle, et qui influe plus que toute autre sur leur conservation ; c'est l'abondance de neige qui tombe vers le commencement de l'automne dans ce pays, et qui couvre tous les végétaux de plusieurs pieds au-dessus d'eux. Aucun abri ne peut remplacer celui que forme ce météore dans ces climats et sur les hautes montagnes ; ne laissant pas le moindre interstice par lequel le froid puisse les pénétrer, il les conserve dans leur état sain, et favorise leur végétation nouvelle jusqu'au moment où le soleil les développe, et les rend au printems enrichis de leurs fleurs.

Page 82. Des terres.

La meilleure terre et celle qui convient le plus généralement aux plantes de serre, est celle des bons champs. Elle doit être argileuse, d'un jaune fauve un peu rougeâtre, très-douce au toucher, et facile à diviser. Les Anglais l'appellent *loam*.

Excepté quelques plantes auxquelles le terreau de bruyère est indispensable, toutes les autres croissent, se fortifient, et se maintiennent dans cette terre franche avec un succès beaucoup plus marqué que dans les compositions factices. On y ajoute seulement un quart ou un tiers de terreau ou de curages depuis quelque tems amoncelés, pour la rendre encore plus substantielle, ou quelques pellées de sable pour la diviser davantage,

selon la nature des plantes qu'on cultive, et d'après la connoissance de leur sol originaire.

Page 114. Des boutures.

Au lieu de planter les boutures des plantes de serre dans des pots pour plonger ceux-ci dans une couche, on peut les enfoncer simplement dans la terre qui couvre la couche sous chassis. De cette manière le succès est beaucoup plus certain. Je n'en ai pas fait mention à cet article, à cause de la difficulté de les enlever en motte sans risquer de les perdre; mais pendant le cours de l'impression de cet ouvrage, il m'est parvenu un déplantoir anglais dont j'ai fait usage, et qui remédie à cet inconvénient.

Cet instrument simple et commode, dont on verra la figure, l'explication et la façon de s'en servir, à la suite de cette partie, enlève non-seulement les boutures et les jeunes plantes de semis avec leur motte entière sans leur nuire, mais il donne encore la facilité de pouvoir les porter sans le moindre accident à de grandes distances.

J'invite les cultivateurs, à l'aide de ce déplantoir, à faire leurs boutures dans la terre de leurs couches sous chassis couvert. Elles reprendront ainsi plus promptement, feront plus de racines, et formeront en automne de bons pieds.

La couche dans laquelle on a intention de les planter, doit être entourée de murs pour les préserver des dégâts des taupes ou des mulots; et pour que le déplantoir fasse plus sûrement son effet, il est nécessaire que la terre soit plus consistante que celle qu'on met ordinairement sur les couches. Deux tiers de bonne terre franche et un tiers de terreau feront un mélange convenable.

Page 126. Greffe en fente.

Autre manière plus prospère de greffer en fente. Voyez-en la figure et l'explication à la suite de cette partie.

Page 203. Définitions. *Ajoutez :*

Ringente (fleur). *Flos ringens.* Fleur en masque, en gueule, ou en casque. *Les mufliers, les aconits, la fraxinelle*, etc.

On le dit aussi de certaines feuilles qui représentent des formes animales. *Ficoides.* N°s 64 et 65.

Sperme. (*Sperma*).	Semence.	
1-sperme.	Monosperme.	1 seule semence.
2-sperme.	Disperme.	2 semences.
3-sperme.	Trisperme.	3 semences.
4-sperme.	Tétrasperme.	4 semences.
Polysperme.		Plusieurs semences.

Testacé. (*Testaceus*). Fruit testacé, de la consistance d'une coquille mince.

Urcéolé. *Voyez* Godet.

Page 276. Abréviations. *Ajoutez :*

3-angl.	Triangulaire.
T. Tourn.	Tournefort.
Vulg.	*Vulgo* ou vulgairement.

Abréviations du tableau.

A.	arbres.
H.	herbes.
L. p. s.	le plus souvent.
Ov.	ovaire.
S. A.	arbrisseaux.
Souv.	souvent.

Page 315. Cycas.

Cycas des Caffres. *C. Caffra.* Thunberg.

Cette espèce moins élevée que les autres, pousse de sa grosse souche 5 ou 6 feuilles longues d'environ 3 pieds, ailées, et dont les folioles opposées et alternes les garnissent dans les trois quarts de leur longueur. Celles-ci sont ovales-alongées, très-pointues, lisses en-dessus, striées en-dessous, et d'un vert foncé. Le pétiole n'a pas d'épines, ce qui distingue particulièrement cette espèce des autres, dont les pétioles sont armés de pointes fort piquantes.

Lieu. *Le Cap.* ♄ Toujours vert.

Même culture que celle des autres cycas.

Cultivé au Jardin national.

Page 329. Gouet trilobé.

Selon Curtis, le spathe et le spadice sont d'un brun rouge, et les feuilles hastées plutôt que lobées.

Page id.

* Gouet à feuilles de balisier. *Arum cannæfolium.* Lin. *Arum bicolor.* Hort. Lond.

Quoique les jardiniers de Londres aient donné ce dernier nom à cette espèce, il n'en est pas moins vrai que ce n'est pas l'*arum bicolor* d'Aiton, H. K., qui à ses feuilles sagittées, et qui est d'ailleurs fort différent. Je crois que l'espèce dont je vais décrire les feuilles seulement, n'ayant pu voir encore la fleur, est l'*arum cannæfolium*, Lin., du moins aucune autre dénomination ne lui est plus convenable.

Ce gouet a le port d'un balisier; ses feuilles sont toutes radicales, engaînées à leur base, pétiolées, lancéolées, très-entières, pointues, longues de deux pieds, larges de cinq pouces, violettes en-dessous, très-vertes le long du milieu de la feuille en-dessus, marquées de grandes taches oblongues, d'un vert pâle entre le vert du milieu et leurs bords. Les gaînes et les pétioles ont beaucoup de petites lignes courtes, transversales, brunes. Ces feuilles ont, comme celles du balisier, des nervures parallèles, mais saillantes en-dessus, au lieu de l'être en-dessous. Cette circonstance sembleroit ne pas convenir à la phrase de Linné, *foliis lanceolatis aveniis*, si l'on traduisoit ce dernier mot, par, sans nervures, ainsi qu'il est dans le Dict. encycl.; mais *aveniis* signifie sans veines. Si Linné avoit voulu dire, sans nervures, il auroit mis dans sa phrase, *enerviis* et non *aveniis*. Il n'y a pas en effet de veines distinctes dans les feuilles, mais bien des nervures.

Selon Linné, la hampe des fleurs de ce gouet est courte, le spathe obtus, rouge en-dehors, blanc en-dedans, même sur son bord. Point de distance entre les étamines et les pistils.

Lieu. *Surinam.* ♄ parasite sur les arbres.

Cult.

Cult. Serre chaude. La même que celle des gouets de cette serre.

Page 333. Draconte à feuilles percées.

Ajoutez *.

Page 345. Souchet.

Ajoutez * au n°. 5. S. comestible.

* N°. 7. S. à feuilles alternes.

Cette espèce pousse de son pied plusieurs tiges d'un pied et demi à deux pieds, très-droites, terminées par une touffe de feuilles longues de 6 à 7 pouces, larges de 4 à 5 lignes, planes, pointues, très-glabres. Ces feuilles sont alternes, mais si proches les unes des autres, qu'elles présentent l'aspect d'une ombelle, ce qui a fait donner à cette plante le nom de parasol Chinois. Chaque aisselle des feuilles donne naissance à un pédoncule d'environ trois pouces, qui soutient un épi de fleurs ovale, des côtés duquel sortent plusieurs épis semblables et pédicellés.

Ajoutez * au n°. 8. S. à papier.

Pages 353 et 354. Panis.

Les panis d'Italie et miliacé se cultivent en pleine terre dans un bon terrein léger, chaud et amendé, pour la nourriture des hommes et des oiseaux. Leurs graines mûrissent dans nos pays du nord, quand on a semé ces plantes à une exposition méridienne, et dans les terres indiquées ci-dessus. On en fait usage en bouillie comme de celles du phalaris des Canaries.

Page 391. Roseau.

On cultive deux ou trois variétés du roseau bambou, dont les feuilles sont beaucoup plus petites.

Page 404. Ire. section. Après cocotier.

Avoira. *Elais.*

Monoïque. Spathe monophylle. Cal. double; l'extérieur à 6 parties;

l'intérieur 6-fide. Fl. mâle. 6 étam. Ovaire avorté. Fem. 1 ovaire. Style épais. 3 stigm. Fruit coriace, fibreux, un peu anguleux, contenant une noix à 3 valves, à 1 loge, percée de 3 trous à sa base.

Avoira de Guinée. *E. Guineensis.*

Ce palmier, le plus grand de tous, a son tronc hérissé dans toute sa hauteur, d'épines longues et aigues qui couvrent sa surface. Son sommet est couronné d'une touffe de feuilles ailées, dont les folioles sont très-rapprochées, et qui ont jusqu'à 15 pieds de longueur. Ses fruits sont ovales, d'un jaune doré, et le brou qui couvre la noix est d'une substance onctueuse.

Lieu. *La Guinée, la Guyane, les Antilles.* ♄ Toujours vert.

Cult. Serre chaude. Cet arbre, à qui il faut de très-grandes serres pour le cultiver, doit continuellement rester dans la tannée. Sa terre doit être plus légère que consistante. L'humidité lui fait tort, et la plus grande chaleur lui est favorable. Mult. par ses graines tirées des pays où il croît naturellement, et semées aussitôt après leur arrivée, dans des pots plongés dans une couche chaude sous chassis. A moins que les semences ne soient bien fraîches, elles ne lèvent pas. Cette circonstance, jointe à l'impossibilité de le multiplier par une autre voie, le rend très-rare en Europe.

Us. De l'amande du fruit on tire une sorte de beurre d'un bon goût et adoucissant, qu'on connoît sous le nom de beurre de Galaham, et son huile sous celui d'huile de palmier.

Page 422. Smilace.

N°. 10. S. herbacée.

Tige anguleuse, très-droite, de 4 à 5 pieds. Fleurs verdâtres, en grappes arrondies.

Page 430. Commeline.

N°. 4. C. tubéreuse.

Les trois étamines stériles portent 4 à 6 espèces d'anthères jaunes, en massue pédiculée et en croix.

Variété à feuilles et à fleurs plus grandes.

Les fleurs des commelines ne s'ouvrent que le matin.

Les espèces délicates de ce genre peuvent passer l'hiver dans la serre tempérée.

Page 447. Eucomis.

Ce genre de l'Héritier rentre dans ceux *basilœa* et *fritillaria*. *Eucomis undulata* est en double emploi ; c'est la même plante que, *eucomis regia* de l'Héritier, synonyme de *basilœa regia* de cet ouvrage.

Les *eucomis punctata et nana* de cet auteur ont beaucoup de rapports au *basilœa regia* Cette espèce est la plus grande ; l'*eucomis undulata* de grandeur moyenne, et l'*eucomis nana* la plus petite. Celle-ci est dans cet ouvrage sous le nom de fritillaire naine.

Page 474. Lachenale.

N°. 6. Lachenale rameuse. *L. ramosa*. *Phormium tenax* Forster, Lin. fils. *Chlamydia tenacissima*. Gœrtner.

Plante à lin. Voyage de Cook. T. I, pag. 206. Pl. 8. éd. in-4°.

Feuilles radicales, nombreuses, distiques, linéaires, canaliculées, avec une côte saillante sur le dos. Du centre des feuilles s'élève une hampe feuillée à sa base, nue ensuite, rameuse et paniculée dans sa partie supérieure, qui porte beaucoup de fleurs jaunes, verdâtres à leur base, un peu unilatérales, dont les pétales sont droits et rapprochés en tube ; les 3 pétales extérieurs sont plus courts et carenés ; les 3 intérieurs plus longs, à sommet obtus et réfléchi. Capsule trigone, à 3 loges polyspermes. Semences membraneuses à leurs bords.

Lieu. *La Nouvelle Zélande*. ♃.

Cult. Serre tempérée.

Les femmes de ce pays tirent de cette plante une filasse qui approche de notre lin, et l'emploient à faire leurs vêtemens.

Page 496. Hœmanthe en spirale. *H. spiralis*.

Syn. *Amaryllis spiralis*. L'Héritier.

Page 500. Amaryllis ondulée.

La hampe grêle porte à son sommet une ombelle de 10 à 12

fleurs d'un rouge pourpre, dont les divisions, qui n'ont guères plus d'un pouce de longueur, sont étroites, ondulées et réfléchies.

Page 514. Bermudienne réticulée.

Les fleurs d'abord rassemblées en tête, se développent en grappe, et ensuite se disposent en un assez long épi.

Page 521. * Iris à longues feuilles.

Feuilles de 3 pieds et demi de hauteur et d'un pouce environ de largeur, un peu torses, rayées longitudinalement, terminées en pointe. Tige de 4 pieds, feuillée, cylindrique, avec un angle très-peu saillant en-dedans, droite et glabre. Fleurs solitaires dans chaque spathe. Les 3 pétales supérieurs et les stigmates d'un blanc pur; les premiers légèrement rayés de jaune dans leur milieu. Les pétales inférieurs plus longs que les supérieurs, spatulés, blancs sur leur limbe, jaunes sous le stigmate et au milieu de la partie arrondie.

Cette fleur est de la grandeur de celle de l'iris Germanique, mais les pétales supérieurs sont plus longs. Ses capsules ont six angles, dont trois faces sont plus larges.

Page 523. *Retranchez :*

N°. 34. Iris de la Chine. *I. Chinensis.* Hort. Lond.

Page 525. * n°. 6. Morée frangée. *Moræa fimbriata.* N. *Iris Chinensis.* Curtis magazine.

Tige courte, de 3 à 4 pouces, articulée. Feuilles distiques, engaînées à la manière de celles des iris, de 16 à 20 pouces de longueur, larges d'un pouce et demi, rayées de lignes longitudinales parallèles, très-glabres, luisantes d'un côté, un peu couvertes de l'autre d'une nébulosité glauque. Du milieu de ces feuilles s'élève une hampe enfermée d'abord dans un spathe, qui s'alonge et se développe en une panicule distique de 2 pieds environ de hauteur. Cette panicule est formée de plusieurs pédoncules alternes et distans, qui portent chacun deux à trois fleurs pédicellées, naissant d'un spathe particulier. La fleur est un peu courbée à l'endroit de l'ovaire, tubulée, à 6 divisions, dont 3

courtes et tronquées à leur sommet, et 3 plus grandes, arrondies et légèrement bifides. Toute la corolle, ou le calice suivant Jussieu, est d'un bleu pâle. Les 3 plus grandes divisions ont leurs bords finement dentés, et 2 sillons longitudinaux, avec une arête saillante. Cette arête et l'extrémité des 2 sillons sont d'un jaune safrané, et entourés de points violets ou bleus. Les 3 stigmates pétaliformes sont profondément bifides, et élégamment frangés en leurs bords et sur le dernier tiers de leur longueur. La hampe soutient 40 à 50 fleurs qui se succèdent pendant un assez long tems.

Lieu. *La Chine.* ♃ fl. en mars.

Cult. Orangerie. Celle des ixies. On la multiplie comme les iris par la séparation de son pied. Cette plante est fort belle, et d'autant plus intéressante, qu'elle orne avec élégance les premiers jours du printems.

Page 542. *Globbée.

Globba sylvestris. Rumph. *An renealmia exaltata.* Lin. fils? *An catimbium.* Jussieu?

Wildenow ne paroît pas adopter cette synonimie, car il exclut du *renealmia exaltata* de Lin. fils, *globba sylvestris* de Rumph., qu'il met sous son espèce *globba nutans.*

Cette belle plante a le port et le feuillage d'un petit bananier; mais ses feuilles sont beaucoup moins grandes, lancéolées, et chacune portée sur un long pétiole amplexicaule et radical. Elles sont couvertes d'une nébulosité glauque qui se détache aisément lorsqu'on les touche. Sa tige est très-droite, articulée, et fleurit à 5 à 6 pieds de haut.

Les fleurs sont grandes et disposées en épis terminaux. La partie supérieure de la tige qui les soutient a 2 articulations qui donnent chacune naissance à une petite feuille ou bractée amplexicaule, de la même forme que les feuilles inférieures.

Les fleurs sont d'un jaune pâle, lavées et tachetées de rouge pâle, distiques sur l'axe de l'épi. Chaque fleur est pédonculée. Les pétales ou divisions calicinales ont environ 2 pouces de longueur sur 9 lignes de largeur. Le calice extérieur est monophylle à 3 divisions. L'intérieur à 3 à 4 parties inégales et pétaliformes.

Une seule anthère assez longue, grise et sans filamens, est attachée au milieu d'une sorte de pétale intérieur, roulé à son sommet. La capsule est couronnée par les 3 folioles calicinales persistantes, couverte de tubercules transparens, trigone, à 3 loges; les semences obrondes, chacune attachée par un pédicule à l'axe central.

Page 569. Hypociste parasite.

Les fleurs sont sessiles, droites, axillaires et terminales.

Page 582. Passerine grandiflore.

Fleurs blanches, plus grandes que celles des autres espèces, au sommet des tiges et des rameaux.

Page 583. Struthiole. Cult.

L'article de la culture doit s'entendre pour les deux espèces, et non pour la première seule.

Page 584. * Lachnée conglomérée.

Les feuilles ne sont pas véritablement embriquées. Elles sont très-rapprochées, et couvrent les jeunes tiges et rameaux qui sont blancs. Elles sont opposées en croix, peu ouvertes, linéaires, courtes, obtuses, sessiles, vertes en-dehors, blanches en-dedans.

Page 592. Protée. Cult.

Plusieurs espèces de protées se multiplient aussi de boutures; faites au printems, elles s'enracinent dans le cours de l'été.

Page 593 Banksie. Cult.

La première espèce se propage aussi de boutures faites au printems selon la manière indiquée. Il est apparent que les autres peuvent se multiplier de même par cette voie.

Page 601. Raisinier à feuilles lancéolées.

Cet arbrisseau pousse plusieurs tiges rameuses, vertes dans leur jeunesse et glabres. Les feuilles sont ovales-lancéolées, terminées en pointe assez longue, veinées longitudinalement, très-entières, glabres, et d'un beau vert. Leur gaîne est blanche,

pubescente, garnie à son sommet de cils blancs qui s'étendent des deux côtés des feuilles.

Page 611. *R. undulatum.*

Ajoutez *R. rhabarbarum.* Lin.

Ce raisinier se multiplie très-facilement par ses rejettons et par boutures. Il n'a pas besoin de la tannée.

Le bord de ces dernières est souvent rougeâtre.

Page 616. Rivine cotonneuse. *Rivinia humilis.*

Variété. *Rivinia canescens.* Lin. *R. pubescens.* Encycl.

Cet arbrisseau s'élève à 2 à 3 pieds. Ses rameaux et ses feuilles sont opposés. Celles-ci sont d'un vert léger, un peu blanchâtres et presque cotonneuses. Fleurs petites, blanches. Baies rouges. Il se multiplie facilement par ses graines qui mûrissent dans nos serres, et qui se répandant dans les pots voisins ou dans la tannée, lèvent en peu de tems. Ses fleurs sont en grappes axillaires.

Page 645. Amaranthine globuleuse.

Tiges ordinairement rameuses; les rameaux opposés. Fleurs d'un pourpre vif et luisant, sessiles; souvent la tête terminale est accompagnée de deux autres aussi sessiles, situées au-dessous et contre elle.

Cette espèce est vulgairement nommée, immortelle rouge.

Pages 660 et 661. Staticées.

Ajoutez * aux n°s. 9, 13, 14, 15 et 16.

Page 684. Polygale à feuilles lancéolées.

Les fleurs sont pourpres en-dedans, verdâtres en-dehors.

Page 691. Véronique. 4e. section.

* 37. Véronique à feuilles d'ivette. *V. chamæpityoides.* H. P.

Tige grêle à sa base, grossissant à mesure qu'elle s'effeuille et s'élève, et devenant droite et roide. Feuilles alt., sessiles, divisées jusques près de leur base en trois parties étroites, linéaires, obtusément pointues, ouvertes et un peu réfléchies vers le bas. Fleurs d'un bleu pâle, très-petites, sessiles, solitaires

dans chaque aisselle, tombant peu de momens après leur épanouissement.

Lieu.... ☉ fl. en été.

Page 702. Barrelière. *Barleria.*

On cultive encore quatre espèces de ce genre qui sont :

Barrelière à feuilles de morelle. *B. solanifolia.* ♄.

B. prionite. *B. prionitis.* ♄.

B. à feuilles de buis. *B. buxifolia.* ♄.

B. à fleurs écarlates. *B. coccinea.* ♄.

Ces espèces doivent recevoir la culture des plantes de serre chaude. Elles sont toutes des Indes orientales.

Page 705. Carmantine pubescente. *J. pubescens.*

Cette espèce est nommée au Jardin nat. *dianthera Peruviana.*

Page 707. Carmantines. Autres espèces cultivées.

Carmantine scarlatine.

Les fleurs sont d'une écarlate peu vive, terminales. Le tube grêle et long d'un pouce ; le limbe divisé en 4 parties lancéolées ; les anthères jaunes.

* Carmantine (dianthère) à feuilles de gremil. *Dianthera lithospermifolia.* Allioni.

Tiges droites, d'un pied et demi environ, marquées de 5 cannelures profondes, très-glabres, rameuses ; les rameaux opposés. Feuilles opp., pét., ovales, très-entières, un peu concaves en-dessus, glabres et vertes. Fleurs petites, d'un pourpre pâle, ramassées au nombre de 6 à 7 en paquets axillaires et opposés. Les pédoncules sont très-inégaux ; il y en a toujours deux plus longs que les autres. Les deux lèvres de la corolle sont d'égale largeur ; l'inférieure n'est pas divisée, mais elle a seulement trois dents. Les bractées sont cordiformes, plus larges que la fleur. 2 anthères distinctes sur chaque filament.

Lieu.... ☉ fl. en été.

* Carmantine à feuilles de basilic. *Anjusticia ocymoides.* Encycl. ? (Dianthère).

Cette espèce a la tige droite, simple, un peu velue, quadran-

gulaire à sa base, sexangulaire ensuite. Elle fleurit à la hauteur de 7 à 8 pouces. Feuilles opp., lancéolées, finissant en pétiole à leur base, très-entières, glabres, ou très-légèrement velues sur leurs bords. Fleurs beaucoup plus grandes que celles de la précédente, pourpres, pédonculées, rassemblées au nombre de trois dans les aisselles des feuilles; la lèvre inférieure trifide; la division moyenne tachetée de quelques petits points blancs à l'entrée du tube. Une seule bractée lancéolée et un peu velue. 2 anthères distinctes sur chaque filament.

Lieu.... ☉ fl. en été.

Cult. Ces plantes se sèment sur couche et sous chassis au printems, et se repiquent ensuite en pots ou en pleine terre à une exposition méridienne, où elles ne tardent pas à fleurir. On peut les laisser sur la couche; elles y deviendront plus fortes.

Page 712. Frêne pubescent.

Ajoutez *.

Page 721. Mogori.

La seconde variété du jasmin d'Arabie a son calice partagé en 12 à 14 divisions très-étroites.

Page 724. Jasmin. Cult.

Presque toutes les espèces peuvent être propagées de boutures faites au printems dans des pots sur couche ombragée, ou en pleine terre à l'ombre.

Page 727. Péragut.

* Péragut odorant. *Clerodendrum fragrans*. H. P.

Obs. La nomenclature de cette espèce est encore incertaine. Le nom sous lequel elle est connue au Jardin national, ne se trouve pas dans les auteurs. Des jardiniers anglais lui donnent celui de *clerodendrum fortunatum*, Lin.; d'autres l'envoient sous le nom de *volkameria Japonica*. Thumberg. Cette plante ne peut cependant être rapportée à ces espèces, encore moins à la dernière, dont les grappes des fleurs sont unilatérales. La considération de la baie et des semences peut seule déterminer le

genre auquel elle appartient. En attendant la décision, le nom *clerodendrum* lui convient davantage que celui de *volkameria* auquel elle n'a pas tant de rapports.

Arbrisseau dont la tige est droite, tétragone dans sa jeunesse, et rameuse; les rameaux opposés, aussi tétragones, et un peu velus. Feuilles opp., portées sur de longs pétioles, assez grandes, d'abord cordiformes et crénelées, ensuite ovales-lancéolées, presqu'entières ou simplement ondulées en leurs bords, pointues, velues sur les deux surfaces, vertes, et d'une odeur assez désagréable, semblables à celle de plusieurs cestreaux. Fleurs en cîme ombelliforme, terminale, serrée, d'abord couverte de bractées, composée de 4 pédoncules principaux, courts, rameux et opposés, et de deux autres aussi opposés, situés dans le milieu de l'ombelle. Chacun de ces pédoncules est ordinairement accompagné à sa base de deux feuilles florales, étroites, lancéolées et velues. Les fleurs sont blanches, doubles sur l'individu que je cultive; réunies au nombre de plus de cinquante, extrêmement pressées les unes contre les autres. Elles ont un pouce environ de diamètre, et ressemblent beaucoup à celles du jasmin du Cap à fleurs doubles, *gardenia florida*. Leur calice est monophylle et rouge, et chacune de ses divisions porte trois glandes verdâtres, comprimées et transparentes. Le tube de la corolle est légèrement courbé, et rouge comme le calice. Cette ombelle de 5 pouces environ de diamètre dure au moins deux mois à cause de la succession de ses fleurs, et quand celles-ci sont passées, les calices rouges qui persistent forment encore une cîme assez agréable à la vue.

Lieu.... ♄ fl. dans différens tems. Toujours vert.

Cult. Serre tempérée, ou orangerie dont elle ne demande que les soins ordinaires. Comme cette plante est toujours en végétation, et qu'en hiver elle forme de nouvelles ombelles pour s'épanouir à la fin de cette saison, il est essentiel de la placer de manière qu'elle puisse recevoir la lumière directement, lorsqu'elle est dans la serre. On la multiplie par ses rejettons, et de boutures faites sur couche et sous chassis couvert, aussitôt après sa floraison.

Elle n'est point du tout délicate, et fleurit en plein air.

Cette espèce a des rapports, quant à l'aspect, avec l'*hortense*. Ses ombelles sont moins grandes, mais elle a le mérite de plus d'avoir des fleurs doubles et d'une odeur suave. C'est une nouvelle acquisition fort intéressante.

Page 733. Cotelet.

* Espèce nouvelle, dont il est fait mention à la fin de cet article, page suivante.

Ce cotelet ne paroît former qu'un arbrisseau. Ses tiges sont droites, quadrangulaires, striées, glabres et roides. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, profondément dentées, un peu fermes, glabres, vertes et luisantes en-dessus, pâles en-dessous, de 3 pouces environ de longueur. Fleurs petites, blanches, en panicule simple et terminale.

Lieu.... ♄ Toujours vert.

Cult. Serre tempérée.

Page 738. Verveine de Buenos Ayres.

* Tige brune, tétragone, striée et velue. Feuilles amplexicaules, ovales; les unes élargies; les autres lancéolées, velues, profondément et doublement dentées. Fleurs bleues, en épis plus gros que ceux des espèces suivantes, paniculés et terminaux; l'épi principal plus haut que ceux qui l'environnent.

TOME SECOND.

Page 14. Sauge. Section 2.

* Sauge à feuilles de germandrée. *Salvia chamædrifolia.* Cav.

Cette espèce a des rapports, à cause de son odeur et de la forme de ses feuilles, quoique beaucoup plus petites, à la sauge officinale, n°. 3.

Tiges nombreuses, rameuses ; les unes droites, les autres couchées et redressées ; presque cylindriques ou obtusément tétragones, légèrement cotonneuses, ainsi que les jeunes rameaux. Feuilles pétiolées, opposées, ovales-elliptiques, crénelées, ridées, vertes en-dessus, blanchâtres et cotonneuses en-dessous, de 8 lignes de longueur. Fleurs....

Lieu.... ♄ Toujours verte.

Cult. Orangerie.

* Sauge phlomoïde. *Salvia phlomoides.* Vahl.

Tige droite, obtusément tétragone, sillonnée au milieu des faces, rameuse ; les rameaux opposés et montans. Feuilles opp., pétiolées, ovales-oblongues, bordées de dents peu profondes et écartées, vertes en-dessus, pâles en-dessous. Toute la plante garnie de poils blancs. Fleurs d'un bleu léger, axillaires, assez distantes, disposées par paires, ou verticillées au nombre de 2 à 4, et formant une sorte d'épi terminal, garni de bractées.

Lieu.... ♄ fl. une partie de l'année. Toujours vert.

Cult. Orangerie.

Je possède ces deux espèces depuis si peu de tems, que je ne peux rien dire sur leur culture particulière.

Page 27. Germandrée jaune, n°. 26.

* Variété plus basse, à feuilles plus petites, blanchâtres en-dessous. L'épi de fleurs aussi long et aussi garni que celui de

l'espèce. Elle est beaucoup plus rustique, et passe nos hivers en pleine terre. Indigène dans l'île de Corse.

Page 29. Germandrée. Autre espèce cultivée.

* Germandrée à feuilles de romarin. *Teucrium rosmarinifolium.*

Il faut voir la fleur de cette espèce pour croire que ce n'est pas un romarin. Elle en a le port, l'aspect, les tiges, les feuilles et leur disposition.

Tige tétragone, droite, rameuse, blanche sur les jeunes pousses. Feuilles opposées, sessiles, très-étroites, obtusément pointues, vertes en-dessus, avec la nervure blanche, à bords roulés, et blanches en-dessous, accompagnées dans les aisselles, de deux ou quatre petites feuilles qui sont les rudimens de jeunes rameaux.

Page 30. Sarriete de montagne, n°. 3.

Les fleurs sont blanches, teintes d'un pourpre léger. Elles sont plus grandes et plus labiées que celles des autres espèces de ce genre, axillaires, et garnissant une grande partie de la longueur des tiges. Souvent leur pédoncule commun se bifurque; chaque pédicule porte 3 à 4 fleurs, une reste dans la dichotomie. Les divisions calicinales sont pointues.

Obs. Le calice peu labié et la forme des feuilles me paroissent être les seuls motifs qui aient pu ranger cette espèce dans le genre sarriete. Les autres parties de sa fleur ont beaucoup plus de rapports aux thyms et aux mélisses.

Page 37. Lavande.

Lavande multifide. Les tiges sont droites, hautes de 2 à 3 pieds, et très-velues. Elle n'est pas ♂ mais ♄.

Lavande à feuilles d'aurone. Les fleurs ne sont pas bleuâtres mais d'un bleu très-foncé.

Page 39, ligne 2. Lavande. Us.

Les espèces 5, 6 et 7 ont un joli feuillage.

Page 51. Stachide des Alpes, n°. 4.

Les feuilles inférieures sont assez grandes, un peu en cœur à leur base. Les calices sont évasés.

Page 51. Stachide à feuilles oblongues, n°. 7. *S. intermedia.*
Ajoutez H. K. et *.

M. Boucher, d'Abbeville, m'a communiqué un échantillon d'une espèce de ce genre, qui a beaucoup de rapports à celle d'Aiton, et qui peut-être est la même. Elle se rapproche de stachide Germanique, mais elle est moins blanche et moins laineuse sur toutes ses parties. Ses feuilles ne sont pas cordiformes à leur base; elles sont ovales-lancéolées, moins épaisses, et plus fortement dentées que celles du Germanique. Les dents calicinales sont terminées par une épine courte, jaunâtre, piquante très-sensible à la vue. Ses verticilles distans avoisinent aussi cette espèce de celle des Alpes.

Elle est indigène près d'Abbeville.

Page 56. Marrube d'Espagne.
Ajoutez *.

Page 58. Agripaume de Tartarie.
Ajoutez *.

Page 67. Thym serpolet.
Variété 5. Inodore. Dans les sables maritimes d'Ambleteuse.

Page 70. Mélisse parviflore.
Ajoutez *. Les feuilles de cette espèce sont très-petites, à peine dentées. Les pédoncules portent ordinairement 3 fleurs blanches, tachetées de pourpre. Le tube de la corolle est un peu courbé. Les calices ont plutôt 5 dents égales que la forme labiée.

Page *id.* Mélisse de Crète.
Syn. *Calamintha Cretica.* Fl. fr.

Obs. Les espèces 2, 3 et 4 de ce genre seroient peut-être mieux placées dans le genre *thym* à cause des poils qui ferment l'entrée des calices pendant la maturation des graines, et qui revêtent même le tube de la corolle. Cette observation m'a paru d'autant plus essentielle à faire, qu'elle peut préserver les élèves des erreurs dans lesquelles ils peuvent tomber à l'égard de ces plantes, pour les placer dans leur genre.

Page 88. Scrophulaire à feuilles luisantes.

Les pinnules sont alternes, dentées et incisées.

Page id. Scrophulaire à feuilles de sureau.

Ajoutez *.

Page 92. Linaire trifoliée.

Cette espèce est sujette à varier dans la forme de ses feuilles et la couleur de ses fleurs. Ses tiges sont souvent couchées par le poids des feuilles. Lorsque la plante a beaucoup de végétation, les feuilles sont alors beaucoup plus grandes, ternées, seulement à la base des tiges, ensuite opposées, et les supérieures alternes, petites et pointues; toutes sont un peu charnues et glauques. Les fleurs sont blanches; leur palais d'un jaune plus ou moins safrané; l'éperon ainsi que la lèvre supérieure, d'un beau violet.

Page 102.

Miller a cultivé trois espèces du genre beslère, *besleria*. Il n'en a pas été fait mention dans cet ouvrage, parce que ces plantes difficiles à élever et à conserver, n'existent vraisemblablement plus en France et en Angleterre.

Les espèces que cet auteur a cultivées sont:

Beslère à feuilles de mélissot. *B. melittifolia.* ♄,

B. jaune. *B. lutea.* ♄.

B. à crête. *B. cristata.*

Ces plantes sont de serre chaude et de tannée. On les obtient et multiplie par leurs semences conduites selon la manière indiquée pour les arbustes de cette serre.

Ce genre a des rapports à l'ordre des scrophulaires. Il doit être placé dans cet ouvrage à la suite du genre Colomnée, dont il ne paroît différer que par un calice et une corolle velus, par un ovaire glanduleux à sa base, et par son fruit à une seule loge polysperme.

Page 104. Mimule.

N°. 3. Mimule orangée. *Mimulus aurantiacus.* Curtis magazine. *An M. luteus.* Lin.?

Tige rameuse, ligneuse, cylindrique, de 3 pieds; les rameaux

opposés. Feuilles opposées, sessiles, presque connées, ovales-lancéolées, légèrement dentées en scie, glabres et vertes. Fleurs de couleur orangée, du double plus grandes que celles de la première espèce, pédonculées, opposées, axillaires, solitaires.

Lieu.... ♄ fl. une partie de l'été.

Cult. Orangerie. On la multiplie facilement de bouture.

Page 106. Celsie du Levant.

Cette plante est bisannuelle. ♂.

Page 128. Morelle. Section 2.

* Morelle à épines blanches. *Solanum argyracantha.* H. P.

Cette espèce a des rapports avec la morelle bordée, quant à la forme de ses fleurs, à leur disposition, ainsi qu'à la situation de ses épines. Sa tige est droite, assez grosse, ferme, rameuse, couverte ainsi que les rameaux, les pédoncules et les pétioles, de petits paquets de duvet cotonneux, et tous armés ainsi que les principales nervures des feuilles, d'aiguillons blancs et crochus. Feuilles pétiolées, [illegible]nes, ovales, presqu'en cœur à leur base, obtusément pointues, sinuées en leurs bords, cotonneuses, douces au toucher sur les deux surfaces. Fleurs violettes, de la grandeur de celles de la morelle bordée, pédonculées, axillaires, solitaires ou géminées. Le limbe divisé en 6 parties, longitudinalement plissé; le plus souvent 6 étamines courtes, qui ne se réunissent pas en pointe à leur sommet, comme dans la plupart des espèces de ce genre. Le calice à 6 ou 7 divisions, cotonneux et couvert d'aiguillons, plus gros dans les fleurs fructifères que dans celles où le fruit avorte. Circonstance qui rapproche cette espèce de la morelle bordée.

Lieu.... ♄ fl. en été. N'ayant encore que 4 pouces de hauteur.

Cult. La même que celle des morelles de serre tempérée; celle-ci me paroît délicate.

Pages 134 et 135. Morelles inclinée et papillonacée.

Ajoutez *.

Obs. La morelle inclinée est en double emploi dans ce genre. C'est

C'est la même espèce que celle indiquée n°. 10, sous le nom de M. laciniée d'Aiton, H. K.

Page 138. Lyciet glauque. *Lycium Boerhaaviæfolium.*
Syn. *Ehretia halimifolia.* L'Héritier.

Page 139. Cestreau, (espèce nouvelle).

* Cestreau à feuilles ondulées. *Cestrum undulatum.* N.

Cette espèce a des rapports au cestreau à feuilles de laurier, mais ses feuilles sont beaucoup plus petites.

Tiges droites, grises, cylindriques, peu rameuses. Feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, pointues, ondulées, fermes, très-glabres, d'un vert luisant en-dessus, pâles en-dessous, de deux pouces environ de longueur. Le pétiole brun. Fleurs.... Lieu. *L'Amérique mérid.* ♄ Toujours vert.

Cult. Serre chaude.

Page 140. Cestreau à baies noires.

Cette espèce qui croît aussi au Pérou, peut passer en pleine terre dans le milieu de la France. On la cultive ainsi à Paris et dans la ci-devant Bretagne. On doit seulement avoir l'attention d'en conserver des individus en serre.

Page 147. Varrone à long épi. Mongoli de Curaçao. Encycl.

Cet arbrisseau s'élève à 12 à 15 pieds de haut. Ses feuilles sont pét., très-rapprochées, hérissées en-dessus de très-petits tubercules, tomenteuses et douces au toucher en-dessous, etc. Les épis des fleurs sont serrés.

Page 155. Vipérine frutescente.

Ajoutez *.

Page 188. Chelone feuillée.

Fleurs d'un rouge très-foncé en-dehors, presque brunes, blanchâtres en-dedans, en épi terminal, et unilatérales. Corolle tubulée, rétrécie à sa base, renflée ensuite; le limbe peu labié, ouvert, à 5 divisions presqu'égales. Cal. à 5 folioles étroites et

pointues. 2 ou 3 bractées très-courtes, plus éloignées du calice que dans les autres espèces. Les fleurs ont environ un pouce de longueur.

Page 227. Allamande à feuilles de saule.

Fleurs grandes, jaunes, pédonculées, solitaires ou géminées, axillaires et terminales.

Page 244. Plaqueminier ébène. Us.

Le bois de cet arbre est l'ébène noire.

Page 261. Béfar paniculé.

Fleurs blanches, péd., distantes, formant une panicule simple au sommet des tiges et des rameaux.

Page 272. Bruyère à feuilles recourbées. Section 2, n°. 35.

Les fleurs de cette espèce sont formées, colorées et disposées de même que celles de l'espèce suivante de Curtis.

Page 273. Bruyère en forme de bouteille. *Erica ampullacea*. Curtis magazine. 3e. section. Feuilles quaternées.

Cette bruyère ne s'élève guères qu'à environ un pied de haut. Elle est très-rameuse. Feuilles quaternées, courtes, linéaires, un peu triangulaires et velues, mucronées, rudes en leurs bords, formant 8 rangs sur les tiges. Fleurs couleur de chair, striées de lignes plus foncées, ventrues à leur base, rétrécies vers le haut; à limbe plane, divisé en 4 parties; disposées au nombre de 4 à 5 au sommet de chaque rameau. Anthères non saillantes. Style saillant.

Lieu. *Le Cap*. ♄.

Cette espèce a des rapports avec la 66e.; mais elle en diffère par ses anthères, qui se trouvent au niveau du limbe sans le dépasser.

Page *id*. Bruyère octogone, n°. 44.

Cette espèce s'élève très-haut, et devient fort rameuse. Les fleurs sont disposées en ombelle au sommet des rameaux. Elles sont grosses, visqueuses, d'un beau rouge, un peu ventrues vers leur base, resserrées vers le haut, et formant à leur extrémité une sorte de godet vert.

Page 274. Bruyère pyramidale, n°. 47.

Les fleurs rouges, nombreuses, courtes et évasées terminent les rameaux qui sont courts, et forment avec eux une pyramide élégante au sommet des tiges.

Page 278. Bruyère ventrue, n°. 66.

Les fleurs sont d'un pourpre pâle, disposées plusieurs ensemble au sommet des rameaux. La corolle a environ 8 à 10 lignes de longueur. Les divisions du limbe sont roulées en-dessous. Les étamines sont à peine saillantes.

Page 281. Bruyère élégante écarlate, n°. 77. Variété ou espèce.

Fleurs cylindriques, écarlates, nombreuses, verticillées vers le sommet des tiges. Le tube long de 12 à 15 lignes. Le limbe évasé. Les anthères brunes, réunies, non saillantes, situées à l'entrée du tube. Les filamens courbés près des anthères pour faciliter la réunion de ces dernières.

Page 309. Roelle ciliée.

Cette plante a l'aspect d'une bruyère. Ses feuilles nombreuses, étroites, pointues, petites et ciliées garnissent les rameaux sur toute leur longueur. Les fleurs sont solitaires, terminales. La corolle, assez grande et ouverte en son limbe, est blanche dans le fond, ensuite marquée d'un cercle d'un bleu foncé, qui est immédiatement succédé par un autre de la même couleur plus pâle. Le limbe est d'un pourpre léger.

Cette plante est d'une culture et d'une conservation difficiles. On ne la multiplie pas plus aisément.

Page 336. Crépide.

Crépide sinuée. *Crepis sinuata.*

Plante d'un pied environ, peu rameuse. Feuilles radicales oblongues, profondément sinuées, et rudes au toucher; celles de la tige, à l'insertion des rameaux, plus courtes et plus découpées. Fleurs solitaires au sommet de chaque pédoncule, assez grosses, et d'un jaune pâle. Ecailles calicinales lâches et horizontales. Aigrette des semences plumeuse.

Lieu. *La Barbarie.* ♃ fl. en été.

Cult. Pleine terre. Celle des épervières.

Us. Cette espèce peut être cultivée pour l'agrément des parterres à cause de ses grosses fleurs et de sa permanence.

Page 338. Drépanie barbue.

Ajoutez *. Et au lieu de (la couleur différente du disque), *lisez :* la couleur jaune plus ou moins foncée des rayons.

Page 344. Scorzonère automnale.

Ajoutez Lieu..... Ind. ♃ fl. en août et sept.

Page 375. Centaurée des collines.

Les pinnules ou lanières des feuilles de la tige sont obtuses ou arrondies.

Page 377. Centaurée épineuse.

Fleurs blanches, petites, légèrement teintes de rouge.

Page 380. Centaurée orientale.

Cette espèce devroit être mise dans le 6°. genre, comme l'a fait avec raison La Marck.

Page 415. Bacchante.

Bacchante du Levant. *Baccharis dioscoridis.*

Arbrisseau dont les tiges peu ligneuses s'élèvent à 7 à 8 pieds de hauteur. Ses feuilles sont sessiles, ovales, profondément dentées, molles, et d'un vert léger. Ses fleurs sont violettes, disposées en corymbes terminaux.

Lieu. *Le Levant.* ♄.

Cult. Orangerie ou serre tempérée. Cette espèce se cultive comme les bacchantes 2 et 4. Elle se multiplie aussi aisément de bouture que la 1re.

Il faut des étés très-chauds pour que, dans l'automne, elle puisse fleurir.

Page 418. Chrysocome penchée.

Ajoutez *. Les feuilles sont linéaires-lancéolées, beaucoup plus grandes que celles de la 1re. espèce, et bien moins nombreuses. Les fleurs sont plus petites.

Page 422. Astère. Section 1. (Espèce nouvelle).

Astère visqueuse. *Aster viscosus.* Cav.

Tige droite, peu rameuse, cylindrique. Ecorce grisâtre, verte sur les jeunes rameaux. Feuilles alternes, amplexicaules, spatulées, élargies vers leur sommet; les unes très-entières, avec une pointe presqu'épineuse; les autres garnies de quelques dents droites et acuminées; un peu épaisses et charnues, visqueuses, vertes des deux côtés, très-glabres. Fleurs....

Lieu.... ♄ Toujours vert.

Cult. Orangerie.

Page 445. Seneçon élégant. Variété à fleurs doubles.

Cette variété est ♄ en serre, et fleurit presque toute l'année.

Page 467. Chrysanthême rude, n°. 14.

Retranchez *cotula grandis.* Lin., et lisez en place : *matricaria rigida.* La Marck.

Ajoutez après dents piquantes : et divariquées.

Obs. La plante nommée par Linné, *cotula grandis*, est la synonymie de l'espèce matricaire effilée de l'Encyclopédie, et de la chrysanthême n°. 16 de cet ouvrage.

Page *id.*, n°. 15. Chrysanthême des Indes. *C. Indicum.*

Syn. *Matricaria Sinensis.* Rumph. *Matricaria Japonica.* Breyn. prodr. *Kik*, *Kikku.* Kœmpfer.

Page 469. Matricaire commune.

Retranchez à la 3°. *variété :* les fleurons blancs transparens.

Ajoutez * 4°. à fleurons blancs transparens.

Page 470. Matricaire astéroïde, n°. 5.

Retranchez dans la description : et leurs dents divariquées et épineuses. *Lisez en place* : leurs dents très-fines ne sont, pour ainsi dire, que des aspérités qui rendent leurs bords rudes au toucher.

Le réceptacle de cette plante est garni d'alvéoles, et les semences ont 2 cornes.

Ajoutez après cette espèce :

N°. 6. Matricaire à feuilles de pastel. *M. glastifolia. Boltonia glastifolia.* L'Héritier, H. K.

Feuilles inférieures dentées en scie. Réceptacle et semences comme celles de la matricaire astéroïde.

Lieu. *L'Amérique sept.* ♃.

Cult. Pleine terre.

Page 478. Armoise de Madère.

Fleurs très-petites, en grappes courtes.

Page 501. Avant millerie.

Flaverie. *Flaveria.*

Fleurs flosculeuses. Cal. à 3 à 4 folioles, connivent, égal, pauciflore. Semences oblongues, striées, souvent enveloppées des écailles calicinales. Réceptacle sans paillettes.

Flaverie du Pérou. *F. Peruviana. Milleria contrahierba.* Cav. et Encycl.

Tige droite, sillonnée, très-rameuse, de 3 pieds; les rameaux ouverts et pubescens. Feuilles opposées, oblongues-lancéolées, pointues, molles, dentées, un peu glauques en-dessous, à trois nervures. Fleurs petites, jaunes, en petits corymbes serrés et terminaux, avec des bractées linéaires. 2 à 5 fleurons hermaphrodites, 5-fides. Un demi fleuron femelle, concave et échancré.

Lieu. *Le Pérou, le Chili.* ☉.

Cult. Pleine terre. Cette plante se sème sur couche au printems, et on la plante ensuite à une bonne exposition.

Elle fournit une teinture d'un beau jaune.

Page *id.* Millerie à 5 fleurs.

Variété à feuilles plus grandes et marquées de taches noirâtres. *Milleria maculata.* Miller.

N°. 2. Millerie biflore. *M. biflora.*

Tige droite, grêle, cylindrique, de 2 pieds, à rameaux opp., dont les inférieurs sont les plus longs. Feuilles inférieures ovales-

obtuses ; les caulinaires ovales-lancéolées, pointues ; toutes opp., dentées, velues, rudes au toucher, d'un vert terne et à 3 nervures. Fleurs petites, pédonculées, disposées en petites ombelles axillaires. Calice à 3 folioles. Deux fleurons hermaphrodites stériles. Un femelle fertile, très-étroit, droit, bi ou trifide.

Lieu. *Campêche.* ☉.

Cult. Les milleries sont des plantes de peu d'effet qu'on ne cultive que dans les jardins de botanique. On les sème sur couche au printems, et on les plante ensuite dans une bonne terre, à une exposition chaude.

Page 509. Coriope dorée.

Tige brune, velue, rameuse, formant un buisson étalé. Fleurs d'un beau jaune, plus doré près du disque ; les rayons larges, bi ou trifides. Semences couronnées de paillettes très-courtes.

Page 514. Hélianthe.

* N°. 11. Hélianthe glabre. *Helianthus lævis.*

Tiges de 6 pieds, droites, fermes, brunes à leur base, très-glabres ; les rameaux montans et opposés. Feuilles opp., pét., ovales-lancéolées, pointues, dentées, à trois nervures, glabres, un peu rudes en-dessus, à cause de petits points épineux qu'on n'apperçoit qu'avec la loupe. Fleurs jaunes, assez grandes, à 11 à 13 rayons.

Lieu. *La Virginie.* ♆ fl. en août et sept.

Cult. La même que celle des autres espèces de ce genre.

Page 517. Rudbecke velue.

Tige très-rameuse, brune, hérissée de poils blancs. Feuilles supérieures entières. Fleurs de grandeur moyenne. Disque brun. Calice velu, presque simple.

* N°. 8. Rudbecke à feuilles opposées. *Rudbeckia oppositifolia.*

Tige rameuse, d'un à deux pieds, anguleuse, presque tétragone, pubescente. Feuilles opposées, pétiolées, ovales-pointues, dentées, pubescentes sur les deux surfaces. Fleurs d'un beau jaune, de moyenne grandeur ; le disque jaune ; les fleurons bi

ou trifides à leur sommet, avec deux cannelures longitudinales. Calice presque simple. Réceptacle et pédoncule fistuleux.

Lieu. *La Virginie.* ♃ fl. en août et sept.

Cult. La même que celle des autres rudbeckes.

Page 551. Spermacocé glabre.

Tige tétragone, fistuleuse, d'un pied et demi. Feuilles lanc., très-entières, pointues, à nervures saillantes et presque parallèles en-dessous, rudes au toucher. Fleurs d'un blanc rougeâtre, très-petites, nombreuses, sessiles, en verticilles serrés.

Cult. Ligne 3. (On les met en pot); *lisez :* on met les deux espèces de serre en pot.

Page 564. Caffeyer. Cult.

Lorsqu'on emploie une bonne terre aux deux tiers franche, consistante et douce au toucher, on peut, sans risque, donner aux caffeyers de grands vases; ils y fleurissent mieux, et leur végétation est à tous égards plus belle.

Page 566. *Nonatelia longiflora.*

Ajoutez Aublet.

Page 571. Serissa à feuilles de myrte.

Syn. *Buchozia coprosmoides.* L'Héritier.

Page 620 Angélique. Caractère.

Semences bordées des deux côtés d'ailes membraneuses.

L'Angélique sauvage a la tige très-droite, très-glabre, et elle s'élève quelquefois jusqu'à six pieds. Ses feuilles sont grandes, deux fois ailées; les folioles ovales-lancéolées, presque sessiles et dentées; quelques paires, sur-tout les premières, sont accompagnées d'une ou deux autres folioles sessiles.

Page 628, Férule.

Au lieu de (la première espèce et peut-être d'autres encore n'élèvent leurs tiges); *lisez :* les férules n'élèvent ordinairement

leurs tiges que la seconde ou la troisième année de leur semis. Leurs feuilles radicales ont souvent deux pieds de longueur sur un au moins de largeur.

Page 715. Arabette des Alpes.

Cette espèce par ses fleurs blanches, nombreuses, peut contribuer à la décoration des parterres. C'est la seule de ce genre qui en soit susceptible.

Page 744. Ibéride. Cult.

La seconde espèce est vraiment rustique. Les fortes gelées ne lui font aucun tort, lorsqu'elle est dans un terrein sec et léger. Elle forme un gazon très-étalé, qui se couvre d'une quantité de fausses ombelles blanches.

Page 784. Malpighie piquante.

Les feuilles ont 4 à 5 pouces de longueur.

Idem. Malpighie à feuilles de houx. *M. ilicifolia.* Miller.

Ses feuilles sont bordées d'épines; plusieurs cependant n'en ont pas.

Page 785. *Malpighie à feuilles d'yeuse.

La jeunesse des feuilles n'influe pas sur l'absence des épines; elles en ont jeunes comme vieilles; mais les unes sont très-entières, et les autres à dents épineuses; elles ont 6 à 8 lignes de longueur.

TOME TROISIÈME.

Page 6. Géranions.

Dans la première section des espèces de ce genre, les géranions, n°s. 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 et 41, sont du genre *Erodium* de l'Héritier. Les autres de cette même section sont de son genre *Geranium*.

Toutes les espèces qui composent la seconde section sont du genre *Pelargonium* de cet auteur.

Ainsi c'est par inadvertance que dans la seconde section, les synonymes et espèces de l'Héritier sont indiqués par la lettre initiale G. (*geranium*), il faut lire P. (*pelargonium*).

Page 17. Géranion à feuilles de bouleau.

Variété à feuilles plus larges, presqu'en cœur, fortement dentées.

Cette variété ainsi que l'espèce, a les taches de ses pétales supérieurs, très-rameuses.

Page 22. Géranion velouté.

Syn. *pelargonium tomentosum*. Jacquin.

Page 27. Géranion à feuilles cornues.

Tige courte, rameuse. Fleurs blanches; les pétales presque égaux.

Page 28. Géranion, n°. 103.

Géranion hérissé. *P. echinatum*. Curtis magazine.

Tige verte, velue, un peu charnue, hérissée à sa base, des anciennes stipules devenues rudes. Feuilles pétiolées, cordiformes, arrondies, à 3 à 5 lobes, velues en-dessous. Fleurs au nombre de 7 à 8, disposées en ombelle terminale. Les pétales sont d'un blanc pur; les deux supérieurs sont marqués de deux ou trois taches d'un beau pourpre.

Variété à pétales pourpres, tachés de la même couleur plus foncée.

Les fleurs de cette espèce ressemblent parfaitement à celles du géranion n°. 102. Je crois qu'elle n'en est qu'une variété.

Le nom spécifique *echinatum* lui a été donné assez gratuitement. Ce n'est pas le seul géranion dont les tiges deviennent rudes ou raboteuses par les restes des stipules.

Page 37. Surelle corniculée.

Cette espèce annuelle en plein air, devient vivace, traçante, et fort incommode dans les serres où elle enfonce ses racines dans les pots.

Page 80. Buttnère.

N°. 3. Buttnère à feuilles en cœur. *Byttneria cordata.*

Arbrisseau sarmenteux. Tige de 7 à 8 pieds, à 5 angles, armée de piquans. Feuilles en cœur, dentées en scie, acuminées, minces, pubescentes en-dessous ainsi que les pétioles. Fleurs blanchâtres, en petites ombelles axillaires.

Lieu. *Le Pérou.* ♄ Cultivée au Jardin national.

Page 109. Maherne incisée, n°. 2.

Tiges grêles, couvertes de poils réunis par paquets, glanduleux et visqueux. Feuilles alternes, oblongues, incisées, presque pinnatifides. Fleurs écarlates en bouton, couleur d'orange épanouies, ensuite jaunes, solitaires ou géminées, pédonculées, terminales.

Page 140. Fabagelle fétide. *Zigophyllum insuave.* (à la fin du genre). *Fabago Afra frutescens minor, flore flavo magno, unguibus petalorum fuscis.* Boerhaave. Ind. act.

Cette espèce a beaucoup de rapports à la fabagelle vésiculeuse, n°. 3. Ses feuilles ne sont pas charnues; elles sont glabres, très-vertes. Ses fleurs sont grandes, jaunes, axillaires, pédonculées, solitaires. Les pétales sont marqués sur leur onglet d'une tache brune.

Toute la plante a une odeur désagréable, qui approche de celle de la couronne impériale.

Page 148. Diosma lancéolé.

Fleurs petites, blanches, au nombre de 2 ou 3, sessiles, axillaires et terminales.

Page 168 et suivantes. Œillets.

Ajoutez * aux numéros 2, 6, 8, 10, 11, 15.

Page 180. Lychnide.

Pétales entiers.

Lychnide visqueuse.

Pétales bifides.

Lychnide de Chalcédoine. — Lychnide de Portugal.

Pétales échancrés.

Lychnide des Alpes. — Lychnide dioïque.

Pétales laciniés.

Lychnide laciniée. — Lychnide à grandes fleurs.

Page 211. Joubarbe tortueuse.

Les rameaux de cette espèce sont courts, tortus et terminés par une rosette de feuilles. Les fleurs sont assez nombreuses et disposées en grappes terminales.

Page 215. Saxifrage. (après la 1re. espèce).

Saxifrage à fleurs safranées. *Saxifraga mutata.* Lin.

Les rosettes de cette espèce sont formées et disposées de même que celles de la première; mais leurs feuilles sont simplement velues en leurs bords, excepté vers leur sommet où l'on remarque quelques petites dents. Les fleurs sont d'un jaune safran, pourpres dans leur centre, disposées en grappes. Les pétales sont très-étroits et pointus.

Page 275. Onagre.

L'onagre pourpre, *œnothera purpurea*, Curtis magazine, est

une variété de l'onagre rose, mais assez distincte. Ses feuilles sont plus grandes et glauques, et ses fleurs plus larges, et d'un beau pourpre.

Elle est de même ⊙.

Page 299. Blakée trinerve.

Cette plante, foible dans sa jeunesse, prend ensuite une tige ligneuse, de 10 à 12 pieds, garnie de branches étalées. Ses feuilles sont pét., opp., ovales, pointues, très-entières, coriaces, assez grandes, à trois nervures longitudinales, noirâtres, jointes entr'elles par beaucoup de stries transverses. Fleurs roses, assez grandes, ax., sol., péd.

Lieu. *La Jamaïque.* ♄.

Cet arbuste est intéressant par le nombre de ses fleurs d'une jolie nuance. Desrousseaux. Encycl., art. Mélier.

Cult. Serre chaude. Cultivé à Londres.

Page 313. Pommier.

Ajoutez †* Reinette du Canada. Gros fruit applati, d'un jaune lavé de rouge. Peu acide.

Page 323. Poirier.

J'observe qu'il y a une erreur à l'article où l'intervalle à donner entre chaque poirier en espalier est indiqué. Au lieu de 15 à 20 pieds, il faut lire 25 à 30. Cette distance est nécessaire pour que les arbres puissent s'étendre sans se confondre.

La plupart des jardiniers et des cultivateurs de jardins font souvent la faute de planter leurs arbres trop près les uns des autres. Au bout de quelques années, ils sont obligés d'en déplanter la moitié, ou de les rendre rabougris par des tailles forcées. Je puis par expérience cependant les assurer que cinq poiriers bien conduits et convenablement espacés rapporteront beaucoup plus que quinze plantés dans le même espace. L'abbé Rozier prescrit 40 pieds entre chaque arbre, mais je crois cette distance trop considérable. Au reste elle doit être aussi relative à la qualité du terrein, à la hauteur des murs, au sujet qui a porté la greffe, et à l'espèce de poirier. Il est certain qu'il en faut une

plus grande aux arbres dont les bois sont forts, et les pousses vigoureuses, comme la marquise et la virgouleuse, et à ceux greffés sur franc, qu'aux poiriers dont la sève est naturellement moins abondante, et qui ont été greffés sur coignassier.

Page 326. Coignassier.

Miller cite deux espèces de cet arbre, qui ne peuvent être que deux variétés distinctes.

L'une qu'il nomme, *C. maliforma*, a ses fruits moins gros, et de la forme d'une petite pomme.

L'autre qui vient du Portugal, et qu'il appelle *C. Lusitanica*, a la pulpe de ses fruits d'un beau pourpre, moins âpre que celle des autres espèces, et meilleure à confire. Il donne à cette dernière la préférence sur les autres coignassiers.

Page 554. Sainfoin sensible.

Obs. Si la sensitive, la dionée, la surelle du Malabar et des étamines de quelques plantes nous étonnent par leur sensibilité, ce sainfoin, en apparence moins doué de cette propriété, doit par son mouvement particulier nous surprendre bien davantage, et fournir une ample matière à nos réflexions. Les premières sont extrêmement irritables; le moindre toucher suffit pour qu'elles éprouvent à l'instant une contraction; mais il leur faut une impression quelconque pour qu'elles manifestent leur sensibilité. Elles ne se meuvent pas d'elles-mêmes; et quand, le soir, leurs feuilles se replient, cette espèce de sommeil leur est commun avec toutes les feuilles des plantes légumineuses. Il n'en est pas ainsi du sainfoin sensible.

Son mouvement lui est propre et essentiel; il dépend absolument de lui-même; il dure toute sa vie, et aucune sorte d'impression ne sauroit ni le produire ni l'arrêter. Cette faculté est, pour ainsi dire, à cette plante comme le mouvement aux animaux. Ni la température, ni l'effet de la lumière et de l'obscurité, ni le contact et le choc de l'air, du vent et des corps ne peuvent influer en aucune manière sur sa singulière propriété. Son mouvement réside dans les deux petites folioles qui accompagnent, de chaque côté du pétiole, la grande foliole impaire.

Cette dernière éprouve le soir, comme toutes les feuilles des plantes de cette famille, une contraction qui la fait baisser et prendre pendant la nuit une situation verticale; mais les deux folioles ne sont pas sujettes à cette espèce de repos. Quoique toutes ne se meuvent pas en même-tems, il y en a toujours une partie en action. Elles décrivent un demi-cercle; de la situation droite elles passent à l'horizontale, et s'abaissent en-dessous à la verticale; lorsqu'elles ont atteint cette dernière, elles remontent pour s'abaisser encore peu de tems après. Quelques-unes se reposent pour agir ensuite à leur tour.

La cause de ce phénomène nous est inconnue, et le sera vraisemblablement encore longtems. Aucun objet extérieur ne pouvant l'occasionner, elle réside par conséquent dans les organes de la plante; et de même que tous les animaux, à peine est-elle née que son mouvement se manifeste. Comme on ne peut raisonnablement lui attribuer une action volontaire, il me paroît assez probable que la cause du mouvement de ses folioles est dans l'irritation, le développement et le resserrement que peut leur occasionner la sève. En effet, si l'on considère attentivement leur pétiole, l'on remarque qu'il est un peu tors. Lorsque la sève entre dans ses fibres, elle peut les irriter, ou détordre par son accumulation le pétiole, en lui causant un mouvement que la foliole nécessairement partage, et par son exhalation, retordre ce même pétiole et produire ainsi un mouvement contraire.

Au reste ce sainfoin ne seroit-il pas un des chaînons par lequel le règne végétal s'unit au règne animal? Il n'y a pas une très-grande distance entre lui et un zoophyte; et de celui-ci au règne minéral, l'intervalle n'est pas très-considérable. Le principe du mouvement est répandu en abondance dans toute la nature; tous les corps le reçoivent; leur organisation neutralise ou détermine son effet. Cette plante en a sans doute une qui nous le rend sensible.

Page 604. Nerprun. Première section.

* Nerprun thé. *Rhamnus theezans.*

Arbrisseau dont la tige est grise, et dont les rameaux nombreux, divergens et roides sont terminés par une épine brune, assez longue. Feuilles alt., pét., ovales-obtuses, avec une pe-

tite pointe particulière, glabres, vertes des deux côtés, très-entières ou légèrement denticulées, de 10 à 12 lignes de longueur, et de 4 à 5 de largeur. Fleurs très-petites, glomérulées, sessiles.

Lieu. *La Chine.* ♄ Toujours vert.

Cult. Orangerie ou serre tempérée.

Us. Les pauvres de la Chine prennent en guise de thé l'infusion des feuilles de cet arbuste.

EXPLICATION

EXPLICATION

DE LA PLANCHE.

GREFFES. FIG. 1.

La greffe A est l'ancienne manière qui ne se trouve ici que pour la comparer avec l'autre.

La greffe B se pratique de même ; mais au lieu d'une seule languette qu'on introduit dans la fente, on laisse une partie latérale revêtue de son écorce, et on la joint immédiatement à l'écorce coupée obliquement du sujet. De cette manière la sève a une voie de plus pour pénétrer dans la greffe, et y monte d'autant plus sûrement, que les deux écorces se coïncident parfaitement au sommet de l'angle que forment les deux languettes.

Le succès de cette sorte de greffe est pour ainsi dire certain. A peine sur cent arbres greffés ainsi avec soin, en manque-t-il cinq ou six.

DÉPLANTOIR. FIG. 2.

EXPLICATION.

Cet instrument est composé de deux boîtes cylindriques de fer blanc ou de cuivre, d'une dimension arbitraire, mais telle cependant que le diamètre ait environ la moitié de la hauteur. Le plus petit ne peut guères avoir moins de deux pouces et demi sur six. Le plus grand peut avoir six pouces sur douze ou treize. Il est bon d'en avoir de différentes grandeurs. La boîte extérieure A est garnie à son sommet de deux saillies ou mains appuyées par

deux tasseaux pour les rendre plus solides. Le dedans est entièrement vide, sans couvercle ni fond. La boîte intérieure B doit entrer librement dans l'extérieure, et s'en ôter facilement, sans cependant qu'il y ait d'intervalle entr'elles. Elle s'ouvre longitudinalement par le moyen des charnières. Elle est garnie à son orifice de deux petites appendices I soudées, et dans son fond, d'un cercle C de la même matière que celle des boîtes, de 3 à 8 lignes de largeur, proportionnément à la grandeur du déplantoir, et soudé sur la circonférence.

USAGE.

Quand on veut enlever en motte une bouture reprise, ou une jeune plante de semis pour la planter en pleine terre, on prend d'abord un déplantoir d'une dimension proportionnée à la force de la plante, ses deux boîtes l'une dans l'autre. On commence par faire le trou où la plante doit être placée, ce qui s'exécute en enfonçant les deux boîtes ensemble, aux deux tiers ou à moitié de leur hauteur dans la terre, par le moyen des deux saillies sur lesquelles les deux mains appuient. A mesure que la boite extérieure s'enfonce, l'intérieure s'élève par la résistance qu'offre à la terre le cercle de son fond, et l'extérieure se remplit en partie, de la terre. Lorsqu'on croit que le trou est assez profond, on retire assez doucement les boîtes, pour que le trou qu'elles ont formé reste bien fait, et qu'il ne s'écroule pas. Les boîtes retirées, on pousse la boîte intérieure en appuyant du pouce sur les deux petites appendices, pour faire sortir toute la terre qui se trouve dans la boîte extérieure, et pour l'en vider entièrement.

Cela fait, on ôte la boîte intérieure, on l'ouvre, et on embrasse de son fond la plante qu'on veut enlever. On ferme la boîte de manière que la tige de la plante se trouve au milieu de son intérieur. On remet ensuite la boîte extérieure, et l'on répète la même opération qu'on a faite pour former le trou, en appuyant sur ses deux saillies. La motte s'enlève et tient dans la boîte extérieure, tandis que l'autre s'élevant l'assujettit par le cercle de son fond. La plante enlevée avec ses racines, on la porte dans le trou qu'on a pratiqué, et en poussant en bas la boîte intérieure; la motte remplit parfaitement le trou, et la plante est placée sans être au-





Gravé par Tardieu l'aîné Rue de Sorbonne N.° 10.

cunement endommagée et sans autres soins. On peut, par le moyen de cet instrument, porter sans risque les plantes enlevées en motte à de grandes distances sans qu'elles puissent en souffrir.

La même opération à lieu pour les plantes qui doivent être mises dans des vases, à la réserve qu'on n'est pas obligé de faire préalablement un trou. On met un tuileau et un peu de terre au fond du pot, et l'on y place avec les boîtes qu'on retire ensuite, la plante enlevée en motte, ayant seulement attention que la dimension du pot et celle du déplantoir soient les mêmes ou à peu de chose près.

Ces différentes opérations se font en aussi peu de tems qu'on peut en mettre pour en lire le détail. Dans une minute le trou est fait, et la plante enlevée et replantée.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

CULTURE.

Les arbres résineux se plaisent dans les bons fonds de terre. Ils font peu de progrès dans les situations entièrement exposées à l'impétuosité des grands vents, sur-tout près des côtes maritimes. Excepté le pin d'Ecosse pour le nord, et le pin maritime pour le midi, les vents de mer font périr leur sommet, et causent leur dépérissement. Les terreaux, les terres amendées leur nuisent. Leur semis doit être fait dans la terre franche avec l'addition d'un tiers de sable, et à l'exposition du nord-est.

Les arbres forestiers, tels que les frênes, les ormes, les tilleuls, les chênes, les érables, les hêtres, s'élèvent rapidement dans les vallées. Ils languissent dans les lieux en butte à toutes les intempéries de l'air, et dans les terres glaiseuses et crétacées, surtout les quatre premiers. Les deux derniers, ainsi que le frêne, moins délicats y résistent; mais leur végétation est extrêmement lente, et souvent, à l'exception du hêtre, ils y deviennent rabougris.

Le tulipier et les magnoliers aiment les terres franches, jaunâtres et consistantes sans être fortes

ni glaiseuses. Ils se refusent aux sols trop légers et à ceux qui retiennent trop longtems l'humidité.

Les platanes, les peupliers, les aunes se plaisent dans les situations fraîches et abritées. Excepté l'aune qui croît et se multiplie assez également dans les sols crayeux et dans les lieux aquatiques, les autres ne s'élèvent pas dans les positions trop ouvertes, sur les hauteurs et dans les terres naturellement sèches.

Les semis des arbres forestiers et des autres de la même grandeur doivent être faits, aussitôt après la maturité de leurs graines, dans les terres franches un peu amendées, et qui ne laissent pas échapper trop promptement l'humidité.

La plupart des arbrisseaux toujours verts, à la réserve des résineux, ne peuvent se maintenir en pleine terre, dans les pays septentrionaux de la France, qu'aux expositions du nord, sans être trop ouvertes, et dans des sols plus secs qu'humides, et d'une médiocre qualité.

Tous les arbrisseaux et les plantes herbacées qui croissent sur les hautes montagnes, sur les rochers et dans les marais, et qui ont pour racines des fibres capillaires ou chevelues, extrêmement déliées, exigent une terre très-légère, comme le sable noir ou le terreau de bruyère dans lesquels leurs foibles racines puissent aisément pénétrer. Ils se refusent aux terres franches. Ils aiment l'ombre, la fraîcheur et l'exposition de l'est.

La plantation des arbres qui perdent leurs feuilles se fait avec plus de succès en automne qu'au prin-

tems; celle des arbres et arbrisseaux toujours verts réussit plus sûrement au printems qu'en automne.

HAUTEUR DES PLANTES.

La hauteur des plantes, sur-tout des herbacées, n'a pu être déterminée dans cet ouvrage. Elle a été généralement prise d'après celle que les plantes ont dans les lieux où la nature les a placées; cultivées dans les jardins, elles en prennent une souvent plus grande, et relative à la terre et à la situation qu'on leur a données.

COULEURS DES FLEURS.

Les couleurs des fleurs, principalement dans les nuances du pourpre, et les différens verts des feuilles, sont très-sujets à varier. Il ne faut dans certaines fleurs exposées au soleil que peu d'heures pour changer leurs nuances. Les unes se décolorent à l'ombre, tandis que les autres y acquièrent une teinte plus animée que leurs semblables placées au grand jour. Le sol n'influe pas moins sur elles. Une terre de mauvaise qualité cause souvent la dégénération de leurs couleurs; de vives qu'elles étoient, elles passent au pâle et même au blanc. Un géranion batrachioïde dont les fleurs sont grandes et d'un beau bleu, que j'ai planté dans un terrein très-médiocre, a donné,

l'année suivante, des fleurs panachées de blanc et de bleu; l'année d'après, toutes ont été blanches, et cette couleur s'est maintenue ensuite dans le meilleur sol. C'est ainsi que l'on a acquis la plupart des plantes panachées, dont plusieurs recouvrent leur verdure, en quittant leurs panaches, lorsqu'on les met dans une bonne terre. Le sycomore panaché et les houx font cependant une exception, le premier conserve ses panaches avec la plus forte végétation, les seconds les maintiennent de même, mais leurs pousses sont beaucoup plus foibles que celles des individus entièrement verts.

Plusieurs circonstances produisant un changement dans les couleurs, on ne doit donc pas s'étonner si, dans cet ouvrage, où elles sont indiquées, on ne trouve pas toujours la nuance pareille à celle de la fleur qu'on considère; mais si la nuance ne peut être fixe, la couleur primitive ne change guères; l'altération se fait dans sa teinte et passe rarement à une autre couleur, sinon dans le cas de la fin du cours végétatif de la plante ou du dépérissement de la partie colorée. Les fleurs jaunes sont les plus consistantes: elles conservent leurs nuances à l'ombre comme au soleil; mais, ainsi que les autres, elles tendent, en se fanant, à devenir blanches. Quelques-unes se changent en rouge, comme quelques onagres. Les camaras semblent devoir être exceptés de cette sorte de règle: leurs fleurs sont jaunes; mais peu de jours après l'épanouissement, elles deviennent rouges, et dans cet état, elles croissent encore, élargissent leurs corolles, et donnent à cette dernière couleur

plus d'intensité. Deux personnes qui les verroient chacune séparément dans ces deux états, ne s'accorderoient certainement pas sur leur couleur véritable. Cependant elle est réellement jaune ; et si elle se change en rouge, c'est l'effet de l'air, de la lumière, et d'une modification arrivée dans les parties constituantes de la corolle qui réfléchissent à nos yeux d'autres rayons.

Les couleurs ne peuvent sans doute faire partie du caractère essentiel d'une plante, mais c'est un accessoire utile et le plus sensible qu'on ne doit pas négliger. Linné et d'autres botanistes qui ont, pour ainsi dire, pris à tâche de l'exclure, ont été néanmoins obligés de s'en servir dans les divisions des espèces de certains genres, et même pour quelques-unes. Il me paroît d'ailleurs plus rare qu'une plante simple et croissant naturellement change sa couleur, que des espèces n'aient pas des variations dans leurs parties essentielles, qui les éloignent du caractère du genre dans lequel on les a placées.

DIMENSION DES FEUILLES.

Tout ce qui peut servir à distinguer une espèce d'avec une autre, devroit entrer dans la description d'une plante. On ne sauroit fournir trop de moyens sensibles pour parvenir à sa connoissance. Dans les descriptions des animaux, on expose la dimension de leurs parties essentielles. Pourquoi ne feroit-on pas de même dans celles des végétaux ? Les feuilles sont

pour ces derniers des organes nécessaires, dont la dimension donnée peut à l'instant enlever toute incertitude sur la nomenclature. Si la culture, l'âge et le terrein la changent quelquefois, il est rare qu'une plante adulte, et croissant dans une terre ordinaire, varie dans la forme et la dimension de ses feuilles prises dans la partie moyenne de sa hauteur. La plupart des végétaux ont leurs feuilles ovales ou lancéolées; une petite feuille de 3 à 4 lignes de longueur est alors indiquée comme celle d'un pied. Un thym et un bananier les ont de la même forme, et cependant la distance qui se trouve entre leur dimension est immense. Mais sans comparer un genre avec un autre, le caractère générique devant être seul employé, je desirerois du moins que, dans les espèces d'un même genre où la dimension des feuilles est tout-à-fait différente, on ne négligeât pas ce moyen simple d'en distinguer plusieurs. Si, en montrant à une personne la famille des érables, on lui dit que celui de Crète a les plus petites feuilles, elle le reconnoîtra sans peine; ce qu'elle n'auroit pu faire qu'avec incertitude par les simples phrases de ces espèces. Miller et quelques autres auteurs ont donné cette dimension, mais souvent la différence n'étoit pas assez sensible pour qu'on pût s'y attacher. Je ne voudrois donc pas qu'elle eut lieu pour les espèces dont les feuilles ne diffèrent que de quelques lignes, mais à l'égard de celles qui en ont d'une grandeur disproportionnée, avec la même forme. Celle-ci étant différente, l'indication devient inutile.

En commençant cet ouvrage, j'avois le dessein de

joindre aux courtes descriptions cet accessoire, mais j'ai craint le volume. Cependant il y avoit un moyen de l'employer sans augmenter le nombre des pages, par deux lignes en croix placées à la marge vis-à-vis des espèces, qui auroient fait connoître la dimension en longueur et largeur, d'après une échelle déterminée. Cette idée m'étant venue trop tard, j'ai borné cette indication à quelques espèces.

Je crois qu'à l'égard de plusieurs plantes du même genre, cette circonstance me paroît utile pour la plus prompte connoissance des espèces. Il ne s'agit pas seulement de bien fonder les caractères, il faut encore rendre autant que l'on peut les élémens faciles. Ceux qui excellent dans les sciences, n'oublient que trop souvent que les commencemens sont toujours pénibles. Ce n'est cependant qu'en aidant ces derniers, que les premières se font goûter, se répandent et acquièrent une considération générale.

Les noms des espèces qui ne sont pas suivis de ceux des auteurs, se trouvent dans Linné ou dans les auteurs qui ont donné des éditions postérieures de son système.

J'aurois desiré de pouvoir insérer dans cet ouvrage plusieurs autres plantes nouvelles cultivées à Londres, et la description de quelques-unes que je n'ai pu que citer; mais la guerre, et principalement les dernières

hostilités, qui ont rendu très-difficiles les communications avec l'Angleterre, ont mis à mes intentions un obstacle qu'il m'a été impossible de surmonter, malgré tous les moyens que j'ai employés, et qui n'ont abouti qu'à me causer la perte d'envois précieux. N'ayant absolument aucun autre intérêt à cet ouvrage que celui d'être utile à mes concitoyens et aux progrès de la science, je compte, aussitôt que ces nouvelles acquisitions végétales seront parvenues à ma connoissance, et que j'aurai pu les examiner et cultiver, en donner la description et la culture dans un supplément que l'on pourra joindre à ce dernier volume.

SERIE

DES ORDRES NATURELS

ET

DE LEURS GENRES,

QUI SE TROUVENT DANS CET OUVRAGE.

TOME I.

PREMIÈRE DIVISION.

LES ACOTYLÉDONES.

CLASSE I.

PLANTES ACOTYLÉDONES. P. 281

ORDRE I.

LES CHchampignons. *FUNGI.* 282

1re. Section.

Moisissure. *Mucor.*
Vesse de loup. *Lycoperdon.*
Truffe. *Tuber.*
Clathre. *Clathrus.*

2.

Satyre. *Phallus.*
Morille. *Boletus.*
Pézize. *Peziza.*
Chanterelle. *Cantarellus.*
Amanite. *Amanita.*
Erinace. *Hydnum.*

3.

Agaric. *Agaricus.*
Mérule. *Merulius.*
Auriculaire. *Auricularia.*

4.

Clavaire. *Clavaria.*

ORDRE II.

LES ALGUES. *ALGÆ.* 289

1re. Section.

Bysse. *Byssus.*

Conferve. *Conferva.*
Tremelle. *Tremella.*

2.

Ulve. *Ulva.*
Varec. *Fucus.*

3.

Cyathe. *Cyathus.*
Lichen. *Lichen.*

ORDRE III.

Les hépatiques. *hepaticæ.* 295

Jungermanne. *Jungermannia.*
Hépatique. *Marchantia.*
Riccie. *Riccia.*

ORDRE IV.

Les mousses. *musci.* 297

1re. Section.

Splanc. *Splachnum.*
Polytric. *Polytricum.*
Mnie. *Mnium.*
Hypne. *Hypnum.*

2.

Fontinale. *Fontinalis.*
Bry. *Bryum.*
Phasque. *Phascum.*
Sphaigne. *Sphagnum.*

3.

Lycopode. *Lycopodium.*

ORDRE V.

Les fougères. *filices.* 301

1re. Section.

Ophioglosse. *Ophioglossum.*
Onoclée. *Onoclea.*
Osmonde. *Osmunda.*

2.

Acrostique. *Acrostichum.*
Polypode. *Polypodium.*
Doradille. *Asplenium.*
Hémionite. *Hemionitis.*
Blègne. *Blechnum.*
Fougère. *Pteris.*
Capillaire. *Adiantum.*
Trichomanes.

3.

Zamie. *Zamia.*
Cycas.

4.

Pilulaire. *Pilularia.*

5.

Isote. *Isoete.*
Prêle. *Equisetum.*

ORDRE VI.

Les naïades. *nayades* 318

1re. Section.

Pesse. *Hippuris.*

2.

Charagne. *Chara.*
Cornifle. *Ceratophyllum.*
Volant d'eau. *Myriophyllum.*
Naïade. *Naias.*
Saurure. *Saururus.*
Aponogeton.
Epi d'eau. *Potamogeton.*
Ruppie. *Ruppia.*

Zanichelle. *Zanichellia.*
Callitric. *Callitriche.*

3.

Lenticule. *Lenticula.*

SECONDE DIVISION.

LES MONOCOTYLÉDONES. 325

CLASSE II.

PLANTES MONOCOTYLÉDONES.

Etamines hypogynes. 326

ORDRE I.

LES AROÏDES. *AROIDEÆ.* 327

1re. Section.

Zostère. *Zostera.*
Gouet. *Arum.*
Calle. *Calla.*
Draconte. *Dracontium.*
Pothos.

2.

Oroncę. *Orontium.*
Acore. *Acorus.*

ORDRE II.

LES MASSETTES. *TYPHÆ.* 335

Massette. *Typha.*
Rubanier. *Sparganium.*

ORDRE III.

LES SOUCHETS. *CYPEROIDEÆ.* 336

1re. Section.

Caret. Laiche. *Carex.*

2.

Choin. *Schœnus.*
Linaigrette. *Eriophorum.*
Scirpe. *Scirpus.*
Souchet. *Cyperus.*
Killingie. *Killingia.*

ORDRE IV.

LES GRAMINÉES. *GRAMINEÆ.* 347

1re. Section.

Flouve. *Anthoxanthum.*
Cinna.

2.

Vulpin. *Alopecurus.*
Fléau. *Phlœum.*
Phalaris.
Paspal. *Paspalum.*
Panis. *Panicum.*
Millet. *Milium.*
Agrostis.
Stipe. *Stipa.*
Lagurier. *Lagurus.*
Sucre. *Saccharum.*

3.

Houque. *Holcus.*
Barbon. *Andropogon.*

4.

Tripsaque. *Tripsacum.*
Racle. *Cenchrus.*
Egilope. *Ægilops.*
Rottbolle. *Rottboellia.*

5.

Canche. *Aira.*
Mélique. *Melica.*

6.

Dactyle. *Dactylis.*

7.

Cretelle. *Cynosurus.*
Yvraie. *Lolium.*
Elyme. *Elymus.*
Orge. *Hordeum.*
Froment. *Triticum.*
Seigle. *Secale.*

8.

Brome. *Bromus.*
Fétuque. *Festuca.*
Paturin. *Poa.*
Uniole. *Uniola.*
Brize. *Briza.*
Avoine. *Avena.*
Roseau. *Arundo.*

9.

Riz. *Oryza.*

10.

Sparte. *Lygæum.*
Maïs. *Zea.*

11.

Olyra.
Coqueluchiole. *Cornucopiæ.*
Larmille. *Coix.*

CLASSE III.

PLANTES MONOCOTYLÉDONES.

Etamines périgynes. 399

ORDRE I.

LES PALMIERS. *PALMÆ.* 400

1re. Section.

Dattier. *Phœnix.*
Arec. *Areca.*
Indel. *Elate.*
Cocotier. *Cocos.*
Avoira. *Elais.* Tom. IV.

2.

Coryphe. *Corypha.*
Rondier. *Lontarus.*
Camérope. *Chamærops.*

ORDRE II.

LES ASPERGES. *ASPARAGI.* 407

1re. Section.

Dragonier. *Dracæna.*
Dianelle. *Dianella.*
Flagellaire. *Flagellaria.*
Asperge. *Asparagus.*
Médéole. *Medeola.*
Trillium.
Parisette. *Paris.*
Muguet. *Convallaria.*

2.

Fragon. *Ruscus.*
Smilace. *Smilax.*
Igname. *Dioscorea.*

3.

Tame. *Tamnus.*
Rajane. *Rajania.*

ORDRE III.

LES JONCS. *JUNCI.* 426

1re. Section.

Bragalou. *Aphyllantes.*
Jonc. *Juncus.*

2.

Callise. *Callisia.*

Commeline. *Commelina.*
Ephémérine. *Tradescantia.*

3.

Butome. *Butomus.*
Fluteau. *Damasonium.*
Plantain d'eau. *Alisma.*
Fléchière. *Sagittaria.*

4.

Scheuchzère. *Scheuchzeria.*
Troscart. *Triglochin.*
Narthec. *Narthecium.*
Hélonias.
Mélanthe. *Melanthium.*
Vératre. *Veratrum.*
Colchique. *Colchicum.*

ORDRE IV.

Les lis. *Lilia.* 440

Tulipe. *Tulipa.*
Dent de chien. *Erythronium.*
Superbe. *Methonica.*
Uvulaire. *Uvularia.*
Fritillaire. *Fritillaria.*
Impériale. *Imperialis.*
Lis. *Lilium.*
Yucca.

ORDRE V.

Les ananas. *Bromeliæ.* 452

1re. Section.

Tillandsie. *Tillandsia.*
Pitcairne. *Pitcairnia.*

2.

Ananas. *Bromelia.*
Agave.

ORDRE VI.

Les asphodèles. *Asphodeli.* 458

1re. Section.

Aletris.
Aloës. *Aloe.*

2.

Anthéric. *Anthericum.*
Phalangère. *Phalangium.*
Asphodèle. *Asphodelus.*

3.

Basilée. *Basilæa.*
Jacinthe. *Hyacinthus.*
Lachenale. *Lachenalia.*
Lanaire. *Lanaria.*
Massone. *Massonia.*

4.

Cyanelle. *Cyanella.*
Albuca.
Scille. *Scilla.*
Ornithogale. *Ornithogalum.*

5.

Ail. *Allium.*

ORDRE VII.

Les narcisses. *Narcissi.* 490

1re. Section.

Géthyllide. *Gethyllis.*
Bulbocode. *Bulbocodium.*
Hémérocalle. *Hemerocallis.*
Crinole. *Crinum.*
Tulbagia. *Id.*

2.

Hémanthe. *Hæmanthus.*
Amaryllis.

Amaryllis.
Pancrais. *Pancratium.*
Narcisse. *Narcissus.*
Perceneige. *Leucoium.*
Galantine. *Galanthus.*

3.

Hypoxis.
Pontederia.
Tubéreuse. *Polyanthes.*
Alstremère. *Alstrœmeria.*

ORDRE VIII.

Les iris. *Irides.* 513

1re. Section.

Bermudienne. *Sisyrinchium.*
Tigride. *Tigridia.*
Ferrare, *Ferraria.*

2.

Iris.
Morée. *Moræa.*
Ixie. *Ixia.*
Glayeul. *Gladiolus.*
Antholize. *Antholiza.*
Safran. *Crocus.*

3.

Wachendorfe *Wachendorfia.*

CLASSE IV.

Plantes monocotylédones.

Etamines épigynes. 535

ORDRE I.

Les bananiers. *Musae.* 536
Bananier. *Musa.*
Bihai. *Heliconia.*

ORDRE II.

Les balisiers. *Cannae.* 540

Balisier. *Canna.*
Globbée. *Globba.*
Amome. *Amomum.*
Costus.
Alpinie. *Alpinia.*
Galangà. *Maranta*
Curcuma
Zédoaire. *Kæmpferia.*

ORDRE III.

Les orchidées. *Orchideae.* 546

Orquis. *Orchis.*
Satyrion. *Satyrium.*
Ophrys.
Elléborine. *Serapias.*
Limodore. *Limodorum.*
Sabot. *Cypripedium.*
Aréthuse. *Arethusa.*
Angrec. *Epidendrum.*

ORDRE IV.

Les morrènes. *Hydrocharides.* 559

Stratiote. *Stratiotes.*
Morrène. *Hydrocharis.*
Nénuphar. *Nymphæa.*
Macre. *Trapa.*

TROISIÈME DIVISION.

LES DICOTYLÉDONES. 563

CLASSE V.

PL. DICOTYLÉDONES APÉTALES.

Etamines épigynes. 564

ORDRE I.

LES ARISTOLOCHES. *ARISTOLOCHIÆ.* 564

Aristoloche. *Aristolochia.*
Asaret. *Asarum.*
Hypociste. *Cytinus.*

CLASSE VI.

PL. DICOTYLÉDONES APÉTALES.

Etamines périgynes. 569

ORDRE I.

LES CHALEFS. *ELÆAGNI.* 570

1re. Section.

Thésion. *Thesium.*
Rouvet. *Osyris.*
Fusanus.
Argoussier. *Hippophae.*
Chalef. *Elæagnus.*
Tupelo. *Nyssa.*
Conocarpe. *Conocarpus.*

2.

Grignon. *Bucida.*
Badamier. *Terminalia.*

ORDRE II.

LES THYMELÉES. *THYMELEÆ.* 577

Dirca.
Laureola. Thymelée. *Daphne.*
Passerine. *Passerina.*
Stellère. *Stellera.*
Struthiole. *Struthiola.*
Lachnée. *Lachnea.*
Daïs.
Gnidienne. *Gnidia.*

ORDRE III.

LES PROTÉES. *PROTEÆ.* 586

Protée. *Protea.*
Banksie. *Banksia.*

ORDRE IV.

LES LAURIERS. *LAURI.* 594

Laurier. *Laurus.*
Hernandier. *Hernandia.*

ORDRE V.

LES POLYGONÉES. *POLYGONEÆ.* 600

Raisinier. *Coccoloba.*
Atraphace. *Atraphaxis.*
Renouée. *Polygonum.*
Patience. *Rumex.*
Rhubarbe. *Rheum.*
Kénige. *Kœnigia.*
Calligon. *Calligonum.*

ORDRE VI.

Les arroches. *Atriplices.* 614

1re. Section.

Phytolacca.
Rivine. *Rivinia.*
Bosé. *Bosea.*

2.

Pétivier. *Petiveria.*
Polycnème. *Polycnemum.*
Camphrée. *Camphorosma.*
Galiène. *Galenia.*

3.

Baselle. *Basella.*
Soude. *Salsola.*
Epinard. *Spinacia.*
Bette. *Beta.*
Anserine. *Chenopodium.*
Arroche. *Atriplex.*

4.

Axyris.
Blète. *Blitum.*
Salicorne. *Salicornia.*

5.

Corisperme. *Corispermum.*

CLASSE VII.

Pl. dicotylédones apétales.

Etamines hypogynes. 636

ORDRE I.

Les amaranthes. *Amaranthi.* 637

1re. Section.

Amaranthe. *Amaranthus.*
Passe-velours. *Celosia.*
Œrve. *Œrua.*

2.

Iresine.
Cadelari. *Achyranthes.*
Amaranthine. *Gomphrena.*
Illecebrum.

3.

Panarine. *Paronichia.*
Turquette. *Herniaria.*

ORDRE II.

Les plantains. *Plantagines.* 649

Pulicaire. *Psyllium.*
Plantain. *Plantago.*
Littorelle. *Littorella.*

ORDRE III.

Les nictages. *Nyctagines.* 653

Nictage. *Nyctago.*
Boerhaave. *Boerhaavia.*
Pisone. *Pisonia.*

ORDRE IV.

Les dentelaires. *Plumbagines.* 657

Dentelaire. *Plumbago.*
Staticée. *Statice.*

CLASSE VIII.

P. DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES.

Corolle hypogyne. 663

ORDRE I.

LES LYSIMACHIES. *LYSIMACHIÆ.* 664

1re. Section.

Centenille. *Centunculus.*
Mouron. *Anagallis.*
Lysimachie. *Lysimachia.*
Hottone. *Hottonia.*
Coris.
Limoselle. *Limosella.*
Trientale. *Trientalis.*
Arétie. *Aretia.*

2.

Androsace. *Androsace.*
Primevère. *Primula.*
Cortuse. *Cortusa.*
Soldanelle. *Soldanella.*
Gyroselle. *Dodecatheon.*
Cyclame. *Cyclamen.*

3.

Globulaire. *Globularia.*
Samole. *Samolus.*
Utriculaire. *Utricularia.*
Grassette. *Pinguicula.*
Ményanthe. *Menyanthes.*

ORDRE II.

LES PÉDICULAIRES. *PEDICULARES.* 683

1re. Section.

Polygale. *Polygala.*
Véronique. *Veronica.*
Sibtorpie. *Sibtorpia.*
Disandre. *Disandra.*

2.

Erine. *Erinus.*
Manulée. *Manulea.*
Euphraise. *Euphrasia.*
Bartsie. *Bartsia.*
Pédiculaire. *Pedicularis.*
Cocrète. *Rhinanthus.*
Mélampyre. *Melampyrum.*

3.

Orobanche.
Clandestine. *Clandestina.*

ORDRE III.

LES ACANTHES. *ACANTHI.* 700

1re. Section.

Acanthe. *Acanthus.*
Barrelière. *Barleria.*
Ruellie. *Ruellia.*

2.

Carmantine. *Justicia.*

ORDRE IV.

LES JASMINÉES *JASMINEÆ.* 708

1re. Section.

Lilas. *Lilac.*
Frêne. *Fraxinus.*

2.

Chionanthe. *Chionanthus.*
Olivier. *Olea.*

Filaria. *Phyllirea.*
Mogori. *Mogorium.*
Jasmin. *Jasminum.*
Troëne. *Ligustrum.*

ORDRE V.

Les GATTILIERS. *VITICES.* 727

1re. Section.

Péragut. *Clerodendrum.*
Volkamer. *Volkameria.*
Ægiphile. *Ægiphila.*
Gattilier. *Vitex.*
Callicarpe. *Callicarpa.*
Agnante. *Cornutia.*
Tek. *Tectona.*

2.

Cotelet. *Cytharexylum.*
Durante. *Duranta.*
Camara. *Lantana.*
Spilman. *Spilmannia.*
Verveine. *Verbena.*

3.

Eranthème. *Eranthemum.*
Sélague. *Selago.*
Hébenstrete. *Hebenstretia.*

TOME II.

ORDRE VI.

Les LABIÉES. *LABIATÆ.* Pag. 5

1re. Section.

Lycope. *Lycopus.*
Améthyste. *Amethystea.*
Cunile. *Cunila.*
Ziziphore. *Ziziphora.*
Monarde. *Monarda.*
Romarin. *Rosmarinus.*
Sauge. *Salvia.*
Collinsone. *Collinsonia.*

2.

Bugle. *Ajuga. Bugula.*
Germandrée. *Teucrium.*

3.

Sarriette. *Satureia.*
Hysope. *Hyssopus.*
Chataire. *Nepeta.*
Pérille. *Perilla.*
Lavande. *Lavandula.*
Crapaudine. *Sideritis.*
Menthe. *Mentha.*
Terrète. *Glecoma.*
Lamier. *Lamium.*
Galéope. *Galeopsis.*
Bétoine. *Betonica.*
Stachide. *Stachys.*
Ballote. *Ballota.*
Marrube. *Marrubium.*
Agripaume. *Leonurus.*
Phlomide. *Phlomis.*
Molucelle. *Molucella.*

4.

Clinopode. *Clinopodium.*
Origan. *Origanum.*
Thym. *Thymus.*
Thymbra.
Mélisse. *Melissa.*
Dracocéphale. *Dracocephalum.*
Mélissot. *Melittis.*
Germaine. *Germanea.*
Basilic. *Ocymum.*

Trichostema.
Brunelle. *Brunella.*
Toque. *Scutellaria.*
Prasi. *Prasium.*

ORDRE VII.

LES SCROPHULAIRES. *SCROPHULARIAE.* 82

1re. Section.

Bulège. *Budleja.*
Scopaire. *Scoparia.*
Capraire. *Capraria.*
Haller. *Halleria.*
Scrophulaire. *Scrophularia.*
Dodart. *Dodartia.*
Gérarde. *Gerardia.*
Linaire. *Linaria.*
Muflier. *Antirrhinum.*
Digitale. *Digitalis.*

2.

Calcéolaire. *Calceolaria.*

3.

Colomnée. *Columnea.*
Beslère. *Besleria.* Tom. IV.
Gratiole. *Gratiola.*
Mimule. *Mimulus.*

4.

Broualle. *Browallia.*

ORDRE VIII.

LES SOLANÉES. *SOLANEAE.* 105

1re. Section.

Celsie. *Celsia.*
Hémithome. *Hemithomus.*
Molène. *Verbascum.*
Jusquiame. *Hyoscyamus.*
Tabac. *Nicotiana.*
Stramoine. *Stramonium.*

2.

Mandragore. *Mandragora.*
Belladone. *Atropa.*
Coqueret. *Physalis.*
Morelle. *Solanum.*
Piment. *Capsicum.*
Liciet. *Lycium.*
Cestreau. *Cestrum.*

3.

Daphnot. *Bontia.*
Brunsfel. *Brunsfelsia.*
Calebassier. *Crescentia.*

ORDRE IX.

LES BORRAGINÉES. *BORRAGINEAE.* 144

1re. Section.

Patagonule. *Patagonula.*
Sébestier. *Cordia.*
Cabrillet. *Ehretia.*
Varrone. *Varronia.*
Pittone. *Tournefortia.*

2.

Hydrophylle. *Hydrophyllum.*
Ellise. *Ellisia.*
Arguze. *Messerschmidia.*
Mélinet. *Cerinthe.*

3.

Coldène *Coldenia.*
Héliotrope. *Heliotropium.*
Vipérine. *Echium.*

Grémil. *Lithospermum.*
Pulmonaire. *Pulmonaria.*
Onosme. *Onosma.*

4.

Consoude. *Simphytum.*
Lycopaide. *Lycopsis.*
Scorpionne. *Myosotis.*
Buglose. *Anchusa.*
Bourrache. *Borrago.*
Rapette. *Asperugo.*
Cynoglosse. *Cynoglossum.*

5.

Nolane. *Nolana.*
Falkie. *Falkia.*

ORDRE X.

Les liserons. *Convolvuli.* 171

1re. Section.

Liseron. *Convolvulus.*
Quamoclit. *Ipomœa.*

2.

Liserolle. *Evolvulus.*

3.

Cuscute. *Cuscuta.*

ORDRE XI.

Les polemoines. *Polemonia.* 182

Phlox.
Polémoine. *Polemonium.*
Cantu. *Cantua.*
Lightfootia.

ORDRE XII.

Les bignones. *Bignoniae.* 186

1re. Section.

Galane. *Chelone.*
Sésame. *Sesamum.*

2.

Catalpa.
Técoma.
Bignone. *Bignonia.*

3.

Cornaret. *Martynia.*
Pedalium.

ORDRE XIII.

Les gentianes. *Gentianae.* 197

1re. Section.

Gentiane. *Gentiana.*
Swertie. *Swertia.*
Chlore. *Chlora.*

2.

Chirone. *Chironia.*

3.

Spigélie. *Spigelia.*

ORDRE XIV.

Les apocinées. *Apocineae.* 206

1re. Section.

Pervenche. *Vinca.*
Tabernier. *Tabernæmontana.*
Franchipanier. *Plumeria.*
Camerier. *Cameraria.*

2.

Laurose. *Nerium.*
Echite. *Echites.*
Cérope'ge. *Ceropegia.*

Stapélie. *Stapelia.*
Périploque. *Periploca.*
Apocin. *Apocinum.*
Cynanque. *Cynanchum.*
Asclépiade. *Asclepias.*

3.

Allamanda.
Mélodin. *Melodinus.*
Rauvolfe. *Rauvolfia.*
Serpentine. *Ophyoxylon.*
Ahouai. *Cerbera.*
Calac. *Carissa.*

4.

Vomique. *Strychnos.*
Jasminée. *Gelseminum.*

ORDRE XV.

LES SAPOTELLIERS. *SAPOTAE.* 233

Jacquinier. *Jacquinia.*
Argan. *Sideroxylon.*
Caimitier. *Chrysophyllum.*
Lucuma.
Sapotillier. *Achras.*

Myrsine. *Myrsine.*
Lée. *Leea.*

CLASSE IX.

P. COTYLÉDONES MONOPÉTALES. 241

Corolle périgyne.

ORDRE I.

LES PLAQUEMINIERS. *GUAIACANAE.* 242

1re. Section.

Plaqueminier. *Diospyros.*
Royène. *Royena.*
Aliboufier. *Styrax.*
Halésie. *Halesia.*

2.

Hopée. *Hopea.*

ORDRE II.

LES ROSAGES. *RHODODENDRA.* 249

1re. Section.

Kalmie. *Kalmia.*
Rosage. *Rhododendron.*
Azalée. *Azalea.*

2.

Rhodore. *Rhodora.*
Lédier. *Ledum.*
Béfar. *Befaria.*
Ité. *Itea.*

ORDRE III.

LES BRUYÈRES. *ERICAE.* 262

1re. Section.

Cyrille. *Cyrilla.*
Blairie. *Blæria.*
Bruyère. *Erica.*
Andromède. *Andromeda.*
Arbousier. *Arbutus.*
Clethra.
Pyrole. *Pyrola.*
Epigée. *Epigæa.*
Gaultherie. *Gaultheria.*

2.

Airelle. *Vaccinium.*

3.

Camarine. *Empetrum.*

ORDRE IV.

Les CAMPANULACÉES. *CAMPANULACEAE.* 300

1re. Section.

Canarine. *Canarina.*
Campanule. *Campanula.*
Trachélie. *Trachelium.*
Roella.
Gesnère. *Gesneria.*
Phyteume. *Phyteuma.*

2.

Lobélie. *Lobelia.*
Jasione. *Jasione.*
Goodenie. *Goodenia.*

CLASSE X.

P. DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES.

Corolle épigyne. Anthères réunies. 319

ORDRE I.

Les CHICORACÉES. *CICHORACEAE.* 320

1re. Section.

Lampsane. *Lampsana.*
Rhagadiole. *Rhagadiolus.*

2.

Prenanthe. *Prenanthes.*
Condrille. *Chondrilla.*
Laitue. *Lactuca.*
Laitron. *Sonchus.*
Epervière. *Hieracium.*
Crépide. *Crepis.*
Drépanie. *Drepania.*
Hédypnoïde. *Hedypnois.*
Hyoséride. *Hyoseris.*
Pissenlit. *Taraxacum.*

3.

Liondent. *Leontodon.*
Picride. *Picris.*
Helmintie. *Helmintia.*
Scorzonère. *Scorzonera.*
Salsifis. *Tragopogon.*
Barbouquine. *Urospermum.*

4.

Geropogon.
Porcelle. *Hypochæris.*
Sériole. *Seriola.*
Andryale. *Andryala.*

5.

Cupidone. *Catananche.*
Chicorée. *Cichorium.*
Scolyme. *Scolymus.*

ORDRE II.

Les CYNAROCÉPHALES. *CYNAROCEPHALAE.* 354

1re. Section.

Atractyle. *Atractylis.*
Quenouille. *Cnicus.*
Carthame. *Carthamus.*
Stokésie. *Stokesia.*
Carline. *Carlina.*
Artichaut. *Cynara.*
Pelane. *Onopordon.*
Chardon. *Carduus.*
Bardane. *Lappa.*
Centaurée. — *Crocodilium.*
— Chaussetrape. *Calcitrapa.*
— Stebé. *Seridia.*

— Jacée. *Jacea.*
— Bleuet. *Cyanus.*
— Zégée. *Zœgea.*
— Rhapontic. *Rhaponticum.*
— Centaurée. *Centaurea.*
Sarrête. *Serratula.*
Pteronia.
Stéline. *Sthœhelina.*

2.

Boulette. *Echinops.*
Corymbiole. *Corymbium.*
Sphœranthus.
Gundèle. *Gundelia.*

ORDRE III.

LES CORYMBIFÈRES. *CORYMBIFERÆ.* 391

1re. Section.

Cacalie. *Cacalia.*
Eupatoire. *Eupatorium.*
Stévie. *Stevia.*
Agérate. *Ageratum.*
Eléphantope. *Elephantopus.*
Immortelle. *Xeranthemum.*
Gnaphale. *Gnaphalium.*
Leysère. *Leysera.*
Armoselle. *Seriphium.*
Conyze. *Conyza.*
Bacchante. *Baccharis.*
Crysocome. *Chrysocoma.*

2.

Vergerolle. *Erigeron.*
Astère. *Aster.*
Verge d'or. *Solidago.*
Inule. *Inula.*
Perdicium.
Tussilage. *Tussilago.*
Séneçon. *Senecio.*
Cinéraire. *Cineraria.*
Othonne. *Othonna.*
Didelta.
Tagète. *Tagetes.*
Bellium.
Doronic. *Doronicum.*
Arnique. *Arnica.*
Gortère. *Gorteria.*

3.

Porteoollier. *Osteospermum.*
Souci. *Calendula.*
Chrysanthême. *Chrysanthemum.*
Matricaire. *Matricaria.*
Paquerette. *Bellis.*
Cénie. *Cenia.*
Lidbeckia.

4.

Cotule. *Cotula.*
Grangée. *Grangea.*
Ethulie. *Ethulia.*
Carpésie. *Carpesium.*
Hippie. *Hippia.*
Tanaisie. *Tanacetum.*
Armoise. *Artemisia.*

5.

Tarconanthe. *Tarconanthus.*
Calea.
Athanasie. *Athanasia.*
Micrope. *Micropus.*
Santoline. *Santolina.*
Anacycle. *Anacyclus.*
Camomille. *Anthemis.*
Achillée. *Achillea.*
Eriocéphale. *Eriocephalus.*
Buphtalme. *Buphtalmum.*
Encelie. *Encelia.*

Millerie. *Millera.*
Sigesbeckia.
Polymnie. *Polymnia.*
Baltimore. *Baltimora.*
Eclipte. *Eclipta.*

6.

Spilanthe. *Spilanthus.*
Bident. *Bidens.*
Verbesine. *Verbesina.*
Coriope. *Coreopsis.*
Zinnia.
Silphide. *Silphium.*
Mélampode. *Melampodium.*
Hélianthe. *Helianthus.*
Hélénie. *Helenium.*
Rudbecque. *Rudbeckia.*
Galardienne. *Galardia.*
Agryphylle. *Agryphyllum.*

7.

Arctotide. *Arctotis.*
Amelle. *Amellus.*

8.

Iva.
Parthénie. *Parthenium.*

9.

Ambroisie. *Ambrosia.*
Lampourde. *Xanthium.*

CLASSE XI.

P. DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES.

Cor. épigyne. Ant. distinctes. 528

ORDRE. I.

LES DIPSACÉES. *DIPSACEÆ.* 529

1re. Section.

Cardère. *Dipsacus.*
Scabieuse. *Scabiosa.*
Knautie. *Knautia.*

2.

Valériane. *Valeriana.*

ORDRE II.

LES RUBIACÉES. *RUBIACEÆ.* 540

1re. Section.

Shérard. *Sherardia.*
Aspérule. *Asperula.*
Galiet. *Gallium.*
Crucianelle. *Crucianella.*
Croisette. *Valantia.*
Garance. *Rubia.*
Anthosperme. *Anthospermum.*

2.

Houstone. *Houstonia.*
Spermacoce.
Phyllis.

3.

Oldenlandia.
Catesbée. *Catesbœa.*

4.

Gratgal. *Randia.*
Quinquina. *Cinchona.*
Rondelet. *Rondeletia.*
Gardène. *Gardenia.*
Genipayer. *Genipa.*
Portlande. *Portlandia.*

5.

Coutarée. *Coutarea.*

6.

Ixore. *Ixora.*

7.

Ciocoque. *Chiococca.*
Caſſéyer. *Coffea.*
Canti. *Canthium.*
Danaïde. *Pœderia.*

8.

Guettard. *Guettarda.*
Azier. *Nonatelia.*

9.

Hamel. *Hamelia.*

10.

Mitchelle. *Mitchella.*
Céphalanthe. *Cephalanthus.*

11.

Serissa.

ORDRE III.

Les chèvre-feuilles. *caprifolia.* 571

1re. Section.

Linnée. *Linnæa.*
Trioste. *Triosteum.*
Symphoricarpos.
Dierville. *Diervilla.*
Camécerisier. *Xylosteon.*
Chèvre-feuille. *Caprifolium.*

2.

Gui. *Viscum.*

3.

Viorne. *Viburnum.*
Hortense. *Hortensia.*
Sureau. *Sambucus.*

4.

Cornouiller. *Cornus.*
Lierre. *Hedera.*

CLASSE XII.

P. dicotylédones polypétales.

Etamines épigynes. 592

ORDRE I.

Les aralies. *aralia.* 593

Aralie. *Aralia.*
Ginseng. *Panax.*

ORDRE II.

Les ombellifères. *umbelliferae.* 597

1re. Section.

Podagraire. *Ægopodium.*
Boucage. *Pimpinella.*
Carvi. *Carum.*
Persil. *Apium.*
Anet. *Anethum.*
Maceron. *Smyrnium.*
Panais. *Pastinaca.*
Thapsie. *Thapsia.*

2.

Seseli.
Cerfeuil. *Chærophyllum.*
Impératoire. *Imperatoria.*
Myrrhide. *Scandix.*

Coriandre. *Coriandrum.*
Œthuse. *Œthusa.*
Cicutaire. *Cicutaria.*
Phellandri. *Phellandrium.*

3.

Œnanthe.
Cumin. *Cuminum.*
Bubon.
Sison.
Berle. *Sium.*
Angélique. *Angelica.*
Livêche. *Ligusticum.*
Laser. *Laserpitium.*
Berce. *Heracleum.*
Férule. *Ferula.*
Peucédan. *Peucedanum.*
Armarinthe. *Cachrys.*
Bacille. *Crithmum.*
Athamanthe. *Athamantha.*
Selin. *Selinum.*
Cigue. *Cicuta.*
Terrenoix. *Bunium.*
Ammi.
Carotte. *Daucus.*
Caucalide. *Caucalis.*
Tordyle. *Tordylium.*
Hasselquistia.
Artédie. *Artedia.*
Buplèvre. *Buplevrum.*
Astrance. *Astrantia.*
Sanicle. *Sanicula.*

4.

Arctope. *Arctopus.*
Echinophore. *Echinophora.*
Panicaut. *Eryngium.*
Hydrocotyle.
Lagocie. *Lagoecia.*

CLASSE XIII.

P. DICOTYLÉDONES POLYPÉTALES.

Etamines hypogynes. 654

ORDRE I.

LES RENONCULACÉES. *RANUNCULACEAE.* 655

1re. Section.

Glématite. *Clematis.*
Atragène. *Atragene.*
Pigamon. *Thalictrum.*
Hydraste. *Hydrastis.*
Anémone. *Anemone.*
Adonide. *Adonis.*
Renoncule. *Ranunculus.*
Ficaire. *Ficaria.*
Myosure. *Myosurus.*

2.

Trolli. *Trollius.*
Ellébore. *Helleborus.*
Isopyre. *Isopyrum.*
Nielle. *Nigella.*
Garidelle. *Garidella.*
Ancolie. *Aquilegia.*
Dauphinelle. *Delphinium.*
Aconit. *Aconitum.*

3.

Populage. *Caltha.*
Pivoine. *Pœonia.*
Zanthorhize. *Zanthorhiza.*
Cimicaire. *Cimicifuga.*

4.

Actée. *Actæa.*
Podophylle. *Podophyllum.*

ORDRE II.

LES PAPAVÉRACÉES. *PAPAVERACEAE.* 693

1re. Section.

Sanguinaire. *Sanguinaria.*
Argemone.
Pavot. *Papaver.*
Glaucière. *Glaucium.*
Chelidoine. *Chelidonium.*
Boccone. *Bocconia.*

2.

Hypécoon. *Hypecoum.*
Fumeterre. *Fumaria.*

ORDRE III.

LES CRUCIFÈRES. *CRUCIFERAE.* 705

1re. Section.

Raifort. *Raphanus.*
Moutarde. *Sinapis.*
Chou. *Brassica.*
Tourrette. *Turritis.*
Arabette. *Arabis.*
Julienne. *Hesperis.*
Héliophile. *Heliophila.*
Giroflée. *Cheiranthus.*
Vélar. *Erysimum.*
Sisymbre. *Sisymbrium.*
Cresson. *Cardamine.*
Dentaire. *Dentaria.*
Ricotie. *Ricotia.*

2.

Lunaire. *Lunaria.*
Lunetière. *Biscutella.*
Clypéole. *Clypeola.*
Alysse. *Alyssum.*
Subulaire. *Subularia.*
Drave. *Draba.*
Cochlearia.
Ibéride. *Iberis.*
Thlaspi.
Passerage. *Lepidium.*
Jérose. *Anastatica.*
Vella.
Cameline. *Myagrum.*
Bunias.
Crambé.
Pastel. *Isatis.*

ORDRE IV.

LES CAPRIERS. *CAPPARIDES.* 756

Mozambé. *Cleome.*
Caprier. *Capparis.*
Réséda.
Rossolis. *Drosera.*
Parnassie. *Parnassia.*

ORDRE V.

LES SAVONIERS. *SAPINDI.* 766

1re. Section.

Corinde. *Cardiospermum.*
Paullinie. *Paullinia.*
Savonier. *Sapindus.*

2.

Litchi. *Euphoria.*
Knépier. *Melicocca.*

3.

Cupane. *Cupania.*

ORDRE VI.

Les érables. *Acera.* 773

1re. Section.

Marronier d'Inde. *Æsculus.*

2.

Erable. *Acer.*

3.

Béjuco. *Hippocratea.*

ORDRE VII.

Les malpighies. *Malpighiæ.* 781

1re. Section.

Banistère. *Banisteria.*

2.

Malpighie. *Malpighia.*

ORDRE VIII.

Les millepertuis. *Hypericæ.* 786

Ascyre. *Ascyrum.*
Millepertuis. *Hypericum.*

ORDRE IX.

Les guttiers. *Guttiferæ.* 794

1re. Section.

Clusier. *Clusia.*

2.

Mamei. *Mammea.*

ORDRE X.

Les orangers. *Aurantia.* 797

1re. Section.

Ximenia.

2.

Murrai. *Murraya.*
Oranger. Citronnier. *Citrus.*
Limonellier. *Limonia.*

3.

Ternstrome. *Ternstromia.*
Thé. *Thea.*
Camelli. *Camellia.*

ORDRE XI.

Les azédarachs. *Meliæ.* 811

1re. Section.

Winterania.
Aitone. *Aitonia.*

2.

Portésie. *Portesia.*
Trichilia.
Azédarach. *Melia.*
Aquilicie. *Aquilicia.*

3.

Mahogon. *Swietenia.*
Cédrel. *Cedrela.*

ORDRE XII.

Les vignes. *Vites.*

Achit. *Cissus.*
Vigne. *Vitis.*

TOME III.

ORDRE XIII.

LES GÉRANIONS. *GERANIA.* 5

Géranion. *Geranium.*
Monsone. *Monsonia.*
Capucine. *Tropæolum.*
Balsamine. *Impatiens.*
Surelle. *Oxalis.*

ORDRE XIV.

LES MALVACÉES. *MALVACEAE.* 38

1re. Section.

Malope. *Malopa.*

2.

Mauve. *Malva.*
Guimauve. *Althæa.*
Lavatère. *Lavatera.*
Alcée. *Alcea.*
Malachre. *Malachra.*
Pavonie. *Pavonia.*
Urène. *Urena.*
Napée. *Napæa.*
Sida.

3.

Anoda.
Solandra.
Ketmie. *Hibiscus.*
Mauvisque. *Malvaviscus.*
Cotonnier. *Gossipium.*

4 et 5.

Mélochie. *Melochia.*
Malacodre. *Malachodendrum.*
Gordone. *Gordonia.*
Fromager. *Bombax.*
Baobab. *Adansonia.*

6.

Pentapètes.
Cacaoyer. *Theobroma.*
Ambrome. *Abroma.*
Guazume. *Guazuma.*
Dombey. *Dombeya.*
Buttnère. *Byttneria.*

7.

Ayène. *Ayenia.*
Hélictère. *Helicteres.*
Sterculier. *Sterculia.*

8.

Pachire. *Pachira.*

ORDRE XV.

LES MAGNOLIERS. *MAGNOLIAE.* 84

Drimis. *Drymis.*
Badiane. *Illicium.*
Champac. *Michelia.*
Magnolier. *Magnolia.*
Tulipier. *Liriodendrum.*
Simarouba. *Quassia.*

ORDRE XVI.

LES ANONES. *ANONAE.* 93

Corossol. *Anona.*

ORDRE XVII.

LES MÉNISPERMES. *MENISPERMA.* 97

Pareire. *Cissampelos.*

Ménisperme. *Menispermum.*

ORDRE XVIII.

Les VINETTIERS. *BERBERIDES.* 100

Vinettier. *Berberis.*
Léontice. *Leontice.*
Epimède. *Epimedium.*

Hamamelis.

ORDRE XIX.

Les TILIACÉES. *TILIACEÆ.* 105

1re. Section.

Waltherie. *Waltheria.*
Hermane. *Hermannia.*
Maherne. *Mahernia.*

2.

Corète. *Corchorus.*
Héliocarpe. *Heliocarpus.*
Lapulier. *Triumfetta.*
Apeiba.
Calabure. *Muntingia.*
Greuvier. *Grewia.*
Tilleul. *Tilia.*

3.

Roucou. *Bixa.*

ORDRE XX.

Les CISTES. *CISTI.* 121

Ciste. *Cistus.*
Hélianthème. *Helianthemum.*

Violette. *Viola.*

ORDRE XXI.

Les RUTACÉES. *RUTACEÆ.* 137

1re. Section.

Tribule. *Tribulus.*
Fagone. *Fagonia.*
Fabagelle. *Zygophyllum.*
Gayac. *Guaiacum.*

2.

Rue. *Ruta.*
Harmale. *Peganum.*
Fraxinelle. *Dictamnus.*

Mélianthe. *Melianthus.*
Diosma.
Emplèvre. *Emplevrum.*

ORDRE XXII.

Les CARYOPHYLLÉES. *CARYOPHYLLEÆ.* 151

1re. Section.

Ortège. *Ortegia.*
Leflinge. *Læflingia.*
Holostée. *Holosteum.*
Polycarpe. *Polycarpon.*
Mollugo.
Minuart. *Minuartia.*

2.

Bufone. *Bufonia.*
Sagine. *Sagina.*

3.

Alsine. *Alsine.*
Pharnace. *Pharnaceum.*
Méringine. *Mœhringia.*
Elatine. *Elatine.*

4.

Spargoute. *Spergula.*
Céraiste. *Cerastium.*
Cherlerie. *Cherleria.*
Sabline. *Arenaria.*
Stellaire. *Stellaria.*

5.

Gypsophile. *Gypsophila.*
Saponaire. *Saponaria.*
Œillet. *Dianthus.*
Silène. *Silene.*
Cucubale. *Cucubalus.*
Lychnide. *Lychnis.*
Coquelourde. *Agrostemma.*

6.

Vélezie. *Velezia.*
Drypis.
Sarothra.

7.

Franquenne. *Frankenia.*
Lin. *Linum.*

CLASSE XIV.

P. DICOTYLÉDONES POLYPÉTALES.

Etamines périgynes. 190

ORDRE I.

LES JOUBARBES. *SEMPERVIVÆ.* 191.

Tillée. *Tillæa.*
Crassule. *Crassula.*
Cotylet. *Cotyledon.*
Rhodiole. *Rhodiola.*
Orpin. *Sedum.*
Joubarbe. *Sempervivum.*
Septas.

Penthorum.

ORDRE II.

LES SAXIFRAGES. *SAXIFRAGÆ.* 213

1re. Section.

Heuchère. *Heuchera.*
Saxifrage. *Saxifraga.*
Tiarelle. *Tiarella.*
Mitelle. *Mitella.*

2.

Dorine. *Chrysosplenium.*
Moscatelline. *Adoxa.*

3.

Cunone. *Cunonia.*
Hydrangée. *Hydrangea.*

ORDRE III.

LES CACTIERS. *CACTI.* 224

1re. Section.

Groseiller. *Ribes.*

2.

Cactier. *Cactus.*

ORDRE IV.

LES PORTULACÉES. *PORTULACEÆ.* 238

1re. Section.

Pourpier. *Portulaca.*
Talin. *Talinum.*
Turnère. *Turnera.*

Montie. *Montia.*
Tamaris. *Tamarix.*
Télèphe. *Telephium.*
Corrigiole. *Corrigiola.*
Gnavelle. *Scleranthus.*

2.

Trianthème. *Trianthema.*
Liméole. *Limeum.*
Claytone. *Claytonia.*
Gisèque. *Gisekia.*

ORDRE V.

Les ficoïdes. *ficoideæ.* 247

Nitraire. *Nitraria.*
Sésuve. *Sesuvium.*
Lanquette. *Aizoon.*
Glinole. *Glinus.*
Ficoïde. *Mesembryanthemum.*
Tétragone. *Tetragonia.*

ORDRE VI.

Les onagres. *onagræ.* 269

1re. Section.

Cercodée. *Cercodea.*

2.

Montin. *Montinia.*
Circée. *Circea.*
Ludwige. *Ludwigia.*

3.

Jussie. *Jussiæa.*
Onagre. *Œnothera.*
Epilobe. *Epilobium.*
Gaura.

4.

Fuchsie. *Fuchsia.*

ORDRE VII.

Les myrtes. *myrti.* 281

1re. Section.

Mélaleuque. *Melaleuca.*
Leptosperme. *Leptospermum.*
Goyavier. *Psidium.*
Myrte. *Myrtus.*
Jambosier. *Eugenia.*
Décumaire. *Decumaria.*
Grenadier. *Punica.*
Syringa. *Phyladelphus.*
Eucalyptus.

2.

Butonic. *Butonica.*

ORDRE VIII.

Les mélastomes. *melastomæ.* 298

1re. Section.

Blakée. *Blakea.*
Mélastome. *Melastoma.*

2.

Rhexie. *Rhexia.*

ORDRE IX.

Les salicaires. *salicariæ.* 302

Lagerstrome. *Lagerstrœmia.*
Lausone. *Lausonia.*
Salicaire. *Lythrum.*
Cuphée. *Cuphæa.*
Isnarde. *Isnardia.*

Ammane. *Ammania.*
Glaux.
Péplide. *Peplis.*

ORDRE X.

Les ROSACÉES. *ROSACEÆ.* 310

1re. Section.

Pommier. *Malus.*
Poirier. *Pyrus.*
Coignassier. *Cydonia.*
Néflier. *Mespilus.*
Alisier. *Cratægus.*
Sorbier. *Sorbus.*

2.

Rosier. *Rosa.*

3.

Pimprenelle. *Poterium.*
Sanguisorbe. *Sanguisorba.*
Ancistre. *Ancistrum.*
Aigremoine. *Agrimonia.*
Clifforte. *Cliffortia.*
Percepier. *Aphanes.*
Alchimille. *Alchimilla.*
Sibbaldie. *Sibbaldia.*

4.

Tormentille. *Tormentilla.*
Potentille. *Potentilla.*
Fraisier. *Fragaria.*
Comaret. *Comarum.*
Benoite. *Geum.*
Driade. *Dryas.*
Ronce. *Rubus.*

5.

Spirée. *Spiræa.*

6.

Hirtelle. *Hirtella.*

7.

Icaquier. *Chrysobalanus.*
Cerisier. *Cerasus.*
Prunier. *Prunus.*
Abricotier. *Armeniaca.*
Amandier. *Amygdalus.*
Pêcher. *Persica.*

8.

Plinie. *Plinia.*
Calycanthe. *Calycanthus.*
Acomat. *Homalium.*

ORDRE XI.

Les LÉGUMINEUSES. *LEGUMINOSAE.* 411

1re. Section.

Acacie. *Mimosa.*
Févier. *Gleditsia.*
Chicot. *Gymnocladus.*
Tamarinier. *Tamarindus.*
Parkinset. *Parkinsonia.*
Scotie. *Schotia.*
Casse. *Cassia.*

2.

Ben. *Moringa.*
Campèche. *Hæmathoxylum.*
Poincillade. *Poinciana.*
Brésillet. *Cæsalpinia.*
Bonduc. *Guilandina.*

3.

Courbaril. *Hymenæa.*

Bauhine. *Bauhinia.*

4.

Gainier. *Cercis.*
Anagyre. *Anagyris.*
Sophore. *Sophora.*

5.

Ajonc. *Ulex.*
Aspalathe. *Aspalathus.*
Borbone. *Borbonia.*
Liparie. *Liparia.*
Genet. *Genista.*
Cytise. *Cytisus.*
Crotalaire. *Crotalaria.*
Lupin. *Lupinus.*
Bugrane. *Ononis.*
Arachide. *Arachis.*
Anthyllide. *Anthyllis.*
Psoralée. *Psoralea.*
Dalée. *Dalea.*
Trèfle. *Trifolium.*
Mélilot. *Melilotus.*
Luzerne. *Medicago.*
Trigonelle. *Trigonella.*
Lotier. *Lotus.*
Dolic. *Dolichos.*
Haricot. *Phaseolus.*
Erythrine. *Erythryna.*
Clitore. *Clitoria.*
Glycine. *Glycine.*

6.

Abrus.
Amorpha.
Piscidie. *Piscidia.*
Robinier. *Robinia.*
Caragan. *Caragana.*
Astragale. *Astragalus.*
Pélécin. *Pelecinus.*
Phaca.
Baguenaudier. *Colutea.*
Réglisse. *Glycyrrhyza.*
Galéga. *Galega.*
Indigotier. *Indigofera.*

7.

Gesse. *Lathyrus.*
Pois. *Pisum.*
Orobe. *Orobus.*
Vesce. *Vicia.*
Fève. *Faba.*
Ers. *Ervum.*
Ciche. *Cicer.*

8.

Chenille. *Scorpiurus.*
Ornithope. *Ornithopus.*
Hippocrèpe. *Hippocrepis.*
Coronille. *Coronilla.*
Sainfoin. *Hedysarum.*
Agaty. *Æschinomene.*

9.

Dalberg. *Dalbergia.*
Umari. *Geoffræa.*
Angelin. *Andira.*
Nissole. *Nissolia.*
Ptérocarpe. *Pterocarpus.*

10.

Copahu. *Copaifera.*

11.

Securidaca.

ORDRE XII.

LES TÉRÉBINTACÉES. *TEREBINTACEAE.* 563

1re. Section.

Acajou. *Cassuvium.*
Manguier. *Mangifera.*
Sumac. *Rhus.*

2.

Camélée. *Cneorum.*
Comoclade. *Comocladia.*
Balsamier. *Amyris.*
Schinus.
Spathélie. *Spathelia.*
Térébinthe. *Terebinthus.*
Gomart. *Bursera.*
Tolut. *Toluifera.*
Monbin. *Spondias.*

3.

Aylanthe. *Aylanthus.*
Brucé. *Brucea.*

4.

Fagarier. *Fagara.*
Clavalier. *Zanthoxylum.*
Ptelea.

5.

Dodonée. *Dodonæa.*
Carambolier. *Averrhoa.*
Noyer. *Juglans.*

ORDRE XIII.

LES NERPRUNS. *RHAMNI.* 589

1re. Section.

Staphylé. *Staphylea.*
Fusain. *Evonymus.*
Célastre. *Celastrus.*

2.

Rubentia.
Cassine. *Cassine.*
Houx. *Ilex.*
Prinos. *Apalachine.*

3.

Samara.
Nerprun. *Rhamnus.*
Jujubier. *Ziziphus.*
Paliure. *Paliurus.*

4.

Céanothe. *Ceanothus.*
Phylique. *Phylica.*

5.

Brunie. *Brunia.*

6.

Gouane. *Gouania.*
Aucuba.

CLASSE XV.

PL. DICOTYLÉDONES APÉTALES.

Etamines idiogynes ou séparées du pistil. 619

ORDRE I.

LES EUPHORBES. *EUPHORBIAE.* 620

1re. Section.

Mercuriale. *Merourialis.*
Euphorbe. *Euphorbia.*
Niruri. *Phyllanthus.*
Xylophylle. *Xylophylla.*

Kirganelle. *Kirganelia.*
Kiggellaire. *Kiggellaria.*
Clutelle. *Clutia.*
Andrachné. *Andrachne.*
Buis. *Buxus.*
Adélie. *Adelia.*
Ricin. *Ricinus.*
Médicinier. *Jatropha.*
Alevrit. *Alevrites.*
Croton. *Croton.*
Acalypha.

2.

Tragia.
Stillingia.
Mancenillier. *Hippomane.*
Sablier. *Hura.*
Gluttier. *Sapium.*
Omphale. *Omphalea.*
Daléchampe. *Dalechampia.*

ORDRE II.

Les CUCURBITACÉES. *CUCURBITACEAE.* 653

1re. Section.

Gronove. *Gronovia.*
Sicyos.

2.

Bryone. *Bryonia.*

3.

Mélothrie. *Melothria.*
Momordique. *Momordica.*
Concombre. *Cucumis.*
Courge. *Cucurbita.*
Anguine. *Trichosanthes.*

4.

Grenadille. *Passiflora.*
Papayer. *Papaya.*

ORDRE III.

Les ORTIES. *URTICAE.* 673

1re. Section.

Figuier. *Ficus.*

2.

Coulequin. *Cecropia.*
Jaquier. *Artocarpus.*
Murier. *Morus.*
Broussonnet. *Broussonnetia.*
Ortie. *Urtica.*
Forskale. *Forskalea.*
Pariétaire. *Parietaria.*
Pteranthus.
Houblon. *Humulus.*
Chanvre. *Cannabis.*
Téligone. *Theligonum.*

3.

Gunnère. *Gunnera.*
Poivre. *Piper.*

ORDRE IV.

Les AMENTACÉES. *AMENTACEAE.* 698

1re. Section.

Fothergil. *Fothergilla.*
Orme. *Ulmus.*
Micocoulier. *Celtis.*

2.

Saule. *Salix.*
Peuplier. *Populus.*
Galé. *Myrica.*

3.

Bouleau. *Betula.*

Charme. *Carpinus.*
Hêtre. *Fagus.*
Chataignier. *Castanea.*
Chêne. *Quercus.*
Noisettier. *Corylus.*
Liquidambar.
Comptone. *Comptonia.* L'Héritier.
Platane. *Platanus.*

ORDRE V.

LES CONIFÈRES. *CONIFERÆ.* 743

1re. Section.

Ephedra.
Filao. *Casuarina.*
If. *Taxus.*

2.

Genèvrier. *Juniperus.*
Cyprès. *Cupressus.*
Thuya. *Thuya.*
Pin. *Pinus.*
Mélèze. *Larix.*
Sapin. *Abies.*

Fin des classes et des ordres de Jussieu.

TOME IV.

PLANTES

DONT LA PLACE EST INCERTAINE.

1re. Section.

Pénée. *Penæa.*

2.

Nigrine. *Chloranthus.*

3.

Azime. *Azima.*
Sucepin. *Monotropa.*
Dionée. *Dionæa.*
Euclé. *Euclea.*
Maqui. *Aristotelia.*
Sarracénie. *Sarracenia.*

4.

Bégone. *Begonia.*

5.

Fustet. *Coriaria.*
Amavinga.
Samyda.

6.

Baquois. *Pandanus.*

7.

Cannabine. *Datisca.*

Fin des genres de Jussieu.

APPENDICE. 17

Gingo. *Ginkgo.*
Prockia.
Curtisia.
Ardisia.
Plocama.
Lopézie. *Lopezia.*
Cylista.
Smithia.
Mollavi. *Heritiera.*
Litsé. *Litsea.*
Bessi. *Metrosideros.*

Fontainèse. *Fontanesia.*
Pittosporum.
Nolia.
Planère. *Planera.*
Cadie. *Cadia.*
Michauxie. *Michauxia.*
Ilicioïde. *Ilicioides.*
Xyménie. *Xymenia.*
Lygiste. *Lygistum.*

ADDITIONS. 29

Flaverie. *Flaveria.*

Classes..... 15
Ordres..... 100
Genres..... 1186
Espèces..... 6625
Non compris les variétés distinctes.

EXPOSÉ SUCCINCT

DU

SYSTÊME DE LINNÉ.

Linné a fondé son système sur les noces des plantes. L'étamine chargée de poussière fécondante fait les fonctions de mari ; le pistil qui reçoit dans son sein le pollen, est considéré comme sa femme. Les noms des classes et des ordres sont tirés de mots grecs qui ont rapport à ces alliances.

Les divisions étant établies sur le nombre, la proportion, la combinaison, la séparation ou la connexion des étamines et des pistils, la configuration extérieure des calices et des corolles n'y entre pour rien ; on remarquera cependant dans la table comparative que plusieurs classes renferment des familles naturelles qui se rapprochent des ordres de Jussieu.

Les végétaux sont divisés en 24 classes. Les 23 premières renferment ceux dont les étamines et les pistils sont visibles. La 24e. réunit ceux dont les organes sexuels sont peu connus.

Les 10 premières classes sont établies sur le nombre des étamines depuis 1 jusqu'à 10, et les ordres sur celui des pistils.

La 1re. classe, qui n'a qu'une étamine, se nomme monandrie. (Un seul mari).

La 2e. diandrie. Deux maris.

La 3e. triandrie. Trois maris.

La 4°. tétrandrie. Quatre maris.

La 5°. pentandrie. Cinq maris.

La 6°. hexandrie. Six maris.

La 7°. heptandrie. Sept maris.

La 8°. octandrie, Huit maris.

La 9°. ennéandrie. Neuf maris.

La 10°. décandrie. Dix maris.

Les divisions de ces classes indiquant le nombre des pistils, celle qui n'a qu'un pistil s'appelle monogynie. (Une femme).

Digynie. Deux pistils ou deux femmes.

Trigynie. Trois femmes.

Tétragynie. Quatre femmes.

Pentagynie. Cinq femmes.

Hexagynie. Six femmes.

Heptagynie. Sept femmes.

Décagynie. Dix femmes.

Dodécagynie. Douze femmes.

Polygynie. Plusieurs semences dont le nombre est indéterminé.

La 11°. classe, dodécandrie, (12 maris) est composée de plantes dont les fleurs ont depuis 12 jusqu'à 19 étamines inclusivement.

La 12°. classe, icosandrie, (20 maris) comprend les fleurs qui ont 20 étamines, quelquefois plus.

Mais comme ce nombre est indéterminé, et que celui des plantes de cette classe et de la suivante est considérable, Linné n'a compris dans celle-ci que celles dont les étamines sont attachées aux parois intérieures du calice.

La 13°. classe, polyandrie, (plusieurs maris) réunit les fleurs qui ont 20 à 100 étamines attachées sur le réceptacle au bas de l'ovaire.

Les divisions de ces deux classes sont les mêmes que dans les précédentes.

La 14°. classe, didynamie, (deux puissances) renferme les fleurs

dont les étamines sont au nombre de 4, 2 plus grandes et 2 plus courtes. Cette classe forme une famille naturelle, celle des labiées.

Le premier ordre de cette classe est composé des plantes dont les semences sont nues; il s'appelle ainsi gymnospermie : le second, des plantes dont les semences sont couvertes ou capsulaires, il se nomme angiospermie.

La 15e. classe, tétradynamie, (quatre puissances) contient les fleurs dont les étamines sont au nombre de 6, 4 plus grandes et 2 plus courtes.

Les 2 divisions de cette classe sont prises de la forme des siliques. La première se compose des plantes à siliques courtes ou silicules; la seconde des siliques longues ou siliques proprement dites. Cette classe est aussi une famille naturelle, qui tire son nom de l'arrangement des pétales disposés en croix, et qu'on nomme par cette raison crucifères.

La connexion des étamines et leur réunion en un ou plusieurs corps ou faisceaux, donnent les caractères essentiels sur lesquels sont fondées les 16e., 17e., 18e. et 19e. classes. Dans les trois premières, elles sont réunies à leur base; dans la 19e. elles sont libres à leur base, et réunies par leurs anthères.

La 16e. classe, monadelphie, (un seul frère) les étamines réunies à leur base ne semblent former qu'un seul corps.

Les divisions de cette classe sont établies sur le nombre des étamines.

La 17e. classe, diadelphie, (deux frères) les étamines sont réunies en deux corps séparés; elles sont ordinairement au nombre de 10, dont 9 sont unies, et la 10e. libre. Les ordres de cette classe sont comme ceux de la précédente. Elle forme une famille naturelle, appellée papillonacée à cause de la figure de sa fleur, ou légumineuse par les gousses.

La 18e. classe, polyadelphie, (plusieurs frères) plus de deux étamines sont réunies en plusieurs corps; leur nombre détermine les divisions.

La 19e classe, syngénésie, (génération unie) a pour caractère essentiel, la cohérence des anthères en forme de cylindre autour

du pistil, les filets des étamines restant libres. Cette classe naturelle comprend les flosculeuses, semiflosculeuses, et radiées de Tournefort; ou les chicoracées, cynarocéphales, et corymbifères de Jussieu.

Ses divisions sont la polygamie égale, la polygamie fausse, la polygamie séparée, et la monogamie. La polygamie fausse se divise en polygamie superflue, frustranée et nécessaire. Voyez le titre de la classe 13°. de Jussieu, vol. II, page 319.

La 20°. classe, gynandrie, (femme et mari) comprend les fleurs dont les étamines sont insérées sur le pistil. Ses divisions sont tirées du nombre des étamines.

Un examen approfondi ayant convaincu Jussieu que toutes les plantes réunies dans cette classe n'avoient pas exactement leurs étamines épigynes ou insérées sur le pistil, il les a distribuées dans différentes classes.

Dans les 21°. et 22°. classes les fleurs cessent d'être hermaphrodites. Les sexes sont séparés.

La 21°. classe, monœcie, (une seule maison) a pour caractère distinctif, d'avoir des fleurs mâles, c'est-à-dire, composées seulement d'étamines, et d'autres femelles, n'ayant que des pistils sur une même plante, mais séparées. Les ordres sont établis sur le nombre des étamines.

La 22°. classe, dioécie, (deux maisons) comprend les plantes dont les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des pieds différens. Ses divisions sont tirées du nombre des étamines.

La 23°. classe, polygamie, (plusieurs noces). Linné ayant observé que dans quelques plantes, indépendamment des fleurs hermaphrodites, il s'en trouvoit qui n'avoient que des étamines ou des pistils, les a réunies dans cette classe, et a formé des ordres d'après la combinaison de leur fécondation. Dans le premier ordre, monœcie, une seule espèce de fleur est fécondée ou peut contribuer à la fécondation. Dans le second, dioécie, deux espèces de fleurs peuvent être fécondées ou contribuer à la fécondation sur le même individu ou sur deux. Dans la trioécie, (trois maisons) les hermaphrodites se trouvent sur un pied, et des mâles et des fe-

melles sur un autre. Jussieu ne regardant pas ces caractères comme constans et invariables, a distribué ces plantes dans les classes et ordres auxquels elles appartiennent d'après l'insertion de leurs étamines. Plusieurs botanistes ont supprimé de même cette classe.

La 24e., cryptogamie, (noces cachées) renferme les plantes dont la fructification est peu connue. Leurs organes sexuels ont une configuration particulière.

Jussieu les a comprises dans sa première classe, et a adopté les divisions de Linné.

Le tableau suivant qui réunit sous un même coup-d'œil ces 24 classes, servira de développement à cet exposé.

.....	HEPTANDRIE.	VII.
.....	OCTANDRIE.	VIII.
.....	ENNEANDRIE.	IX.
.....	DÉCANDRIE.	X.
.....	DODÉCANDRIE.	XI.
k côtés intérieurs du calice.	ICOSANDRIE.	XII.
e réceptacle avec les pistils.	POLYANDRIE.	XIII.
ourtes.....	DIDYNAMIE.	XIV.
ourtes.....	TÉTRADYNAMIE.	XV.
corps.....	MONADELPHIE.	XVI.
orps.....	DIADELPHIE.	XVII.
deux corps.....	POLYADELPHIE.	XVIII.
re autour du pistil.....	SYNGÉNÉSIE.	XIX.
.....	GYNANDRIE.	XX.
.....	MONOÏCIE.	XXI.
.....	DIOÉCIE.	XXII.
.....	POLYGAMIE.	XXIII.
.....	CRYPTOGAMIE.	XXIV.



TABLEAU

Des genres de cet ouvrage rangés suivant les classes et divisions du Système de Linné, avec les noms français et l'indication des classes et des ordres de Jussieu qui y correspondent.

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
CLASSIS I.			T. Pag.
MONANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Canna.	Balisier.	Classe IV, ordre 2. Balisiers.	I. 540
Renealmia V. *Globba.*			
Amomum.	Gingembre.	idem.	I. 542
Costus.	Costus.	idem.	I. 543
Alpinia.	Alpinie.	idem.	I. 544
Maranta.	Galanga.	idem.	I. 544
Curcuma.	Curcuma.	idem.	I. 545
Kæmpferia.	Zédoaire.	idem.	I. 545
Boerhaavia.	Boerhaave.	Cl. VII, ordre 3. Nictages.	I. 65
Salicornia.	Salicorne.	Cl. VI, ord. 6. Arroches.	I. 64
Hippuris.	Pesse.	Cl. I, ord. 6. Nayades.	I. 39
2.			
Digynia.			
Corispermum.	Corisperme.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I 635

Système de Linné.	Méthode de Jussieu.		T. pag.
Callitriche.	Callitric.	Classe I, ordre 6. Nayades.	I. 323
Blitum.	Blète.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 633
Cinna.	Cinna.	Cl. II, ordre 4. Graminées.	I. 349
CLASSIS II.			
Diandria.			
I.			
Monogynia			
Nyctanthes.	Mogori.	Classe VIII, ordre 4. Jasminées.	I. 721
Jasminum.	Jasmin.	idem	I. 722
Ligustrum.	Troëne	idem.	I. 726
Phyllirea.	Filaria.	idem.	I. 719
Olea.	Olivier.	idem.	I. 716
Chionanthus	Chionante.	idem.	I. 714
Syringa.	Lilas. Lilac. Jussieu.	idem.	I. 708
Eranthemum.	Eranthème.	Cl. VIII, ordre 5. Gattiliers.	I. 741
Circœa.	Circée.	Cl. XIV, ordre 6. Onagres.	III. 272
Veronica.	Véronique.	Cl. VIII, ordre 2. Pédiculaires.	I. 686
Iusticia.	Carmantine.	Cl. VIII, ordre 3. Acanthes.	I. 703
Dianthera.			
V. Justicia.			
Gratiola.	Gratiole.	Cl. VIII, ord. 7. Scrophulaires.	II. 108
Calceolaria.	Calcéolaire.	idem.	II. 100
Linguicula.	Grassette.	Cl. VIII, ord. 1. Lysimachies.	I. 681
Utricularia.	Utriculaire.	idem.	I. 680
Verbena.	Verveine.	Cl. VIII, ordre 5. Gattiliers.	I. 737
Lycopus.	Licope.	Cl. VIII, ord. 6. Labiées.	II. 6
Amethystea.	Améthyste.	idem.	II. 6
Cunila.	Cunile.	idem.	II. 7
Ziziphora.	Ziziphore.	idem.	II. 7
Monarda.	Monarde.	idem.	II. 8
Rosmarinus.	Romarin.	idem.	II. 10
Salvia.	Sauge.	idem.	II. 11
Collinsonia.	Collinsone.	idem.	II. 20
			Globba.

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Globba.	Globbée.	Classe IV, ordre 2. Balisiers.	I. 542
Ancistrum.	Ancistre.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 359
2.			
Digynia.			
Anthoxanthum.	Flouve.	Cl. II, ordre 4. Graminées.	I. 349
3.			
Trigynia.			
Piper.	Poivre.	Cl. XV, ord. 3. Orties.	III. 695
CLASSIS III.			
TRIANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Valeriana.	Valériane.	Classe II, ordre 1. Dipsacées.	II. 536
Tamarindus.	Tamarinier.	Cl. XIV, ord. 11. Légumineuses.	III. 426
Cneorum.	Camelée.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 571
Comocladia.	Comoclade.	idem.	III. 572
Melothria.	Mélothrie.	Cl. XV, ord. 2. Cucurbitacées.	III. 657
Ortegia.	Ortège.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 152
Læflingia.	Léflinge.	idem.	III. 153
Polycnemum.	Polycnème.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 618
Hippocratea.	Béjuco.	Cl. XIII, ordre 6. Erables.	II. 780
Crocus.	Safran.	Cl. III, ordre 8. Iris.	I. 533
Ixia.	Ixie.	idem.	I. 525
	Morée.	idem.	I. 524
Gladiolus.	Glayeul.	idem.	I. 529
	Ixie.	idem.	I. 527
Antholiza.	Antholise.	idem.	I. 532
	Mérianelle.		
Iris.	Iris.	idem.	I. 517
	Morée.	idem.	I. 524
Moræa.	Morée.	idem.	I. 524

SYSTÈME DE LINNÉ.	[illegible] DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Wachendorfia.	Wachendorfe.	idem.	I. 534
Commelina.	Comméline.	Classe III, ordre 3. Joncs.	I. 430
Callisia.	Callisie.	idem.	I. 429
Schœnus.	Choin.	Cl. II, ordre 3. Souchets.	I. 342
Cyperus.	Souchet.	idem.	I. 345
Scirpus.	Scirpe.	idem.	I. 343
Eriophorum.	Linaigrette.	idem.	I. 343
Lygeum.	Sparte.	Cl. II, ordre 4. Graminées.	I. 395
Killingia.	Killingie.	Cl. II, ordre 3. Souchets.	I. 347
2.			
Digynia.			
Cornucopiæ.	Coqueluchiole.	Classe II, ordre 4. Graminées.	I. 397
Saccharum.	Sucre.	idem.	I. 359
Phalaris.	Roseau.	idem.	I. 391
	Phalaris.	idem.	I. 351
	Cynosure. Crételle.	idem.	I. 369
Paspalum.	Paspal.	idem.	I. 352
Panicum.	Panis.	idem.	I. 352
Phleum.	Fléau.	idem.	I. 350
Alopecurus.	Vulpin.	idem.	I. 349
Milium.	Millet.	idem.	I. 354
Agrostis.	Agrostis.	idem.	I. 356
Aira.	Canche.	idem.	I. 366
Melica.	Mélique.	idem.	I. 367
Poa.	Paturin.	idem.	I. 385
Briza.	Brize.	idem.	I. 387
Uniola.	Uniole.	idem.	I. 387
Dactylis.	Dactyle.	idem.	I. 368
Cynosurus.	Crételle.	idem.	I. 369
Festuca.	Fétuque.	idem.	I. 383
Bromus.	Brome.	idem.	I. 381
Stipa.	Stipe.	idem.	I. 358
Avena.	Ayoine.	idem.	I. 388
Lagurus.	Lagurier.	idem.	I. 359
Arundo.	Roseau.	idem.	I. 391

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Lolium.	Yvraie.	idem.	I. 371
Elymus.	Elyme.	idem.	I. 372
Secale.	Seigle.	idem.	I. 380
Hordeum.	Orge.	idem.	I. 373
Triticum.	Froment.	idem.	I. 376
3.			
Trigynia.			
Montia.	Montie.	Cl. XIV, ordre 4. Portulacées.	III. 241
Holosteum.	Holostée.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 153
Kœnigia.	Kénige.	Cl. VI, ordre 5. Polygonées.	I. 613
Polycarpon.	Polycarpe.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 153
Mollugo.	Mollugo.	idem.	III. 154
Minuartia.	Minuart.	idem.	III. 154
CLASSIS IV.			
TETRANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Protea.	Protée.	Cl. VI, ordre 3. Protées.	I. 587
Globularia.	Globulaire.	Cl. VIII, ordre 1. Lysimachies.	I. 677
Cephalanthus.	Céphalanthe.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 569
Dipsacus.	Cardère.	Cl. XI, ordre 1. Dipsacées.	II. 529
Scabiosa.	Scabieuse.	idem.	II. 531
Knautia.	Knautie.	idem.	II. 536
Spermacoce.	Spermacoce.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 551
Sherardia.	Shérard.	idem.	II. 541
Asperula.	Aspérule.	idem.	II. 541
Houstonia.	Houstone.	idem.	II. 551
Galium.	Galiet.	idem.	II. 543
Crucianella.	Crucianelle.	idem.	II. 546
Rubia.	Garance.	idem.	II. 548
Catesbœa.	Catesbée.	idem.	II. 553
Ixora.	Ixore.	idem.	II. 561
Mitchella.	Mitchelle.	idem.	II. 568

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Callicarpa.	Callicarpe.	Cl. VIII, ordre 5. Gattiliers.	I. 731
Penœa.	Pénée.	Place incertaine.	IV. 5
Blæria.	Blairie.	Cl. IX, ordre 3. Bruyères.	II. 263
Budleja.	Budlège.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II. 83
Plantago.	Plantain.	Cl. 7, ordre 2. Plantains.	I. 650
	Pulicaire. *Psyllium.* Juss.	idem.	I. 649
Scoparia.	Scopaire.	Cl. VIII, ord. 7. Scrophulaires.	II. 84
Centunculus.	Centenille.	Cl. VIII, ordre 1. Lysimachies.	I. 665
Sanguisorba.	Sanguisorbe.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 357
Cissus.	Achit.	Cl. XIII, ordre 12. Vignes.	II. 819
Epimedium.	Epimède.	Cl. XIII, ordre 18. Vinettiers.	III. 103
Cornus.	Cornouiller.	Cl. XI, ordre 3. Chèvre-feuilles.	II. 588
Samara.	Samara.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 603
Fagara.	Fagarier.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 581
Ægiphila.	AEgiphile.	Cl. VIII, ordre 5. Gattiliers.	I. 729
Ptelea.	Ptélée.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 583
Ludwigia.	Ludwige.	Cl. XIV, ordre 6. Onagres.	III. 272
Banksia.	Banksie.	Cl. VI, ordre 3. Protées.	I. 593
Oldenlandia.	Oldenlandia.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 553
Ammannia.	Ammane.	Cl. XIV, ordre 9. Salicaires.	III. 308
Isnardia.	Isnarde.	idem.	III. 308
Trapa.	Macre.	Cl. IV, ordre 4. Morrènes.	I. 561
Elæagnus.	Chalef.	Cl. VI, ordre 1. Chalefs.	I. 573
Struthiola.	Struthiole.	Cl. VI, ordre 2. Thymelées.	I. 583
Rivina.	Rivine.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	
Camphorosma.	Pteranthus. Juss.	Cl. XV, ordre 3. Orties.	III. 692
	Camphrée.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 618
Alchimilla.	Alchimille.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 363
2.			
Digynia.			
Aphanes.	Percepier.	idem.	III. 363
Bufonia.	Bufone.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 154
Hamamelis.	Hamamelis.	Cl. XIII, ordre 18. Vinettiers.	III. 104

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Cuscuta.	Cuscute.	Cl. VIII, ordre 10. Liserons.	II. 181
Hypecoum.	Hypécoon.	Cl. XIII, ordre 2. Papavéracées.	II. 700
3.			
Tetragynia.			
Ilex.	Houx.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 597
Coldenia.	Coldène.	Cl. VIII, ordre 9. Borraginées.	II. 152
Potamogeton.	Epi d'eau.	Cl. I, ordre 6. Naïades.	I. 321
Ruppia.	Ruppie.	idem.	I. 323
Sagina.	Sagine.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 155
Tillæa.	Tillée.	Cl. XIV, ordre 1. Joubarbes.	III. 192
CLASSIS V.			
PENTANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Heliotropium.	Héliotrope.	Cl. VIII, ordre 9. Borraginées.	II. 153
Myosotis.	Scorpionne.	idem.	II. 163
Lithospermum.	Gremil.	idem.	II. 157
Anchusa.	Buglose.	idem.	II. 164
	Gremil.	idem.	II. 158
Cynoglossum.	Cynoglosse.	idem.	II. 167
Pulmonaria.	Pulmonaire.	idem.	II. 159
Symphytum.	Consoude.	idem.	II. 161
Cerinthe.	Mélinet.	idem.	II. 151
Onosma.	Onosme.	idem.	II. 160
Borrago.	Bourrache.	idem.	II. 166
Asperugo.	Rapette.	idem.	II. 167
Lycopsis.	Lycopside.	idem.	II. 162
Echium.	Viperine.	idem.	II. 155
Messerschmidia.	Arguze.	idem.	II. 150
Tournefortia.	Pittone.	idem.	II. 148

Système de Linné	Méthode de Jussieu.		T. pag.
Nolana.	Nolane.	idem.	II. 169
Aretia.	Arétie.	Cl. VIII, ordre 1. Lysimachies.	I. 669
Androsace.	Androselle.	idem.	I. 670
Primula.	Primevère.	idem.	I. 671
Cortusa.	Cortuse.	idem.	I. 674
Soldanella.	Soldanelle.	idem.	I. 675
Dodecatheon.	Gyrosèlle.	idem.	I. 675
Cyclamen.	Cyclame.	idem.	I. 676
Menyanthes.	Ményanthe.	idem.	I. 681
Hottonia.	Hottone.	idem.	I. 668
Hydrophyllum.	Hydrophylle.	Cl. VIII, ordre 9. Borraginées.	II. 149
Ellisia.	Ellise.	idem.	II. 150
Lysimachia.	Lysimachie.	Cl. VIII, ordre 1. Lysimachies.	I. 666
Anagallis.	Mouron.	idem.	I. 665
Spigelia.	Spigélie.	Cl. VIII, ordre 13. Gentianes.	II. 204
Randia.	Gratgal.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 554
Azalea.	Azalée.	Cl. IX, ordre 2. Rosages.	II. 256
Plumbago.	Dentelaire.	Cl. VII, ordre 4. Dentelaires.	I. 657
Tectona.	Tek. Theka.	Cl. VIII, ordre 5. Gattiliers.	I. 732
Phlox.	Phlox.	Cl. VIII, ordre 11. Polémoines.	II. 182
Convolvulus.	Liseron.	Cl. VIII, ordre 10. Liserons.	II. 171
Ipomæa.	Quamoclit.	idem.	II. 179
	Cantu. *Cantua.*		
	Jussieu.	Cl. VIII, ordre 11. Polémoines.	II. 185
Polemonium.	Polémoine.	idem.	II. 184
Campanula.	Campanule.	Cl. IX, ordre 4. Campanulacées.	II. 301
Roella.	Roëlla.	idem.	II. 309
Phyteuma.	Phyteume.	idem.	II. 311
Trachelium.	Trachélie.	idem.	II. 308
Samolus.	Samole.	Cl. VIII, ordre 10. Lysimachies.	I 680
Rondeletia.	Rondelet.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 556
Portlandia.	Portlande.	idem.	II. 589
	Coutarée. *Coutarea.* Juss.	idem.	II. 560
Cinchona.	Quinquina.	idem.	II. 555
Coffea.	Caffeyer.	idem.	II. 563
Chiococca.	Ciocoque.	idem.	II. 563

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Hamellia.	Hamel.	idem.	II. 568
Lonicera.	Symphoricarpos. Dierville. *Dierville.*	Cl. XI, ordre 3. Chèvre-feuilles.	II. 573
		idem.	II. 574
	Camécerisier. *Xylosteon.*	idem.	II. 574
	Chèvre-feuille. *Caprifolium.*	idem.	II. 576
Triosteum.	Trioste.	idem.	II. 572
Conocarpus.	Conocarpe.	Cl. VI, ordre 1. Chalefs.	I. 575
Mirabilis.	Nictage. *Nyctago.* Juss.	Cl. VI, ordre 3. Nictages.	I. 653
Coris.	Coris.	Cl. VIII, ordre 1. Lysimachies.	I. 668
Verbascum.	Molène.	Cl. VIII, ordre 8. Solanées.	II. 108
Datura.	Stramoine.	idem.	II. 116
Hyoscyamus.	Jusquiame.	idem.	II. 111
Nicotiana.	Tabac.	idem.	II. 113
Atropa.	Belladone.	idem.	II. 119
	Mandragore.	idem.	II. 118
Physalis.	Coqueret.	idem.	II. 121
Solanum.	Morelle.	idem.	II. 124
Capsicum.	Piment.	idem.	II. 135
Strychnos.	Vomique.	Cl. VIII, ordre 14. Apocinées.	II. 231
Genipa.	Génipayer.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 559
Cestrum.	Cestreau.	Cl. VIII, ordre 8. Solanées.	II. 139
Lycium.	Liciet.	idem.	II. 137
	Serissa. Juss.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 570
Jacquinia.	Jacquinier.	Cl. VIII, ordre 15. Sapotilliers.	II. 234
Chironia.	Chirone.	Cl. VIII, ordre 13. Gentianes.	II. 203
Cordia.	Sébestier.	Cl. VIII, ordre 9. Borraginées.	II. 145
Patagonula.	Patagonule.	idem.	II. 144
Varronia.	Varrone.	idem.	II. 147
Brunsfelsia.	Brunsfel.	Cl. VIII, ordre 8. Solanées.	II. 141
Chrysophyllum.	Caimitier.	Cl. VIII, ordre 15. Sapotilliers.	II. 236
Sideroxylum.	Argan.	idem.	II. 234

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Rhamnus.	Jujubier. *Zizi-phus.* Juss.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 608
	Nerprun.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 603
	Micocoulier.	Cl. XV, ordre 4. Amentacées.	III. 705
	Paliure. *Paliu-rus.* Juss.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 609
	Sumac.	Cl. XIV, ordre 12. Térébintacées.	III. 568
Phylica.		idem.	III. 612
Ceanothus.	Céanothe.	idem.	III. 610
Arduina.	Calac. *Carissa.* Jussieu.	Cl. VIII, ordre 14. Apocinées.	II. 231
Byttneria.	Buttnère.	Cl. XIII, ordre 14. Malvacées.	III. 79
Myrsine.	Myrsine.	Cl. VIII, ordre 15. Sapotilliers.	II. 239
Celastrus.	Célastre.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 593
Evonymus.	Fusain.	idem.	III. 591
Diosma.	Diosma.	Cl. XIII, ordre 21. Rutacées.	III. 147
	Emplèvre. *Em-plevrum.* Juss.	idem.	III. 151
Brunia.	Brunie.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 615
Cyrilla.	Cyrille.	Cl. IX, ordre 3. Bruyères.	II. 263
Itea.	Ité.	Cl. IX, ordre 2. Rosages.	II. 261
Cedrela.	Cédrel.	Cl. XIII, ordre 11. Azédarachs.	II. 817
Elæodendrum.	*An rubentia.* Juss!	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 597
Mangifera.	Manguier.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 566
Hirtella.	Hirtelle.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 384
Ribes.	Groseiller.	Cl. XIV, ordre 3. Cactiers.	III. 225
Gronovia.		Cl. XV, ordre 2. Cucurbitacées.	III. 654
Hedera.	Lierre.	Cl. XI, ord. 3. Chèvre-feuilles.	II. 591
	Vigne.	Cl. XIII, ordre 11. Vignes.	II. 821
Vitis.	Vigne.	idem.	II. 821
Lagoecia.	Lagocie.	Cl. XII, ordre 2. Ombellifères.	II. 652
Claytonia.	Claytone.	Cl. XIV, ordre 4. Portulacées.	III. 246
Heliconia.	Bihai.	Cl. IV, ordre 1. Bananiers.	I. 539
Achyranthes.	Cadelari.	Cl. VII, ordre 1. Amaranthes.	I. 644
Celosia.	Passevelours.	idem.	I. 641
	Amaranthine.	idem.	I. 645

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Illecebrum.	OErva. *Erua.*	idem.	I. 643
	Illecebrum.	idem.	I. 647
	Passevelours.	idem.	I. 642
	Panarine.	idem.	I. 647
Glaux.	Glaux.	Cl. XIV, ordre 9. Salicaires.	III. 309
Thesium.	Thésion.	Cl. VI, ord. 1. Chalefs.	I. 571
Rauwolfia.	Rauvolfe.	Cl. VIII, ord. 14. Apocinées.	II. 228
Pœderia.	Danaïde.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 565
Cerbera.	Ahouai.	Cl. VIII, ord. 14. Apocinées.	II. 230
Gardenia.	Gardène.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 557
	Canti. *Canthium.*		
	Juss.	idem.	II. 565
Allamanda.	Allamanda.	Cl. VIII, ordre 14. Apocinées.	II. 227
Vinca.	Pervenche.	idem.	II. 207
Nerium.	Laurose.	idem.	II. 211
Echites.	Echite.	idem.	II. 214
Plumeria.	Franchipanier.	idem.	II. 209
Cameraria.	Camerier.	idem.	II. 211
Tabernæ montana.	Tabernier.	idem.	II. 208
Ceropegia.	Cérope'ge.	idem.	II. 215
2. Digynia.			
Melodinus.	Mélodin.	idem.	II. 228
Periploca.	Périploque.	idem.	II. 217
Cynanchum.	Cynanque.	idem.	II. 220
Apocynum.	Apocin.	idem.	II. 219
Asclepias.	Asclépiade.	idem.	II. 222
Stapelia.	Stapélie.	idem.	II. 215
Herniaria.	Herniaire.	Cl. VII, ordre 1. Amaranthes.	I. 648
Chenopodium.	Anserine.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 626
Beta.	Bette.	idem.	I. 624
Salsola.	Soude.	idem.	I. 621
Gomphrena.	Amaranthine.	Cl. VII, ordre 1. Amaranthes.	I. 645
Bosea.	Bosé.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 617
Ulmus.	Orme.	Cl. XV, ord. 4. Amentacées.	III. 700

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. Pag.
Heuchera.	Heuchère.	Cl. XIV, ordre 11. Saxifrages.	III. 214
Velezia.	Vélézie.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 184
Swertia.	Svertie.	Cl. VIII, ordre 13. Gentianes.	II. 202
Gentiana.	Gentiane.	idem.	II. 197
Phyllis.	Phyllis.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 552
Eryngium.	Panicaut.	Cl. XII, ordre 2. Ombellifères.	II. 649
Hydrocotyle.	Hydrocotyle.	idem.	II. 652
Sanicula.	Sanicle.	idem.	II. 647
Astrantia.	Astrance.	idem.	II. 646
Bupleurum.	Buplèvre.	idem.	II. 642
Echinophora.	Echinophore.	idem.	II. 648
Hasselquistia.	Hasselquistia.	idem.	II. 641
Tordylium.	Tordyle.	idem.	II. 640
	Caucalide.	idem.	II. 640
Caucalis.	Caucalide.	idem.	II. 639
Artedia.	Artédie.	idem.	II. 642
Daucus.	Carotte.	idem.	II. 636
	Ammi.	idem.	II. 635
Ammi.	Ammi.	idem.	II. 635
	Carotte.	idem.	II. 637
Bunium.	Terre noix.	idem.	II. 634
Conium.	Cigue. *Cicuta.* Juss.	idem.	II. 633
Selinum.	Selin.	idem.	II. 631
Athamantha.	Athamanthe.	idem.	II. 631
	Peucédan.	idem.	II. 629
Peucedanum.	Peucédan.	idem.	II. 628
Crithmum.	Bacille.	idem.	II. 631
Cachrys.	Armarinte.	idem.	II. 629
Ferula.	Férule.	idem.	II. 626
Laserpitium.	Laser.	idem.	II. 623
Heracleum.	Berce.	idem.	II. 625
Ligusticum.	Livèche.	idem.	II. 621
Angelica.	Angélique.	idem.	II. 620
Sium.	Berle.	idem.	II. 618
Sison.	Sison.	idem.	II. 617
Bubon.	Bubon.	idem.	II. 615

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Cuminum.	Cumin.	idem.	II. 614
Œnanthe.	OEnanthe.	idem.	II. 613
Phellandrium.	Phellandri.	idem.	II. 612
Cicuta.	Ciguë. *Cicutaria.* Juss.	idem.	II. 612
Æthusa.	OEthuse.	idem.	II. 611
Coriandrum.	Coriandre.	idem.	II. 610
Scandix.	Myrrhide. Cerfeuil.	idem.	II. 608
Chærophyllum.	Cerfeuil.	idem.	II. 606
Imperatoria.	Impératoire.	idem.	II. 603
Seseli.	Seseli.	idem.	II. 605
	Boucage.	idem.	II. 598
Thapsia.	Thapsie.	idem.	II. 605
	Laser.	idem.	II. 624
Pastinaca.	Panais.	idem.	II. 603
Smyrnium.	Macéron.	idem.	II. 602
Anethum.	Anet. Fenouil.	idem.	II. 601
Carum.	Carvi.	idem.	II. 599
Pimpinella.	Boucage.	idem.	II. 598
Apium.	Ache. Persil.	idem.	II. 600
Ægopodium.	Podagraire.	idem.	II. 597
3.			
Trigynia.			
Rhus.	Sumac.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 567
Viburnum.	Viorne.	Cl. XI, ord. 3. Chèvre-feuilles.	II. 579
Cassine.	Cassine.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 596
Sambucus.	Sureau.	Cl. XI; ordre 3. Chèvre-feuilles.	II. 587
Spathelia.	Spathélie.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 574
Staphylœa.	Staphylé.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 590
Tamarix.	Tamaris.	Cl. XIV, ordre 4. Portulacées.	III. 242
Xylophylla.	Xylophylle.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 635
Turnera.	Turnère.	Cl. XIV, ordre 4. Portulacées.	III. 240
Telephium.	Télephe.	idem.	III. 243
Corrigiola	Corrigiole.	idem.	III. 243

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Pharnaceum.	Pharnace.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 156
Alsine.	Morgeline.	idem.	III. 155
Drypis.	Drypis.	idem.	III. 184
Basella.	Baselle.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 619
Sarothra.	Sarothra.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 184
4.			
Tetragynia.			
Parnassia.	Parnassie.	Cl. XIII, ordre 4. Capriers.	II. 765
Evolvulus.	Liserolle.	Cl. VIII, ordre 10. Liserons.	II. 181
5.			
Pentagynia.			
Aralia.	Aralie.	Cl. XII, ordre 1. Aralies.	II. 594
Statice.	Staticée.	Cl. VII, ordre 4. Dentelaires.	I. 659
Linum.	Lin.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 186
Drosera.	Rossolis.	Cl. XIII, ordre 4. Capriers.	II. 764
Giseckia.	Gisèque.	Cl. XIV, ordre 4. Portulacées.	III. 241
Crassula.	Crassule.	Cl. XIV, ordre 1. Joubarbes.	III. 192
Mahernia.	Maherne.	Cl. XIII, ordre 19. Tiliacées.	III. 109
Sibbaldia.	Sibbaldie.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 364
6.			
Polygynia.			
Myosurus.	Myosure.	Cl. XIII, ordre 1. Renonculacées.	II. 675
CLASSIS VI.			
HEXANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Bromelia.	Ananas.	Cl. III, ordre 5. Ananas.	I. 436
Tillandsia.	Tillandsie.	idem.	I. 452

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Lachenalia.	Lachenale.	Cl. III, ordre 6. Asphodèles.	I. 473
Tradescantia.	Ephémerine.	Cl. III, ordre 3. Joncs.	I. 431
Pontederia.	Pontederia.	Cl. III, ordre 7. Narcisses.	I. 509
Hæmanthus.	Hémanthe.	idem.	I. 496
Galanthus.	Galantine.	idem.	I. 508
Leucoium.	Perceneige.	idem.	I. 507
Tulbagia.	Tulbagia.	idem.	I. 495
Narcissus.	Narcisse.	idem.	I. 504
Pancratium.	Pancrais.	idem.	I. 502
Massonia.	Massone.	Cl. III, ordre 6. Asphodèles.	I. 475
Crinum.	Crinole.	Cl. III, ordre 7. Narcisses.	I. 492
Amaryllis.	Amaryllis.	idem.	I. 497
Bulbocodium.	Bulbocode.	idem.	I. 491
Aphyllanthes.	Bragalou.	Cl. III, ordre 3. Joncs.	I. 427
Allium.	Ail.	Cl. III, ordre 6. Asphodèles.	I. 482
Lilium.	Lis.	Cl. III, ordre 4. Lis.	I. 447
Fritillaria.	Fritillaire.	idem.	I. 445
	Impériale. *Imperialis.* Juss.	idem.	I. 446
	Basilée. *Basilea.* Juss.	Cl. III, ordre 6. Asphodèles.	I. 469
Uvularia.	Uvulaire.	Cl. III, ordre 4. Lis.	I. 444
Gloriosa.	Superbe. *Methonica.* Juss.	idem.	I. 443
Erythronium.	Dent de chien.	idem.	I. 443
Tulipa.	Tulipe.	idem.	I. 441
Albuca.	Albuca.	Cl. III, ordre 6. Asphodèles.	I. 476
Hypoxis.	Hypoxis.	Cl. III, ordre 7. Narcisses.	I. 508
Ornithogalum.	Ornithogale.	Cl. III, ordre 6. Asphodèles.	I. 480
Scilla.	Scille.	idem.	I. 477
Cyanella.	Cyanelle.	idem.	I. 475
Asphodelus.	Asphodèle.	idem.	I. 468
Anthericum.	Phalangère. *Phalangium.* Juss.	Cl. III, ordre 6. Asphodèles.	I. 467
	Anthéric.	idem.	I. 465
	Narthec. *Narthecium.* Juss.	Cl. III, ordre 3. Joncs.	I. 435

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Leontice.	Léontice.	Cl. XIII, ordre 18. Vinettiers.	III. 102
Asparagus.	Asperge.	Cl. III, ordre 2. Asperges.	I. 411
Dracæna.	Dragonier.	idem.	I. 408
	Dianelle. *Dianella.* Juss.	idem.	I. 410
Convallaria.	Muguet.	idem.	I. 416
Polyanthes.	Tubéreuse.	Cl. III, ordre 7. Narcisses.	I. 510
Hyacinthus.	Jacinthe.	Cl. III, ordre 6. Asphodèles.	I. 470
	Lanaire. *Lanaria.* Aiton.	idem.	I. 474
Phormium. V.	Lachenale.	idem.	I. 473 et suppl.
Aletris.	Alétris.	idem.	I. 459
Yucca.	Yucca.	Cl. III, ordre 4. Lis.	I. 450
Aloe.	Aloës.	Cl. III, ordre 6. Asphodèles.	I. 461
Agave.	Agavé.	Cl. III, ordre 5. Ananas.	I. 457
Alstroemeria.	Alstrœmère.	Cl. III, ordre 7. Narcisses.	I. 511
Gethyllis.	Géthyllide.	idem.	I. 490
Hemerocallis.	Hémérocalle.	idem.	I. 491
Acorus.	Acore.	Cl. III, ordre 1. Aroïdes.	I. 334
Orontium.	Oronce.	idem.	I. 334
Juncus.	Jonc.	Cl. III, ordre 3. Joncs.	I. 427
Achras.	Sapotillier.	Cl. VIII, ordre 15. Sapotilliers.	II. 238
	Lucuma. Juss.	idem.	II. 238
Prinos.	Apalachine.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 601
Bursera.	Gomart.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 577
Berberis.	Vinettier.	Cl. XIII, ordre 18. Vinettiers.	III. 100
Canarina.	Canarine.	Cl. IX, ordre 4. Campanulacées.	II. 360
Frankenia.	Franquenne.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 185
Peplis.	Péplide.	Cl. XIV, ordre 9. Salicaires.	III. 316
2.			
Digynia.			
Oryza.	Riz.	Cl. II, ordre 4. Graminées.	I. 394
Falkia.	Falkie.	Cl. VIII, ordre 9. Borraginées.	II. 170
Atraphaxis.	Atraphaxe.	Cl. VI, ordre 5. Polygonées.	I. 602

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
3.			
Trigynia.			
Rumex.	Patience.	idem.	I. 606
Flagellaria.	Flagellaire.	Cl. III, ordre 2. Asperges.	I. 411
Scheuchzeria.	Scheuchzère.	Cl. III, ordre 3. Joncs.	I. 435
Triglochin.	Troscart.	idem.	I. 435
Melanthium.	Mélanthe.	idem.	I. 436
Medeola.	Médéole.	Cl. III, ordre 2. Asperges.	I. 415
Trillium.	Trillium.	idem.	I. 415
Colchicum.	Colchique.	Cl. III, ordre 3. Joncs.	I. 439
Helonias.	Hélonias.	idem.	I. 436
4.			
Tetragynia.			
Petiveria.	Pétivier.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 617
5.			
Polygynia.			
Alisma.	Plantain d'eau.	Cl. III, ordre 3. Joncs.	I. 434
	Fluteau. *Damasonium.* Juss.	idem.	I. 435
CLASSIS VII.			
HEPTANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Trientalis.	Trientale.	Cl. VIII, ordre 1. Lysimachies.	I. 669
Disandra.	Disandre.	Cl. VIII, ordre 2. Pédiculaires.	I. 693
Æsculus.	Marronier d'Inde.	Cl. XIII, ordre 6. Erables.	II. 773

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
2.			
Digynia.			
Limeum.	Liméole.	Cl. XIV, ordre 4. Portulacées.	III. 245
3.			
Tetragynia.			
Saururus.	Saurure.	Cl. I, ordre 6. Naïades.	I. 321
Aponogeton.	Aponogeton.	idem.	I. 321
4.			
Heptagynia.			
Septas.	Septas.	Cl. XIV, ordre 1. Joubarbes.	III. 215
CLASSIS VIII.			
OCTANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Tropæolum.	Capucine.	Cl. XIII, ordre 13. Gérâniums.	III. 30
Rhexia.	Rhexie.	Cl. XIV, ordre 8. Mélastomes.	III. 301
Œnothera.	Onagre.	Cl. XIV, ordre 6. Onagres.	III. 274
Gaura.	Gaura.	idem.	III. 279
Epilobium.	Epilobe.	idem.	III. 277
Melicocca.	Knépier.	Cl. XIII, ordre 5. Savoniers.	II. 774
Amyris.	Balsamier.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 573
Ximenia.	Ximenia.	Cl. XIII, ordre 10. Orangers.	II. 798
Fuchsia.	Fuchsie.	Cl. XIV, ordre 6. Onagres.	III. 280
Chlora.	Chlore.	Cl. VIII, ordre 13. Gentianes.	II. 201
Dodonæa.	Dodonée.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 584
Lawsonia.	Lawsone.	Cl. XIV, ordre 9. Salicaires.	III. 304
Vaccinium.	Airelle.	Cl. IX, ordre 3. Bruyères.	II. 295
Erica.	Bruyère.	idem.	II. 264

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Daphne.	Lauréole.	Cl. VI, ordre 2. Thymelées.	I. 498
Dirca.	Dirca.	idem.	I. 577
Gnidia.	Gnidienne.	idem.	I. 585
Stellera.	Stellère.	idem.	I. 583
Passerina.	Passerine.	idem.	I. 581
Lachnæa.	Lachnée.	idem.	I. 584
2.			
Digynia.			
Galenia.	Galiène.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 619
Moehringia.	Méringie.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 167
3.			
Trigynia.			
Polygonum.	Renouée.	Cl. VI, ordre 5. Polygonées.	I. 602
Coccoloba.	Raisinier.	idem.	I. 600
Paullinia.	Paullinie.	Cl. XIII, ordre 5. Savoniers.	II. 767
Cardiospermum.	Coriande.	idem.	II. 766
Sapindus.	Savonier.	idem.	II. 768
4.			
Tetragynia.			
Paris.	Parisette.	Cl. III, ordre 2. Asperges.	I. 416
Adoxa.	Moscatelline.	Cl. XIV, ordre 2. Saxifrages.	III. 223
Elatine.	Elatine.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 157
CLASSIS IX.			
ENNEANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Laurus.	Laurier.	Cl. IV, ordre 4. Lauriers.	I. 506

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Anacardium.	Acajou. *Cassuvium.*	Cl. XIV, ord. 22. Térébintacées.	III. 564
2.			
Trigynia.			
Rheum.	Rhubarbe.	Cl. VI, ordre 5. Polygonées.	I. 610
3.			I
Hexagynia.			
Butomus.	Butome.	Cl. III, ordre 3. Joncs.	I. 483
CLASSIS X.			
DECANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Sophora.	Sophore.	Cl. XIV, ordre 11. Légumineuses.	III. 446
Anagyris.	Anagyre.	idem.	III. 445
Cercis.	Gainier.	idem.	III. 443
Bauhinia.	Bauhine.	idem.	III. 442
Hymenæa.	Courbaril.	idem.	III. 441
Parkinsonia.	Parkinset.	idem.	III. 438
Cassia.	Casse.	idem.	III. 436
Poinciana.	Poincillade.	idem.	III. 438
Cæsalpinia.	Brésillet.	idem.	III. 439
Guilandina.	Bonduc.	idem.	III. 440
	Chicot. *Gymnocladus.* Juss.	idem.	III. 424
	Ben. *Moringa.* Juss.	idem.	III. 436
Guaiacum.	Gayac.	Cl. XIII, ordre 21. Rutacées.	III. 141
	Scotie. *Schotia.* Juss.	Cl. XIV, ord. 11. Légumineuses.	III. 429
Dictamnus.	Fraxinelle.	Cl. XIII, ordre 21. Rutacées.	III. 144

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Ruta.	Rue.	idem.	III. 142
Toluifera.	Tolut.	Cl. XIV, ord. 12. Térébinfacées.	III. 577
Hæmatoxylon.	Campêche.	Cl. XIV, ord. 11. Légumineuses.	III. 437
Murraya.	Murrai.	Cl. XIII, ordre 10. Orangers.	II. 798
Trichilia.	Trichilie.	Cl. XIII, ordre 11. Azédarachs.	II. 813
Swietenia.	Mahogon.	idem.	II. 816
Melia.	Azédarach.	idem.	II. 814
Quassia.	Simarouba.	Cl. XIII, ordre 15. Magnoliers.	III. 93
Zygophyllum.	Fabagelle.	Cl. XIII, ord. 21. Rutacées.	III. 159
Fagonia.	Fagone.	idem.	III. 138
Tribulus.	Tribule.	idem.	III. 137
Limonia.	Limonellier.	Cl. XIII, ordre 10. Orangers.	II. 806
Monotropa.	Sucepin.	Place incertaine.	IV. 7
Dionæa.	Dionée.	Place incertaine.	IV. 8
Jussiæa.	Jussie.	Cl. XIV, ord. 6. Onagres.	III. 273
Dais.	Daïs.	Cl. VI, ordre 2. Thymelées.	I. 584
Melastoma.	Mélastome.	Cl. XIV, ordre 8. Mélastomes.	III. 299
Kalmia.	Kalmie.	Cl. IX, ordre 2. Rosages.	II. 249
Ledum.	Lédier.	idem.	II. 259
Rhododendrum.	Rosage.	idem.	II. 252
Andromeda.	Andromède.	Cl. IX, ordre 3. Bruyères.	II. 284
Epigæa.	Epigée.	idem.	II. 293
Gaultheria.	Gaultherie.	idem.	II. 294
Arbutus.	Arbousier.	idem.	II. 288
Clethra.	Cléthra.	idem.	II. 290
Pyrola.	Pyrole.	idem.	II. 292
Styrax.	Aliboufier.	Cl. IX, ordre 1. Plaqueminiers.	II. 245
Samyda.	Samyda.	Place incertaine.	IV. 14
Copaifera.	Copahu.	Cl. XIV, ord. II. Légumineuses.	III. 562
Bucida.	Grignon.	Cl. VI, ordre 1. Chalefs.	I. 575
2.			
Digynia.			
Royena.	Royène.	Cl. IX, ordre 1. Plaqueminiers.	II. 244
Hydrangea.	Hydrangée.	Cl. XIV, ordre 2. Saxifrages.	III. 223
Cunonia.	Cunone.	idem.	III. 225

Système de Linné.	Mode de Jussieu.		
			T. pag.
Trianthema.	Trianthème.	Cl. XIV, ordre 4. Portulacées.	III. 245
Chrysosplenium.	Dorine.	Cl. XIV, ordre 2. Saxifrages.	III. 221
Saxifraga.	Saxifrage.	idem.	III. 215
Tiarella.	Tiarelle.	idem.	III. 220
Mitella.	Mitelle.	idem.	III. 221
Scleranthus.	Gnavelle.	Cl. IV, ordre 4. Portulacées.	III. 244
Gysophila.	Gysophile.	Cl. XIII, ord. 23. Caryophyllées.	III. 164
Saponaria.	Saponaire.	idem.	III. 166
Dianthus.	OEillet.	idem.	III. 167
3.			
Trigynia.			
Cucubalus.	Cucubale.	idem.	III. 178
Silene.	Silène.	idem.	III. 173
Stellaria.	Stellaire.	idem.	III. 163
Arenaria.	Sabline.	idem.	III. 160
Cherleria.	Cherlerie.	idem.	III. 160
Garidella.	Garidelle.	Cl. XIII, ord. 1. Renonculacées.	II. 680
Malpighia.	Malpighie.	Cl. XIII, ordre 7. Malpighies.	II. 783
Banisteria.	Banistère.	idem.	II. 782
4.			
Pentagynia.			
Averrhoa.	Carambolier. Bilimbi.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 585
Spondias.	Monbin.	idem.	III. 578
Cotyledon.	Cotylet.	Cl. XIV, ordre 1. Joubarbes.	III. 200
Sedum.	Orpin.	idem.	III. 203
Penthorum.	Penthorum.	idem.	III. 213
Oxalis.	Surelle.	Cl. XIII, ordre 13. Géraniens.	III. 35
Agrostema.	Coquelourde.	Cl. XIII, ord. 22. Caryophyllées.	III. 182
Lychnis.	Lychnide.	idem.	III. 180
Cerastium.	Céraiste.	idem.	III. 166
Spergula.	Spergule.	idem.	III. 167
Forskalea.	Forskale.	Cl. XV, ordre 2. Orties.	III. 710

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
5.			
Decagynia.			
Phytolacca.	Phytolacca.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 624
CLASSIS XI.			
DODECANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Asarum.	Asaret.	Cl. V, ordre 1. Aristoloches.	I. 568
Bocconia.	Boccone.	Cl. XIII, ordre 2. Papavéracées.	II. 699
Blakea.	Blakée.	Cl. XIV, ordre 8. Mélastomes.	III. 299
Befaria.	Béfar.	Cl. IX, ordre 2. Rosages.	II. 261
Halesia.	Halésie.	Cl. IX, ordre I. Plaqueminiers.	II. 247
Decumaria.	Décumaire.	Cl. XIV, ordre 7. Myrtes.	III. 293
Winterania.	Wintère.	Cl. XIII, ordre 11. Azédarachs.	II. 812
Triumfetta.	Lapulier.	Cl. XIII, ordre 19. Tiliacées.	III. 112
Peganum.	Harmale.	Cl. XIII, ordre 21. Rutacées.	III. 144
Nitraria.	Nitraire.	Cl. XIV, ordre 5. Ficoïdes.	III. 248
Portulaca.	Pourpier.	Cl. XIV, ordre 4. Portulacées.	III. 239
	Talin. *Talinum.*	idem.	III. 240
Lythrum.	Salicaire.	Cl. XIV, ordre 19. Salicaires.	III. 305
	Cuphée. *Cuphea.*	idem.	III. 307
2.			
Digynia.			
Heliocarpos.	Héliocarpe.	Cl. XIII, ordre 19. Tiliacées.	III. 111
Agrimonia.	Aigremoine.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 360
	Ancistre.	idem.	III. 359
3.			
Trigynia.			
Reseda.	Réséda.	Cl. XIII, ordre 4. Capriers.	III. 762

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Euphorbia.	Euphorbe.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 622
4.			
Pentagynia.			
Glinus.	Glinole.	Cl. XIV, ordre 5. Ficoïdes.	III. 250
5.			
Polygynia.			
Sempervivum.	Joubarbe.	Cl. XIV, ordre 1. Joubarbes.	III. 209
CLASSIS XII.			
ICOSANDRIA.			
1.			
Monogynia.			
Cactus.	Cactier.	Cl. XIV, ordre 3. Cactiers.	III. 225
Phyladelphus.	Syringa.	Cl. XIV, ordre 7. Myrtes.	III. 295
Psidium.	Goyavier.	idem.	III. 286
Eugenia.	Jambosier.	idem.	III. 291
Myrtus.	Myrte.	idem.	III. 287
Punica.	Grenadier.	idem.	III. 293
Amygdalus.	Amandier.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 399
	Pêcher. *Persica.* N.	idem.	III. 402
Prunus.	Prunier.	idem.	III. 392
	Cerisier. *Cerasus.* Juss.	idem.	III. 385
	Abricotier. *Armeniaca.* Juss.	idem.	III. 397
Plinia.	Plinie.	idem.	III. 408
Chrysobalanus.	Icaquier.	idem.	III. 384

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
2.			
Digynia.			
Cratægus.	Alisier.	idem.	III. 331
	Néflier.	idem.	III. 327
3.			
Trigynia.			
Sorbus.	Sorbier.	idem.	III. 333
Sesuvium.	Sésuve.	Cl. XIV, ordre 5. Ficoïdes.	III. 249
4.			
Pentagynia.			
Mespilus.	Alisier.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 331
	Néflier.	idem.	III. 327
Pyrus.	Poirier.	idem.	III. 318
	Pommier. *Malus.* Juss.	idem.	III. 311
Tetragonia.	Tétragone.	Cl. XIV, ordre 5. Ficoïdes.	III. 268
	Cercodée.	Cl. XIV, ordre 6. Onagres.	III. 270
Mesembryanthemum.	Ficoïde.	Cl. XIV, ordre 5. Ficoïdes.	III. 251
Aizoon.	Lanquette.	idem.	III. 249
Spiræa.	Spirée.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 380
5.			
Polygynia.			
Rosa.	Rosier.	idem.	III. 336
Rubus.	Ronce.	idem.	III. 376
Fragaria.	Fraisier.	idem.	III. 369
Potentilla.	Potentille.	idem.	III. 365
Tormentilla.	Tormentille.	idem.	III. 365
Geum.	Benoîte.	idem.	III. 376

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Dryas.	Dryade.	idem.	III. 375
Comarum.	Comaret.	idem.	III. 373
Calycanthus.	Calycanthe.	idem.	III. 408

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

I.

Monogynia.

Ternstromia.	Ternstrome.	Cl. XIII, ordre 10. Orangers.	II. 806
Capparis.	Caprier.	Cl. XIII, ordre 4. Capriers.	II. 759
Actæa.	Actée.	Cl. XIII, ordre 1. Renonculacées.	II. 691
Sanguinaria.	Sanguinaire.	Cl. XIII, ordre 2. Papavéracées.	II. 693
Podophyllum.	Podophylle.	Cl. XIII, ordre 1. Renonculacées.	II. 690
Chelidonium.	Chélidoine.	Cl. XIII, ordre 2. Papavéracées.	II. 699
Papaver.	Pavot.	idem.	II. 695
Argemone.	Argémone.	idem.	II. 694
Cambogia.	Gutier.	Cl. XIII, ordre 9. Guttiers.	II. 797
Muntingia.	Calabure.	Cl. XIII, ordre 19. Tiliacées.	III. 114
Sarracenia.	Sarracénie.	Place incertaine.	IV. 40
Nymphæa.	Nénuphar.	Cl. IV, ordre 4. Morrènes.	I. 560
	Nélumbo. *Nelumbium*, Juss.	idem.	I. 561
Bixa.	Rocou.	Cl. XIII, ordre 19. Tiliacées.	III. 120
Sloanea.	Apeiba. Juss.	idem.	III. 113
Mammea.	Mamei.	Cl. XIII, ordre 9. Guttiers.	II. 796
Tilia.	Tilleul.	Cl. XIII, ordre 19. Tiliacées.	III. 117
Lagerstromia.	Lagerstrome.	Cl. XIV, ordre 9. Salicaires.	III. 302
Thea.	Thé.	Cl. XIII, ordre 10. Orangers.	II. 805
Cistus.	Ciste.	Cl. XIII, ordre 20. Cistes.	III. 128
	Hélianthème. *Helianthemum.* Juss.	idem.	III. 127
Corchorus.	Corète.	Cl. XIII, ordre 19. Tiliacées.	III. 116

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
2.			
Digynia.			
Pœonia.	Pivoine.	Cl. XIII, ord. 1. Renonculacées.	II. 688
Fothergilla.	Fothergil.	Cl. XV, ordre 4. Amentacées.	III. 699
Calligonum.	Calligon.	Cl. VI, ordre 5. Polygonées.	I. 613
3.			
Trigynia.			
Delphinium.	Dauphinelle.	Cl. XIII, ord. 1. Renonculacées.	II. 683
Aconitum.	Aconit.	idem.	II. 685
4.			
Tetragynia.			
Cimicifuga.	Cimicaire.	idem.	II. 690
5.			
Pentagynia.			
Aquilegia.	Ancolie.	idem.	II. 681
Nigella.	Nielle.	idem.	II. 679
6.			
Hexagynia.			
Stratiotes.	Stratiote.	Cl. IV, ordre 3. Morrènes.	I. 559
7.			
Polygynia.			
Wintera.	Drymis. Juss.	Cl. XIII, ordre 15. Magnoliers.	III. 85
Illicium.	Badiane.	idem.	III. 85
Liriodendrum.	Tulipier.	idem.	III. 91
Magnolia.	Magnolier.	idem.	III. 88

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Michelia.	Champac.	Cl. XIII, ordre 15. Magnoliers.	III. 87
Annona.	Corossol.	Cl. XIII, ordre 17. Anones.	III. 94
Anemone.	Anémone.	Cl. XIII, ordre 1. Renonculacées.	II. 663
Atragene.	Atragène.	idem.	II. 659
Clematis.	Clématite.	idem.	II. 656
Thalictrum.	Pigamon.	idem.	II. 660
Adonis.	Adonide.	idem.	II. 667
Ranunculus.	Renoncule.	idem.	II. 668
Trollius.	Trolle.	idem.	II. 675
Isopyrum.	Isopyre.	idem.	II. 678
Helleborus.	Ellébore.	idem.	II. 676
Caltha.	Populage.	idem.	II. 687
Hydrastis.	Hydraste.	idem.	II. 662

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

I.

Gymnospermia.

Ajuga.	Bugle. *Bugula.* Juss.	Cl. VIII, ordre 6. Labiées.	II. 21
Teucrium.	Germandrée.	idem.	II. 22
Satureia.	Sarriète.	idem.	II. 30
Thymbra.	Thymbra.	idem.	II. 69
Hyssopus.	Hysope.	idem.	II. 31
Nepeta.	Chataire.	idem.	II. 33
Lavandula.	Lavande.	idem.	II. 36
Sideritis.	Crapaudine.	idem.	II. 39
Mentha.	Menthe.	idem.	II. 42
Perilla.	Périlla.	idem.	II. 36
Glecoma.	Terrète.	idem.	II. 45
Lamium.	Lamier.	idem.	II. 45
Galeopsis.	Galéope.	idem.	II. 47
Betonica.	Bétoine.	idem.	II. 48
Stachis.	Stachide.	idem.	II. 50
Ballota.	Ballote.	idem.	II. 54

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Marrubium.	Marrube.	idem.	II. 55
Leonurus.	Agripaume.	idem.	II. 57
Phlomis.	Phlomide.	idem.	II. 59
Molucella.	Molucelle.	idem.	II. 62
Clinopodium.	Clinopode.	idem.	II. 63
Origanum.	Origan.	idem.	II. 64
Thymus.	Thym.	idem.	II. 66
Melissa.	Mélisse.	idem.	II. 69
Dracocephalum.	Dracocéphale.	idem.	II. 71
Melittis.	Mélissot.	idem.	II. 74
Ocymum.	Basilic.	idem.	II. 75
Trichostema.	Trichostéma.	idem.	II. 78
Scutellaria.	Toque.	idem.	II. 79
Prunella.	Brunelle. *Brunella.* Juss.	idem.	II. 78
Cleonia. V. *Prunella.*	Congénère à la brunelle. Juss.		
Prasium.	Prasi.	idem.	II. 81
2.			
Angiospermia.			
Bartsia.	Bartsie.	Cl. VIII, ordre 2. Pédiculaires.	I. 695
Rhinanthus.	Cocrète.	idem.	I. 697
Euphrasia.	Eufraise.	idem.	I. 694
Melampyrum.	Mélampyre.	idem.	I. 698
Lathræa.	Clandestine.	idem.	I. 699
Pedicularis.	Pédiculaire.	idem.	I. 696
Gerardia.	Gérarde.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II. 91
Chelone.	Galane.	Cl. VIII, ordre 12. Bignones.	II. 187
Gesneria.	Gesnère.	Cl. IX, ord. 4. Campanulacées.	II. 310
Anthirrinum.	Muflier. *Antirrhinum.* Juss.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II. 96
	Linaire. *Linaria.* Juss.	idem.	II. 91
Martynia.	Cornaret.	Cl. VIII, ordre 12. Bignones.	II. 195
Scrophularia.	Scrophulaire.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II. 87

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T.	pag.
Besleria.	Bestère.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	IV.	47
Celsia.	Celsie.	Cl. VIII, ordre 8. Solanées.	II.	106
Digitalis.	Digitale.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II.	98
Bignonia.	Bignone.	Cl. VIII, ordre 12. Bignones.	II.	193
	Catalpa. Juss.	idem.	II.	189
	Técoma. Juss.	idem.	II.	191
	Jasminée. *Gelseminum.* Juss.	Cl. VIII, ordre 14. Apocinées.	II.	232
Citharexylum.	Cotelet.	Cl. VIII, ordre 5. Gattiliers.	I.	732
Halleria.	Haller.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II.	86
Crescentia.	Calebassier.	Cl. VIII, ordre 8. Solanées.	II.	142
Lantana.	Camara.	Cl. VIII, ordre 5. Gattiliers.	I.	735
	Spilman. *Spielmannia.* Juss.	idem.	I.	787
Cornutia.	Agnante.	idem.	I.	731
Capraria.	Capraire.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II.	85
Selago.	Selague.	Cl. VIII, ordre 5. Gattiliers.	I.	741
Manulea.	Manulée.	Cl. VIII, ordre 2. Pédiculaires.	I.	694
Hebenstretia.	Hébenstrète.	Cl. VIII, ordre 5. Gattiliers.	I.	742
Erinus.	Erine.	Cl. VIII, ordre 2. Pédiculaires.	I.	693
Browallia.	Broualle.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II.	104
Linnæa.	Linnée.	Cl. XI, ordre 3. Chèvre-feuilles.	II.	572
Sibtorpia.	Sibtorpie.	Cl. VIII, ordre 2. Scrophulaires.	I.	692
Limosella.	Limoselle.	Cl. VIII, ordre 1. Lysimachies.	I.	669
Orobanche.	Orobanche.	Cl. VIII, ordre 2. Pédiculaires.	I.	699
Dodartia.	Dodart.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II.	90
Lippia. V. *Selago.*				
Sesamum.	Sésame.	Cl. VIII, ordre 12. Bignones.	II.	188
Mimulus.	Mimule.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II.	103
Ruellia.	Ruellie.	Cl. VIII, ordre 3. Acanthes.	I.	702
Barleria.	Barrelière.	idem.	I.	702
Duranta.	Duraute.	Cl. VIII, ordre 5. Gattiliers.	I.	734
Volkameria.	Volkamer.	idem.	I.	728
Clerodendrum.	Péragut.	idem.	I.	727 et addit.
Vitex.	Gattilier.	idem.	I.	729
Bontia.	Daphnot.	Cl. VIII, ordre 8. Solanées.	II.	141

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Columnea.	Colomnée.	Cl. VIII, ordre 7. Scrophulaires.	II. 101
Acanthus.	Acanthe.	Cl. VIII, ordre 3. Acanthes.	I. 701
Pedalium.	Pédalium.	Cl. VIII, ordre 12. Bignones.	II, 198
Melianthus.	Mélianthe.	Cl. XIII, ordre 21. Rutacées.	III. 146

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

1.

Siliculosa.

Myagrum.	Caméline.	Cl. XIII, ordre 3. Crucifères.	II. 750
Vella.	Vella.	idem.	II. 749
Anastatica.	Jérose.	idem.	II. 748
Subularia.	Subulaire.	idem.	II. 738
Draba.	Drave.	idem.	II. 739
Lepidium.	Passerage.	idem.	II. 746
Thlaspi.	Thlaspi.	idem.	II. 745
Cochlearia.	Cochlearia.	idem.	II. 740
Iberis.	Ibéride.	idem.	II. 742
Alyssum.	Alysse.	idem.	II. 736
Clypeola.	Clypéole.	idem.	II. 735
Peltaria. V. *Clypeola.*			
Biscutella.	Lunétière.	idem.	II. 734
Lunaria.	Lunaire.	idem.	II. 733

2.

Siliquosa.

Ricotia.	Ricotie.	idem.	II. 732
Dentaria.	Dentaire.	idem.	II. 731
Cardamine.	Cresson.	idem.	II. 729
Sisymbrium.	Sisimbre.	idem.	II. 725
	Cresson.	idem.	II. 729

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Erysimum.	Velar.	idem.	II. 724
	Julienne.	idem.	II. 719
Cheiranthus.	Giroflée.	idem.	II. 722
	Julienne.	idem.	II. 717 et 718
Heliophila.	Héliophile.	idem.	II. 721
Hesperis.	Julienne.	idem.	II. 716
Arabis.	Arabette.	idem.	II. 715
Turritis.	Tourrète.	idem.	II. 714
Brassica.	Chou.	idem.	II. 709
Sinapis.	Moutarde.	idem.	II. 707
Raphanus.	Raifort.	idem.	II. 706
Bunias.	Bunias.	idem.	II. 751
Isatis.	Pastel.	idem.	II. 754
Crambe.	Crambé.	idem.	II. 752
Cleome.	Mozambé.	Cl. XIII, ordre 4. Capriers.	II. 756

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

1.

Pentandria.

Waltheria.	Walthérie.	Cl. XIII, ordre 19. Tiliacées.	III. 106
Hermannia.	Hermane.	idem.	III. 107
Melochia.	Mélochie.	Cl. XIII, ordre 14. Malvacées.	III. 69

2.

Enneandria.

Aitonia.	Aitone.	Cl. XIII, ordre 11. Azédarachs.	II. 812

3.

Decandria.

Geranium.	Géranion.	Cl. XIII, ordre 13. Géraniens.	III. 5

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
4.			
Dodecandria.			
Pentapetes.	Pentapètes.	Cl. XIII, ordre 14. Malvacées.	III. 75
5.			
Polyandria.			
Adansonia.	Baobab.	idem.	III. 74
Barringtonia.	Butonic. *Butonica.* Juss.	Cl. XIV, ordre 7. Myrtes.	III. 297
Carolinea.	Pachire. *Pachira.* Cavanilles.	Cl. XIII, ordre 14. Malvacées.	III. 83
Bombax.	Fromager.	idem.	III. 73
Sida.	Sida.	idem.	III. 55
Solandra.	Solandra.	idem.	III. 60
Malachra.	Malachre.	idem.	III. 52
Althæa.	Guimauve.	idem.	III. 46
Alcea.	Alcée. N. *Althæa.* Juss.	idem.	III. 50
Lavatera.	Lavatère.	idem.	III. 48
Malva.	Mauve.	idem.	III. 39
Malope.	Malopé.	idem.	III. 39
Urena.	Urène.	idem.	III. 54
Gossypium.	Cotonnier.	idem.	III. 68
Hibiscus.	Ketmie.	idem.	III. 61
Stewartia.	Malacodre.	idem.	III. 70
Gordonia.	Gordone.	idem.	III. 71
Camellia.	Camelli.	Cl. XIII, ordre 10. Orangers.	II. 809
CLASSIS XVII.			
DIADELPHIA.			
1.			
Hexandria.			
Fumaria.	Fumeterre.	Cl. XIII, ordre 2. Papavéracées.	II. 701

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
2.			
Octandria.			
Polygala.	Polygale.	Cl. VIII, ordre 1. Pédiculaires.	I. 683
Securidaca.	Sécuridaca.	Cl. XIV, ord. 11. Légumineuses.	III. 563
Dalbergia.	Dalberg.	idem.	III. 560
3.			
Decandria.			
Nissolia.	Nissole.	idem.	III. 561
Abrus.	Abrus.	idem.	III. 507
Pterocarpus.	Ptérocarpe.	idem.	III. 561
Erythrina.	Erythrine.	idem.	III. 502
Piscidia.	Piscidie.	idem.	III. 509
Borbonia.	Borbone.	idem.	III. 452
Spartium.	*V.* Genet. Cytise.		
Genista.	Genet.	idem.	III. 454
	Cytise.	idem.	III. 459
Aspalathus.	Aspalat.	idem.	III. 451
Ulex.	Ajonc.	idem.	III. 450
Amorpha.	Amorpha.	idem.	III. 508
Crotalaria.	Crotalaire.	idem.	III. 464
Ononis.	Bugrane.	idem.	III. 469
	Indigotier.	idem.	III. 530
Anthyllis.	Anthyllide.	idem.	III. 474
Arachis.	Arachide.	idem.	III. 473
Ebenus. V. *Anthyllis.*			
Lupinus.	Lupin.	idem.	III. 467
Phaseolus.	Haricot.	idem.	III. 498
Dolichos.	Dolic.	idem.	III. 495
Glycine.	Glycine.	idem.	III. 504
Clitoria.	Clitore.	idem.	III. 503
Pisum.	Pois. Ochre.	idem.	III. 536
Orobus.	Orobe.	idem.	III 539
Lathyrus.	Gesse.	idem.	III. 531

Vicia.

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Vicia.	Vesce.	idem.	III. 540
	Fève. *Faba.* Juss.	idem.	III. 543
Ervum.	Ers. Lentille.	idem.	III. 545
Cicer.	Ciche.	idem.	III. 547
Liparia.	Liparie.	idem.	III. 453
Cytisus.	Cytise.	idem.	III. 459
	Genet.	idem.	III. 454
Geoffræa.	Umari.	idem.	III. 560
Robinia.	Robinier.	idem.	III. 510
	Caragan.	idem.	III. 512
Colutea.	Baguenaudier.	idem.	III. 522
Glycirrhiza.	Réglisse.	idem.	III. 525
Coronilla.	Coronille.	idem.	III. 550
Ornithopus.	Ornithope.	idem.	III. 548
Hippocrepis.	Hippocrêpe.	idem.	III. 549
Scorpiurus.	Chenille.	idem.	III. 548
Hedysarum.	Sainfoin.	idem.	III. 553
Indigofera.	Indigotier.	idem.	III. 529
Galega.	Galéga.	idem.	III. 527
Phaca.	Phaca.	idem.	III. 521
	Baguenaudier.	idem.	III. 524
Astragalus.	Astragale.	idem.	III. 515
Bisserula.	Pélécine.	idem.	III. 521
Psoralea.	Psoralée.	idem.	III. 477
	Dalée. *Dalea.* Juss.	idem.	III. 479
Trifolium.	Trèfle.	idem.	III. 480
	Mélilot. *Melilotus.* Juss.	idem.	III. 485
Lotus.	Lotier.	idem.	III. 491
Trigonella.	Trigonelle. Fenugrec.	idem.	III. 490
Medicago.	Luzerne.	idem.	III. 486

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. Pag.
CLASSIS XVIII.			
POLYADELPHIA.			
1.			
Pentandria.			
Theobroma.	Cacaoyer.	Cl. XIII, ordre 14. Malvacées.	III. 75
	Guazume. *Guazuma.* Juss.	idem.	III. 78
Abroma.	Ambrome.	idem.	III. 77
2.			
Dodecandria.			
Monsonia.	Monsone.	Cl. XIII, ordre 13. Géraniens.	III. 31
3.			
Icosandria.			
Citrus.	Citronnier. Oranger.	Cl. XIII, ordre 10. Orangers.	II. 799
4.			
Polyandria.			
Munchausia.	*V.* Lagerstrome.		
Melaleuca.	Mélaleuque.	Cl. XIV, ordre 7. Myrtes.	III. 282
	Leptosperme. *Leptospermum.* Juss.	idem.	III. 284
Hopea.	Hopée.	Cl. IX, ordre 1. Plaqueminiers.	II. 248
Hypericum.	Millepertuis.	Cl. XIII, ordre 8. Millepertuis.	II. 787
Ascyrum.	Ascyre.	idem.	II. 787

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
CLASSIS XIX.			
SYNGENESIA.			
I.			
Polygamia æqualis.			
Geropogon.	Géropogon.	Cl. X, ordre 1. Chicoracées.	II. 347
Tragopogon.	Salsifis.	idem.	II. 345
	Barbouquine. *Urospermum.* Juss.	idem.	II. 346
Scorzonera.	Scorzonère.	idem.	II. 343
	Laitron.	idem.	II. 328
Picris.	Picride.	idem.	II. 324
	Helmintie. *Helmintia.* Juss.	idem.	II. 343
Sonchus.	Laitron.	idem.	II. 327
Lactuca.	Laitue.	idem.	II. 324
Chondrilla.	Condrille.	idem.	II. 323
Prenanthes.	Prenanthe.	idem.	II. 322
Leontodon.	Liondent.	idem.	II. 341
	Pissenlit. *Taraxacum.* Juss.	idem.	II. 341
Hieracium.	Epervière.	idem.	II. 331
Crepis.	Crépide.	idem.	II. 336
	Drépanie. *Drepania.* Juss.	idem.	II. 338
Andryala.	Andryale.	idem.	II. 349
Hyoseris.	Hyoséride.	idem.	II. 340
	Hédypnoïde. *Hedypnois.* Juss.	idem.	II. 339

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Seriola.	Sériole.	idem.	II. 348
Hypochœris.	Porcelle.	idem.	II. 348
Lapsana.	Lampsane.		
	Lampsana.		
	Juss.	idem.	II. 321
	Hédypnoïde.		
	Hedypnois.		
	Juss.	idem.	II. 339
	Rhagadiole.		
	Rhagadiolus.		
	Juss.	idem.	II. 321
	Hyoséride.	idem.	II. 340
Catananche.	Cupidone.	idem.	II. 350
Cichorium.	Chicorée.	idem.	II. 351
Scolymus.	Scolyme.	idem.	II. 353
Arctium.	Bardane. *Lappa.*		
	Juss.	Cl. X, ordre 2. Cynarocéphales.	II. 371
	Chardon.	idem.	II. 370
Serratula.	Sarrète.	idem.	II. 384
	Chardon.	idem.	II. 369
	Stéline.	idem.	II. 387
Carduus.	Chardon.	idem.	II. 365
Cnicus.	Quenouille.	idem.	II. 356
	Sarrète.	idem.	II. 385
Onopordum.	Pédane.	idem.	II. 364
Cynara.	Artichaut.	idem.	II. 361
Carlina.	Carline.	idem.	II. 359
Atractylis.	Atractyle.	idem.	II. 365
	Agryphylle. *Agryphyllum.*		
	Juss.	Cl. X, ordre 3. Corymbifères.	II. 518
Carthamus.	Carthame.	Cl. X, ordre 2. Cynarocéphales.	II. 356
Spilanthus.	Spilanthe.	Cl. X, ordre 3. Corymbifères.	II. 505
Bidens.	Bident.	idem.	II. 506
Cacalia.	Cacalie.	idem.	II. 392

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Ethulia.	Ethulie.	idem.	II. 474
Eupatorium.	Eupatoire.	idem.	II. 395
Ageratum.	Agérate.	idem.	II. 400
Pteronia.	Ptéronia.	Cl. X, ordre 2. Cynarocéphales.	II. 386
Stœhelina.	Stéline.	idem.	II. 387
Chrysocoma.	Chrysocome.	Cl. X, ordre 3. Corymbifères.	II. 418
	Verge d'or.	idem.	II. 434
Tarchonanthus.	Tarconante.	idem.	II. 483
Santolina.	Santoline.	idem.	II. 487
Athanasia.	Athanasie.	idem.	II. 484
	Santoline.	idem.	II. 487
2.			
Polygamia superflua.			
Artemisia.	Armoise.	idem.	II. 477
	Grangée. *Grangea*, Juss.	idem.	II. 473
Tanacetum.	Tanaisie.	idem.	II. 475
Gnaphalium.	Gnaphale.	idem.	II. 403
Xeranthemum.	Immortelle.	idem.	II. 401
Carpesium.	Carpésie.	idem.	II. 474
Baccharis.	Bacchante.	idem.	II. 415
Conysa.	Conyse.	idem.	II. 412
	Chrysocome.	idem.	II. 418
	Astère.	idem.	II. 424
	Caléa.	idem.	II. 484
Erigeron.	Vergerolle.	idem.	II. 420
	Bacchante.	idem.	II. 416
Tussilago.	Tussilage.	idem.	II. 441
Senecio.	Séneçon.	idem.	II. 442
Aster.	Astère.	idem.	II. 422
Solidago.	Verge d'or.	idem.	II. 431
Cineraria.	Cinéraire.	idem.	II. 448

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Inula.	Inule.	idem.	II. 437
Arnica.	Arnique.	idem.	II. 456
Doronicum.	Doronic.	idem.	II. 455
Perdicium.	Perdicium.	idem.	II. 440
Helenium.	Hélénie.	idem.	II. 515
Bellis.	Paquerette.	idem.	II. 470
Bellium.	Bellium.	idem.	II. 455
Tagetes.	Tagète.	idem.	II. 454
Leysera.	Leysère.	idem.	II. 410
Zinnia.	Zinnia.	idem.	II. 510
Chrysanthemum.	Chrysanthème.	idem.	II. 464
Matricaria.	Matricaire.	idem.	II. 469
Cotula.	Cotule.	idem.	II. 472
	Lidbeckia. Juss.	idem.	II. 472
	Cénie. *Cenia.* Juss.	idem.	II. 471
Anacyclus.	Anacycle.	idem.	II. 488
Anthemis.	Camomille.	idem.	II. 489
Achillea.	Achillée.	idem.	II. 492
Amellus.	Amelle.	idem.	II. 522
Eclipta.	Eclipte.	idem.	II. 504
Sigesbeckia.	Sigesbeckia.	idem.	II. 502
Verbesina.	Verbesine.	idem.	II. 507
	Eclipte.	idem.	II. 504
Buphtalmum.	Buphtalme.	idem.	II. 498

3.

Polygamia frustranea.

Helianthus.	Hélianthe.	idem.	II. 513
	Buphtalme.	idem.	II. 499
Rudbeckia.	Rudbecque.	idem.	II. 516
Coreopsis.	Coriope.	idem.	II. 508
Gorteria.	Gortère.	idem.	II. 458
Zegœa.	Zégée.	Cl. X, ordre 2: Cynarocéphales.	II. 379

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Centaurea.	Crocodilium. Juss.	idem.	II. 372
	Chaussetrape. *Calcitrapa.* Juss.	idem.	II. 373
	Stebé. *Seridia.* Juss.	idem.	II. 375
	Jacée. *Jacea.* Juss.	idem.	II. 376
	Bleuet. *Cyanus.* Juss.	idem.	II. 378
	Rhaponticum. Juss.	idem.	II. 380
	Centaurea. Juss.	idem.	II. 381

4.

Polygamia necessaria.

Milleria.	Millerie.	Cl. X, ordre 3. Corymbifères.	II. 501
Baltimora.	Baltimore.	idem.	II. 503
Silphium.	Silphide.	idem.	II. 511
	Buphtalme.	idem.	II. 499
Polymnia.	Polymnie.	idem.	II. 502
	Didelta. Juss.	idem.	II. 453
Melampodium.	Mélampode.	idem.	II. 512
Calendula.	Souci.	idem.	II. 461
Arctotis.	Arctotide.	idem.	II. 519
Osteospermum.	Portecollier.	idem.	II. 460
Othonna.	Othonne.	idem.	II. 451
Hippia.	Hippie.	idem.	II. 475
Eriocephalus.	Eriocéphale.	idem.	II. 497
Micropus.	Microp.	idem.	II. 486

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
5.			
Polygamia segregata.			
Elephantopus.	Eléphantope.	idem.	II. 400
Sphœranthus.	Sphœranthus.	Cl. X, ordre 2. Cynarocéphales.	II. 389
Echinops.	Boulette.	idem.	II. 387
Gundelia.	Gundèle.	idem.	II. 390
6.			
Monogamia.			
Seriphium.	Armoselle.	Cl. X, ordre 3. Corymbifères.	II. 411
Corymbium.	Corymbiole.	Cl. X, ordre 2. Cynarocéphales.	II. 389
Jasione.	Jasione.	Cl. IX, ordre 4. Campanulacées.	II. 316
Lobelia.	Lobélie.	idem.	II. 312
Viola.	Violette.	Cl. XIII, ordre 20. Cistes.	III. 132
Impatiens.	Balsamine.	Cl. XIII, ordre 13. Géraniens.	III. 54
CLASSIS XX.			
GYNANDRIA.			
1.			
Diandria.			
Orchis.	Orquis.	Cl. IV, ordre 3. Orquidées.	I. 547
Satyrium.	Satyrion.	idem.	I. 550
Ophrys.	Ophrys.	idem.	I. 551
Serapias.	Elléborine.	idem.	I. 553
Limodorum.	Limodorum.	idem.	I. 554
Arethusa.	Aréthuse.	idem.	I. 556
Cypripedium.	Sabot.	idem.	I. 556
Epidendrum.	Angrec.	idem.	I. 557
Gunnera.	Gunnère.	Cl. XV, ordre 3. Orties.	III. 715

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
2.			
Triandria.			
Sysyrinchium.	Bermudienne.	Cl. III, ordre 7. Iris,	I. 514
Ferraria.	Ferrare.	idem.	I. 516
	Tigride. *Tigridia.* Juss.	idem.	I. 515
3.			
Pentandria.			
Ayenia.	Ayène.	Cl. XIII, ordre 14. Malvacées.	III. 80
Passiflora.	Grenadille.	Cl. XV, ordre 2. Cucurbitacées.	III. 667
4.			
Hexandria.			
Aristolochia.	Aristoloche.	Cl. V, ordre 1. Aristoloches.	I. 564
5.			
Decandria.			
Helicteres.	Hélictère.	Cl. XIII, ordre 14. Malvacées.	III. 81
6.			
Dodecandria.			
Cytinus.	Hypociste.	Cl. V, ordre 1. Aristoloches.	I. 569
7.			
Polyandria.			
Grewia.	Grewier.	Cl. XIII, ordre 19. Tiliacées.	III. 115
Arum.	Gouet.	Cl. II, ordre 1. Aroïdes.	I. 326

*

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Dracontium	Draconte.	idem.	I. 332
	Pothos.	idem.	I. 333
Calla.	Calle.	idem.	I. 332
Pothos.	Pothos.	idem.	I. 333
Zostera.	Zostère.	idem.	I. 327

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

1.

Monandria.

Zannichellia.	Zannichelle.	Cl. I, ordre 6. Naïades.	I. 325
Artocarpus.	Jaquier.	Cl. XV, ordre 3. Orties.	III. 682
Chara.	Charagne.	Cl. I, ordre 6. Naïades.	I 319
Casuarina.	Filao.	Cl. XV, ordre 5. Conifères.	III. 748

2

Diandria.

Lemna.	Lenticule.	Cl. I, ordre 6. Naïades.	I. 324

3.

Triandria.

Typha.	Massette.	Cl. II, ordre 2. Massettes.	I. 335
Sparganium.	Rubanier.	idem.	I. 336
Zea.	Maïs.	Cl. II, ordre 4. Graminées.	I. 395
Tripsacum.	Tripsaque.	idem.	I. 364
Coix.	Larmille.	idem.	I. 398
Olyra.	Olyra.	idem.	I. 397
Carex.	Laiche.	Cl. II, ordre 3. Souchets.	I. 337
Axyris.	Axyris.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 632
Omphalea.	Omphale.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 652

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Tragia.	Tragia.	idem.	III. 648
Hernandia.	Hernandier.	Cl. VI, ordre 4. Lauriers.	I. 599
Phyllanthus.	Niruri.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 634
4.			
Tetrandria.			
Aucuba.	Aucuba.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 618
Littorella.	Littorelle.	Cl. VII, ordre 2. Plantains.	I. 652
Betula.	Bouleau. Aune.	Cl. XV, ordre 14. Amentacées.	III. 718
Buxus.	Buis.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 639
Urtica.	Ortie.	Cl. XV, ordre 3. Orties.	III. 687
Morus.	Murier. Broussonnet. *Broussonnetia.* L'Hérit.	idem.	III. 684
		idem.	III. 686
5.			
Pentandria.			
Xanthium.	Lampourde.	Cl. X, ordre 3. Corymbifères.	II. 526
Ambrosia.	Ambroisie.	idem.	II. 525
Parthenium.	Parthénie.	idem.	II. 524
Iva.	Iva.	idem.	II. 523
Amaranthus.	Amaranthe.	Cl. VII, ordre 1. Amaranthes.	I. 657
Lœa.	Aquilicie. *Aquilicia.* Juss.	Cl. XIII, ordre 11. Azédarachs.	II. 816
6.			
Heptandria.			
Guettarda.	Guettard.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 566
7.			
Polyandria.			
Ceratophyllum.	Cornifle.	Cl. I, ordre 6. Naïades.	I. 320

Système de Linné.	Méthode de Jussieu.		T. pag.
Myriophyllum.	Volant d'eau.	idem.	I. 328
Sagittaria.	Fléchière.	Cl. III, ordre 3. Joncs.	I. 438
Begonia.	Bégone.	Place incertaine.	IV. 11
Theligonum.	Téligone.	Cl. XV, ordre 3. Orties.	III. 694
Poterium.	Pimprenelle.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 356
Quercus.	Chêne.	Cl. XV, ordre 4. Amentacées.	III. 729
Juglans.	Noyer.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 586
Fagus.	Hêtre.	Cl. XV, ordre 4. Amentacées.	III. 724
	Chataignier.	idem.	III. 726
Carpinus.	Charme.	idem.	III. 722
Corylus.	Coudrier.	idem.	III. 737
Platanus.	Platane.	idem.	III. 742
Liquidambar.	Liquidambar.	idem.	III. 739
	Comptone. *Comptonia.*		
	L'Héritier.	idem.	III. 740

8.

Monadelphia.

Pinus.	Pin.	Cl. XV, ordre 3. Conifères.	III. 758
	Sapin.	idem.	III. 773
	Mélèze.	idem.	III. 770
Thuya.	Thuya.	idem.	III. 756
Cupressus.	Cyprès.	idem.	III. 752
Dalechampia.	Daléchampe.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 652
Acalypha.	Acalypha.	idem.	III. 647
Croton.	Croton.	idem.	III. 646
	Alévrit. *Alevrites.* Juss.	idem.	III. 645
	Sapi. *Sapium.* Juss.	idem.	III. 651
Cupania.	Cupane.	Cl. XIII, ordre 5. Savoniers.	II. 330
Jatropha.	Médicinier.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 643
Ricinus.	Ricin.	idem.	III. 644

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
Sterculia.	Stercalier.	Cl. XIII, ordre 14. Malvacées.	III. 82
Hyppomane.	Mancenillier.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 649
Stillingia.	Stillingia.	idem.	III. 649
Hura.	Sablier.	idem.	III. 650
9.			
Syngenesia.			
Trichosantes.	Anguine.	Cl. XV, ordre 2. Cucurbitacées.	III. 666
Momordica.	Momordique.	idem.	III. 658
Cucurbita.	Courge.	idem.	III. 664
Cucumis.	Concombre. Melon.	idem.	III. 659
Bryonia.	Bryone.	idem.	III. 655
Sicyos.	Sicyos.	idem.	III. 655
10.			
Gynandria.			
Andrachne.	Andrachne.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 639
CLASSIS XXII.			
Dioecia.			
1.			
Monandria.			
Pandanus.	Baquois.	Place incertaine.	IV. 15
Najas.	Naïade.	Cl. I, ordre 6. Naïades.	I. 320
2.			
Diandria.			
Cecropia.	Cenlequin.	Cl. XV, ordre 3. Orties.	III. 681

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Salix.	Saule.	Cl. XV, ordre 4. Amentacées.	III. 705
3.			
TRIANDRIA.			
Empetrum.	Camarine.	Cl. IX, ordre 3. Bruyères.	II. 299
Osyris.	Rouvet.	Cl. VI, ordre 1. Chalefs.	I. 571
4.			
Tetrandria.			
Viscum.	Gui.	Cl. XI, ordre 3. Chèvre-feuilles.	II. 578
Montinia.	Montin.	Cl. XIV, ordre 6. Onagres.	III. 271
Hippophae.	Argoussier.	Cl. VI, ordre 1. Chalefs.	I. 572
Myrica.	Galé.	Cl. XV, ordre 4. Amentacées.	III. 715
	Sumac.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 566
5.			
Pentandria.			
Pistacia.	Pistachier. *Terebinthus.* Juss.	idem.	III. 575
Zanthoxylum.	Clavalier.	idem.	III. 582
	Ginseng.	Cl. XII, ordre 1. Aralies.	II. 895
Iresine.	Irésine.	Cl. VII, ordre 1. Amaranthes.	I. 643
Spinacia.	Epinard.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 622
Cannabis.	Chanvre.	Cl. XV, ordre 5. Orties.	III. 693
Humulus.	Houblon.	idem.	III. 692
6.			
Hexandria.			
Tamus.	Tame.	Cl. III, ordre 2. Asperges.	I. 453

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Smilax.	Smilace.	idem.	I. 421
Rajania.	Rajane.	idem.	I. 426
Dioscorea.	Igname.	idem.	I. 428
7. Octandria.			
Populus.	Peuplier.	Cl. XV, ordre 4. Amentacées.	III. 711
Rhodiola.	Rhodiole.	Cl. XIV, ordre 1. Joubarbes.	III. 203
8. Enneandria.			
Mercurialis.	Mercuriale.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 621
Hydrocharis.	Morrène.	Cl. IV, ordre 4. Morrènes.	I. 559
9. Decandria.			
Carica.	Papayer.	Cl. XV, ordre 2. Cucurbitacées.	III. 672
Kiggelaria.	Kiggellaire.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 637
Schinus.	Schinus. Mollé.	Cl. XIV, ord. 12. Térébintacées.	III. 573
Coriaria.	Fustet.	Place incertaine.	IV. 13
10. Dodecandria.			
Euclea.	Euclée.	Place incertaine.	IV. 9
Datisca.	Cannabine.	Place incertaine.	IV. 16
Menispermum.	Ménisperme.	Cl. XIII, ordre 17. Ménispermes.	III. 99
11. Polyandria.			
Cliffortia.	Clifforte.	Cl. XIV, ordre 10. Rosacées.	III. 361

Système de Linné.	Méthode de Jussieu.		T. pag.
12.			
Monadelphia.			
Juniperus.	Genèvrier.	Cl. XV, ordre 5. Conifères	III. 749
Taxus.	If.	idem.	III. 747
Ephedra.	Ephedra.	idem.	III. 744
Cissampelos.	Pareire.	Cl. XIII, ord. 17. Ménispermes.	III. 98
Napæa.	Napée.	Cl. XIII, ordre 14. Malvacées.	III. 54
Adelia.	Adélie.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 641
13.			
Syngenesia.			
Ruscus.	Fragon.	Cl. III, ordre 2. Asperges.	I. 419
14.			
Gynandria.			
Clutia.	Clutelle.	Cl. XV, ordre 1. Euphorbes.	III. 638
CLASSIS XXIII.			
Polygamia.			
1.			
Monoecia.			
Andropogon.	Barbon.	Cl. II, ordre 4. Graminées.	I. 360
Musa.	Bananier.	Cl. IV, ordre 1. Bananiers.	I. 536
Veratrum.	Vératre.	Cl. III, ordre 3. Joncs.	I. 439
Ægilops.	OEgilope. / Rottboll.	Cl. II, ordre 4. Graminées. / idem.	I. 365 / I. 366
Holcus.	Houque.	idem.	I. 360
Conchrus.	Racle.	idem.	I. 365

Valantia.

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
Valantia.	Croisette.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 547
Parietaria.	Pariétaire.	Cl. XV, ordre 3. Orties.	III. 691
Atriplex.	Arroche.	Cl. VI, ordre 6. Arroches.	I. 630
Terminalia.	Badamier.	Cl. VI, ordre 1. Chalefs.	I. 576
Clusia.	Clusier.	Cl. XIII, ordre 9. Guttiers.	II. 795
Ophioxylum.	Serpentine.	Cl. VIII, ordre 14. Apocinées.	II. 229
Acer.	Erable.	Cl. XIII, ordre 6. Erables.	II. 776
Celtis.	Micocoulier.	Cl. XV, ordre 4. Amentacées.	III. 703
Gouania.	Gouane.	Cl. XIV, ordre 13. Nerpruns.	III. 617
Mimosa.	Acacie.	Cl. XIV, ord. 11. Légumineuses.	III. 412
2.			
Dioecia.			
Gleditsia.	Févier.	idem.	III. 423
Fraxinus.	Frêne.	Cl. VIII, ordre 4. Jasminées.	I. 710
Diospyros.	Plaqueminier. *Guaiacana.* Juss.	Cl. IX, ordre 1. Plaqueminiers.	II. 242
Nyssa.	Tupelo.	Cl. VI, ordre 1. Chalefs.	I. 574
Anthospermum.	Anthosperme.	Cl. XI, ordre 2. Rubiacées.	II. 550
Arctopus.	Arctope.	Cl. XII, ordre 2. Ombellifères.	II. 648
Pisonia.	Pisone.	Cl. VII, ordre 3. Nictages.	I. 656
Panax.	Ginseng.	Cl. XII, ordre 1. Aralies.	II. 594
3.			
Trioecia.			
Ceratonia.	Caroubier.	Cl. XIV, ord. 11. Légumineuses.	III. 426
Ficus.	Figuier.	Cl. XV, ordre 3. Orties.	III. 674

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
CLASSIS XXIV.			
CRYPTOGAMIA.			
1.			
Filices.			
Equisetum.	Prêle.	Cl. I, ordre 5. Fougères.	I. 317
Cycas.	Cycas.	idem.	I. 315
Onoclea.	Onoclée.	idem.	I. 302
Ophioglossum.	Ophioglosse.	idem.	I. 302
Osmunda.	Osmonde.	idem.	I. 302
Acrostichum.	Acrostique.	idem.	I. 303
Zamia.	Zamie.	idem.	I. 314
Pteris.	Fougère.	idem.	I. 311
Blechnum.	Blègne.	idem.	I. 310
Hemionitis.	Hémionite.	idem.	I. 310
Asplenium.	Doradille.	idem.	I. 308
Polypodium.	Polypode.	idem.	I. 304
Adiantum.	Capillaire.	idem.	I. 312
Trichomanes.	Trichomanes.	idem.	I. 313
Marsilæa.	Marsile. Lemna.	idem.	I. 316
Pilularia.	Pilulaire.	idem.	I. 316
Isoetes.	Isoète.	idem.	I. 317
2.			
Musci.			
Lycopodium.	Lycopode.	Cl. I, ordre 4. Mousses.	I. 300
Sphagnum.	Sphaigne.	idem.	I. 300
Phascum.	Phasque.	idem.	I. 300
Fontinalis.	Fontinale.	idem.	I. 299
Splachnum.	Splanc.	idem.	I. 297
Polytrichum.	Polytric.	idem.	I. 298
Mnium.	Mnie.	idem.	I. 298
Bryum.	Bry.	idem.	I. 299
Hypnum.	Hypne.	idem.	I. 298

SYSTÈME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		T. pag.
3.			
Algæ.			
Marchantia.	Hépatique.	Cl. I, ordre 3. Hépatiques.	I. 296
Jungermannia.	Jongermane.	idem.	I. 295
Riccia.	Riccie.	idem.	I. 296
Lichen.	Lichen.	Cl. I, ordre 2. Algues.	I. 292
Tremella.	Trémelle.	idem.	I. 290
Fucus.	Varec.	idem.	I. 291
Ulva.	Ulve.	idem.	I. 291
Conferva.	Conferve.	idem.	I. 292
Byssus.	Byssе.	idem.	I. 289
4.			
Fungi.			
Agaricus.	Mérule.	Cl. I, ordre 1. Champignons.	I. 288
	Agaric.	idem.	I. 287
	Amanite.	idem.	I. 285
	Chanterelle.	idem.	I. 285
Boletus.	Agaric.	idem.	I. 287
Hydnum.	Erinace.	idem.	I. 287
Phallus.	Satyre.	idem.	I. 284
	Morille. *Boletus.* Juss.	idem.	I. 285
Clathrus.	Clathre.	idem.	I. 284
Peziza.	Pézize.	idem.	I. 285
	Cyathe. *Cyathus.* Juss.	Cl. I, ordre 2. Algues.	I. 291
Clavaria.	Clavaire.	Cl. I, ordre 1. Champignons.	I. 289
Lycoperdon.	Vesse de loup.	idem.	I. 283
	Truffe.	idem.	I. 284
Mucor.	Moisissure.	idem.	I. 283

SYSTÊME DE LINNÉ.	MÉTHODE DE JUSSIEU.		
			T. pag.
APPENDIX.			
PALMÆ.			
Chamærops.	Camérope.	Cl. III, ordre 1. Palmiers.	I. 406
Borassus.	Rondier. *Lontarus.* Juss.	idem.	I. 405
Corypha.	Coryphe.	idem.	I. 404
Cocos.	Cocotier.	idem.	I. 403
Phœnix.	Dattier.	idem.	I. 401
Elais.	Avoira.	idem.	IV. 33
Areca.	Arec.	idem.	I. 402
Elate.	Indel.	idem.	I. 402
Ginkgo.	Gingo.	Appendice.	IV. 17

Fin du Tableau comparatif de Linné et de Jussieu.

TABLE

DES ARTICLES PRÉLIMINAIRES.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. Page 7
Trois parties principales de botanique. 19
Etude des plantes. 20
Culture des plantes. 22
Propriétés des végétaux. 23
Agrémens de la botanique. 26
Avantages de la méthode de Jussieu. 28
Plan de l'ouvrage. 31
CONNOISSANCES GÉNÉRALES DE CULTURE. 37
Variations de la température sous un même climat. 39
Etude du sol et moyens de le corriger. 44
Choix des situations. 49
Des abris. 52
Moyens de suppléer aux eaux de source. 55
DES JARDINS. 56
DU POTAGER ET DU FRUITIER. 57
Disposition des murs pour les arbres palissés. *id.*
Haies de défense. 61
Le fumier préférable aux terreaux pour plusieurs légumes. 62
Couches pour les potagers. 64
Choix des expositions et des terreins suivant la nature des arbres fruitiers. 66
Préférer les arbres fruitiers du pays. 69
DU JARDIN D'ORNEMENT ET DE PLANTES ÉTRANGÈRES. 72
Disposition du terrein pour les plantes étrangères. 77
DES TERRES. 82

DES PLANTATIONS EN PLEINE TERRE. Pag. 83
Attentions que demandent les plantations. *id.*
Tems favorable pour planter les arbres. 86
Précautions à prendre en plantant. 87
DES COUVERTURES ET EMPAILLEMENS. 91
DE LA MULTIPLICATION DES PLANTES. 94
DES SEMIS. 96
Vérification des semences. 97
DES SEMIS SANS CHALEUR ARTIFICIELLE. 99
Semis en place. *id.*
Semis en planche. 100
Semis en terrine. 102
DES SEMIS SUR COUCHE OU AVEC UNE CHALEUR ARTIFICIELLE. 103
Manière de faire les couches. *id.*
Semis dans les terrines. 105
DE LA CONDUITE DES JEUNES PLANTES DE SERRE. 106
Précautions pour ces jeunes plantes. *id.*
Paillassons. *id.*
Transplantations. 107
Tems des semis. 109
DES MARCOTTES. 111
DES BOUTURES. 114
Plantes qui reprennent plus ou moins facilement de bouture. *id.*
Tems des boutures. 115
Choix des boutures. 118
Boutures des plantes exotiques. 119
DES GREFFES. 124
Greffe en écusson. 125
Greffe à emporte pièce. 126
Greffe en flûte. *id.*
Greffe en fente. *id. et supplément.*
Greffe en couronne. 127
Greffe en approche. *id.*
DES SERRES. 129
DE LA SERRE FROIDE OU ORANGERIE. 133
Choix des thermomètres. 135
Soins que demandent les plantes. 136
Tems de la sortie des plantes et de leur rentrée. 137

DE LA SERRE TEMPÉRÉE ET DE LA SERRE CHAUDE. Pag. 141
Constructions des serres chaudes. 142
Plantes qui doivent entrer dans la serre chaude. 149
Température de la serre chaude. 150
Serre tempérée. 151
Rentrée et sortie des plantes. 152
DES CHASSIS. 153
Utilité des chassis. 154
DU REMPOTEMENT ET DU RENCAISSEMENT. 155
Insectes qui attaquent les plantes de serre. 162
LISTE des plantes qui peuvent composer les trois bosquets de l'année. 164
PLANTES EN USAGE POUR LA MÉDECINE. 168
PLANTES PURGATIVES. 169
Les purgatives douces.
purgatives foibles.
purgatives fortes.
PLANTES BECHIQUES ET EXPECTORANTES. 172
Les béchiques incisives.
béchiques incrassantes.
PLANTES EMÉTIQUES. 174
PLANTES STIMULANTES. 175
Les céphaliques.
cordiales.
emménagogues.
antispasmodiques.
carminatives.
sudorifiques.
PLANTES STIMULANTES convenables à ces six classes. 177
Les antiscorbutiques. 180
sternutatoires. 181
vessicatoires. *id.*
PLANTES TONIQUES ET AMÈRES. 182
Les fébrifuges. *id.*
stomachiques chauds. 183
vermifuges. 184
PLANTES ASTRINGENTES. 184
PLANTES RAFRAICHISSANTES. 185

PLANTES ANTISEPTIQUES. Pag. 186
PLANTES EMOLLIENTES. id.
PLANTES DIURÉTIQUES ET APÉRITIVES. id.
Les diurétiques froides. 187
diurétiques chaudes. id.
PLANTES MATURATIVES. 188
PLANTES RÉSOLUTIVES. 189
PLANTES DETERSIVES. id.
PLANTES NARCOTIQUES. 190
PLANTES VENENEUSES. 191
AUTRES SUBSTANCES. 193
PLANTES EMPLOYÉES DANS LES ARTS. 194
Pour la teinture et la peinture id.
en bleu.
en jaune.
en vert.
en rouge.
en noir.
Pour les filatures et corderies. 195
Pour les papeteries. 196
BOIS DE CHARPENTE. 197
BOIS DE CHARRONAGE. 198
BOIS DE MENUISERIE ET D'ÉBENISTERIE. id.
SEMENCES dont on extrait de l'huile par expression. id.
HUILES essentielles extraites par distillation. 200
AUTRES PROPRIÉTÉS de quelques plantes. 201
DÉFINITIONS DES TERMES DE BOTANIQUE. 203
IDÉE DE LA MÉTHODE DE JUSSIEU. 249
USAGE DE LA MÉTHODE DE JUSSIEU. 266
EXPLICATION DU TABLEAU. 271
ABREVIATIONS ET SIGNES ABREVIATIFS. 276
RAPPORT APPROXIMATIF DES MESURES. 279
Rapport des mois anciens aux nouveaux. 280

Fin de la table des articles préliminaires.

TABLE

DES NOMS FRANCAIS

DES GENRES.

A.

	T. pag.		T. pag.
Abricotier.	III. 397	Agnanthe.	I. 731
Abrus.	III. 507	Agrostis.	I. 356
Acacie.	III. 412	Agripaume.	II. 57
Acajou.	III. 564	Agryphylle.	II. 518
Acalypha.	III. 647	Ahouai.	II. 230
Acanthe.	I. 701	Aigremoine.	III. 360
ACANTHES.	I. 700	Ajone.	III. 450
Achillée.	II. 492	Aïl.	I. 482
Achit.	II. 819	Airelle.	II. 295
Acomat.	III. 410	Aitone.	II. 812
Aconit.	II. 685	Albuca.	I. 476
Acore.	I. 334	Alcée.	III. 50
ACOTYLÉDONES.	I. 281	Alchimille.	III. 363
Acrostique.	I. 303	Alétris.	I. 459
Actée.	II. 691	Alévrit.	III. 645
Adélie.	III. 641	ALGUES.	I. 289
Adonide.	II. 667	Alibouſier.	II. 245
AEgiphile.	I. 729	Alisier.	III. 331
AEthuse.	II. 611	Allamanda.	II. 227
Agaric.	I. 287	Alpinie.	I. 544
Agati.	III. 558	Aloës.	I. 461
Agavé.	I. 457	Alsine.	III. 155
Agerate.	II. 400	Alstrœmère.	I. 511

	T. pag.		T. pag.
Alysse.	II. 736	Antholize.	I. 532
Amandier.	III. 399	Anthosperme.	II. 550
Amaranthe.	I. 637	Anthyllide.	III. 474
AMARANTHES.	I. 637	Apalachine.	III. 601
Amaranthine.	I. 645	Apeiba.	III. 113
Ambroisie.	II. 525	Apocin.	II. 219
Ambrome.	III. 77	APOCINÉES.	II. 206
Amelle.	II. 522	Aponogeton.	I. 321
AMENTACÉES.	III. 698	Aquilicie.	II. 816
Amanite.	I. 285	Arabette.	II. 715
Amaryllis.	I. 497 et IV. 35	Arachide.	III. 473
Améthyste.	II. 6	Aralie.	II. 594
Ammane.	III. 308	ARALIES.	II. 593
Ammi.	II. 635	Arbousier.	II. 288
Amome.	I. 542	Arctope.	II. 648
Amorpha.	III. 508	Arctotide.	II. 519
Anacycle.	II. 488	Ardisia.	IV. 19
Anagyre.	III. 445	Arec.	I. 402
ANANAS.	I. 452	Aréthuse.	I. 556
Ananas.	I. 454	Arétie.	I. 669
Anavinga.	IV. 14	Argalou.	III. 609
Ancistre.	III. 359	Argan.	II. 234
Ancolie.	II. 681	Argemone.	II. 694
Andrachné.	III. 639	Argoussier.	I. 572
Andromède.	II. 284	Arguse.	II. 150
Androsace.	I. 670	Aristoloche.	I. 564
Andryale.	II. 349	ARISTOLOCHES.	I. 564
Anémone.	II. 663	Armarinthe.	II. 629
Anet.	II. 601	Armoise.	II. 477
Angelin.	III. 561	Armoselle.	II. 411
Angélique.	II. 620	Arnique.	II. 456
Angrec.	I. 557	AROÏDES.	I. 327
Anguine.	III. 666	Arroche.	I. 630
Anoda.	III. 59	ARROCHES.	I. 614
ANONES.	III. 93	Artédie.	II. 642
Anone.	III. 94	Artichaut.	II. 361
Anserine.	I. 626	Asaret.	I. 568
Anthéric.	I. 465	Asclépiade.	II. 222

	T. pag.
Ascyre.	II. 787
Aspalat.	III. 451
Asperge.	I. 411
Asperges.	I. 407
Aspérule.	II. 541
Asphodèle.	I. 468
Asphodèles.	I. 458
Astère.	II. 422 et IV. 53
Astragale.	III. 515
Astrance.	II. 646
Athamante.	II. 631
Athanasie.	II. 484
Atractyle.	II. 355
Atragène.	II. 659
Atraphace.	I. 602
Aucuba.	III. 618
Aune.. *Voyez* Bouleau.	
Avoine.	I. 388
Avoira.	IV. 33
Auriculaire.	I. 288
Axyris.	I. 632
Ayène.	III. 80
Aylanthe.	III. 579
Azalée.	II. 256
Azédarach.	II. 814
Azédarachs.	II. 811
Azier.	II. 567
Azyme.	IV. 7

B.

	T. pag.
Bacchante.	II. 415 et IV. 52
Bacille.	II. 631
Badamier.	I. 576
Badiane.	III. 85
Baguenaudier.	III. 522
Balisier.	I. 540
Balisiers.	I. 540
Ballote.	II. 54
Balsamine.	III. 34
Balsamier.	III. 573
Baltimore.	II. 503
Bananier.	I. 536
Bananiers.	I. 536
Banistère.	II. 782
Banksie.	I. 692
Baobab.	III. 74
Baquois.	IV. 15
Barbon.	I. 362
Barbouquine.	II. 346
Bardane.	II. 371
Barrelière.	I. 702 et IV. 40
Bartsie.	I. 695
Baselle.	I. 619
Basilée.	I. 469
Basilic.	II. 75
Bauhine.	III. 442
Béfar.	II. 261
Régone.	IV. 11
Béjuco.	II. 780
Belladone.	II. 119
Bellium.	II. 455
Ben.	III. 436
Benoite.	III. 374
Berce.	II. 625
Berle.	II. 618
Bermudienne.	I. 514 et IV. 56
Beslère.	IV. 47
Bessi.	IV. 22
Bétoine.	II. 48
Bette.	I. 624
Bicorne.	II. 195
Bident.	II. 506
Bignone.	II. 193

	T. pag.
BIGNONES.	II. 186
Bihai.	I. 539
Blairie.	II. 263
Blakée.	III. 299 et IV. 61
Blègne.	I. 310
Blète.	I. 633
Bleuet.	II. 378
Boccone.	II. 699
Boerhave.	I. 655
Bonduc.	III. 440
Borbone.	III. 452
BORRAGINÉES.	II. 144
Bosé.	I. 617
Boucage.	II. 598
Bouleau.	III. 718
Boulette.	II. 387
Bourrache.	II. 166
Bragalou.	I. 427
Brésillet.	III. 439
Brize.	I. 387
Brome.	I. 381
Broualle.	II. 104
Broussonnet.	III. 686
Brucé.	III. 580
Brunelle.	II. 78
Brunie.	III. 615
Brunsfel.	II. 141
Bruyère.	II. 264 et IV. 50
BRUYÈRES.	II. 262
Bry.	I. 299
Bryone.	III. 655
Bubon.	II. 615
Budlèje.	II. 83
Bufone.	III. 154
Bugle.	II. 21
Buglose.	II. 164
Bugrane.	III. 469
Bulbocode.	I. 491
Bunias.	II. 751
Buis.	III. 639
Buphtalme.	II. 498
Buplèvre.	II. 642
Butome.	I. 433
Butonic.	III. 297
Buttnère.	III. 79
Bysse.	I. 289

C.

	T. pag.
Cabaret.	I. 568
Cabrillet.	II. 146
Cacalie.	II. 392
Cacaoyer.	III. 75
Cactier.	III. 229
CACTIERS.	III. 224
Cadélari.	I. 644
Cadie.	IV. 26
Cafféyer.	II. 563
Caillelait.	II. 543
Caimitier.	II. 236
Calabure.	III. 114
Calac.	II. 231
Calcéolaire.	II. 100
Calea.	II. 484
Calebassier.	II. 142
Calle.	I. 332
Callicarpe.	I. 731
Calligon.	I. 613
Callise.	I. 429
Callitric.	I. 323
Calycante.	III. 408
Camara.	I. 735
Camarine.	II. 299
Camécerisier.	II 574.

	T. pag.		T. pag.
Camelée.	III. 571	Catesbée.	II. 553
Caméline.	II. 750	Caucalide.	II. 639
Camelli.	II. 809	Céanothe.	III. 610
Camérier.	II. 211	Cédrel.	II. 817
Camérope.	I. 406	Célastre.	III. 593
Camomille.	II. 489	Celsie.	II. 106
Campanule.	II. 301	Cenie.	II. 471
CAMPANULACÉES.	II. 300	Centaurea.	II. 381
Campêche.	III. 437	Centaurée.	II. 372
Canarine.	II. 300	Centenille.	I. 665
Canche.	I. 366	Céphalanthe.	II. 569
Cannabine.	IV. 16	Céraiste.	III. 158
Canti.	II. 565	Cercodée.	III. 270
Cantu.	II. 185	Cerfeuil.	II. 606
Capillaire.	I. 312	Cerisier.	III. 385
Capraire.	II. 85	Céropège.	II. 215
Caprier.	II. 759	Cestreau.	II. 139 et IV. 49
CAPRIERS.	II. 756	Chalef.	I. 573
Capucine.	III. 32	CHALEFS.	I. 570
Caquilier.	II. 751	Champac.	III. 87
Caragan.	III. 512	CHAMPIGNONS.	I. 282
Caragate.	I. 452	Chanterelle.	I. 285
Carambolier.	III. 585	Chanvre.	III. 693
Cardamine.	II. 729	Charagne.	I. 319
Cardère.	II. 529	Chardon.	II. 365
Caret.	I. 337	Charme.	III. 722
Carline.	II. 359	Chataire.	II. 33
Carmantine.	I. 703 et IV. 40	Chataignier.	III. 726
Carotte.	II. 636	Chaussetrape.	II. 373
Caroubier.	III. 426	Chélidoine.	II. 699
Carpésie.	II. 474	Chêne.	III. 729
Carthame.	II. 356	Chenille.	III. 548
Carvi.	II. 599	Cherlerie.	III. 160
CARYOPHYLLÉES.	III. 151	Chèvre-feuille.	II. 576
Casse.	III. 430	CHÈVRE-FEUILLES.	II. 571
Cassine.	III. 596	CHICORACÉES.	II. 320
Catalpa.	II. 189	Chicorée.	II. 351

	T. pag.		T. pag.
Chicot.	III. 424	Coignassier.	III. 326
Chionanthe.	I. 714	Colchique.	I. 439
Chirone.	II. 203	Coldène.	II. 152
Chlore.	II. 202	Collinsone.	II. 20
Choin.	I. 342	Colomnée.	II. 101
Chou.	II. 709	Comaret.	III. 373
Chrysanthême.	II. 464	Comméline.	I. 430 et IV. 34
Chrystophoriane.	II. 691	Comoclade.	III. 572
Ciche.	III. 547	Comptone.	III. 740
Cicutaire.	II. 612	Concombre.	III. 659
Cierge.	III. 229	Condrille.	II. 323
Cigue.	II. 633	Conferve.	I. 290
Cimicaire.	II. 690	CONIFÈRES.	III. 743
Cinéraire.	II. 448	Conocarpe.	I. 575
Cinna.	I. 349	Consoude.	II. 161
Ciocoque.	II. 563	Conyze.	II. 412
Circée.	III. 272	Copahu.	III. 562
Cirier.	III. 715	Coquelourde.	III. 182
Ciste.	III. 122	Coqueluchiole.	I. 397
CISTES.	III. 121	Coqueret.	II. 121
Citronier.	II. 799	Corète.	III. 119
Clandestine.	I. 699	Coriandre.	II. 610
Clathre.	I. 284	Corinde.	II. 766
Clavaire.	I. 289	Coriope.	II. 508
Clavalier.	III. 582	Coris.	I. 668
Claytone.	III. 246	Corisperme.	I. 635
Clématite.	II. 656	Cornaret.	II. 195
Cléthra.	II. 290	Corniffle.	I. 320
Clifforte.	III. 361	Cornouiller.	II. 588
Clinopode.	II. 63	Coronille.	III. 550
Clitore.	III. 503	Corossol.	III. 94
Clusier.	II. 795	Corrigiole.	III. 243
Clutelle.	III. 638	Cortuse.	I. 674
Clypéole.	II. 735	CORYMBIFÈRES.	II. 391
Cochléaria.	II. 740	Corymbiole.	II. 389
Cocotier.	I. 403	Corypha.	I. 494
Cocrête.	I. 697	Costus.	I. 543

	T. pag.
Cotelet.	I. 733 et IV. 43
Cotonier.	III. 68
Cotule.	II. 472
Cotylet.	III. 200
Coudrier.	III. 737
Coulequin.	III. 681
Courbaril.	III. 441
Courge.	III. 664
Coutarée.	II. 560
Crambé.	II. 752
Cranson.	II. 740
Crapaudine.	II. 39
Crassule.	III. 192
Crépide.	II. 336
Cresson.	II. 729
Cretelle.	I. 369
Crinole.	I. 492
Crocodilium.	II. 372
Croisette.	II. 547
Crotalaire.	III. 464
Croton.	III. 646
Crucianelle.	II. 546
CRUCIFÈRES.	II. 705
Crysocome.	II. 418
Cucubale.	III. 178
CUCURBITACÉES.	III. 653
Cumin.	II. 614
Cunile.	II. 7
Cunone.	III. 223
Cupane.	II. 772
Cuphée.	III. 307
Cupidone.	II. 350
Curcuma.	I. 545
Curtisia.	IV. 18
Cururu.	II. 767
Cyanelle.	I. 475
Cyathe.	I. 291
Cycas.	I. 315 et IV. 31
Cyclame.	I. 676
Cylista.	IV. 20
Cynanque.	II. 220
CYNAROCÉPHALES.	II. 354
Cynoglosse.	II. 167
Cynosure.	I. 369
Cyprès.	III. 753
Cyrille.	II. 263
Cytise.	III. 459

D.

	T. pag.
Dactyle.	I. 368
Daïs.	I. 584
Dalberg.	III. 560
Daléchampe.	III. 662
Dalée.	III. 479
Danaïde.	II. 565
Daphnot.	II. 141
Dattier.	I. 401
Dauphinelle.	II. 683
Décumaire.	III. 293
Dentaire.	II. 731
Dent de chien.	I. 443
Dentelaire.	I. 657
DENTELAIRES.	I. 657
Dianelle.	I. 410
DICOTYLÉDONES.	I. 562
APÉTALES. *Etam. épigyn.*	I. 564
——— *Etam. hypog.*	I. 636
——— *Etam. périg.*	I. 569
MONOPÉT. *Etam. épig.*	II. 319
——— *Etam. hypog.*	I. 663
——— *Etam. périg.*	II. 241
POLYPÉT. *Etam. épig.*	II. 592
——— *Etam. hypog.*	II. 654

	T. pag.
POLYPÉT. *Etam. périg.*	III. 190
——— *Etam. idiog.*	III. 619
Didelta.	II. 453
Dierville.	II. 574
Digitale.	II. 98
Dionée.	IV. 8
Diosma.	III. 147
DIPSACÉES.	II. 529
Dirca.	I. 578
Disandre.	I. 693
Dodart.	II. 90
Dodonée.	III. 584
Dolic.	III. 495
Dombey.	III. 78
Doradille.	I. 308
Dorine,	III. 221
Doronic.	II. 455
Dracocéphale.	II. 71
Draconte.	I. 332
Dragonier.	I. 408
Drave.	II. 739
Drépanie.	II. 338
Driade.	III. 375
Drimis.	III. 85
Drypis.	III 184
Durante.	I. 734

E.

Echinophore.	II. 648
Echite.	II. 214
Eclipte.	II. 504
Egilops.	I. 365
Elatine.	III. 157
Eléphantope.	II. 400
Elléborine.	I. 553
Ellise.	II. 150
Elyme.	I. 372
Emplèvre.	III. 151
Encelie.	II. 500
Epervière.	II. 331
Ephedra.	III. 744
Ephémérine.	I. 431
Epi d'eau.	I. 321
Epigée.	II. 293
Epilobe.	III. 277
Epimède.	III. 103
Epinard.	I. 622
Epine de Christ.	III. 609
Erable.	II. 776
ERABLES.	II. 773
Eranthême.	I. 741
Erinace.	I. 287
Erine.	I. 693
Eriocéphale.	II. 497
Ers.	III. 545
Erythrine.	III. 502
Ethulie.	II. 474
Eucalyptus.	III. 297
Euclée.	IV. 9
Eucomis.	IV. 35
Eufraise.	I. 694
Eupatoire.	II. 395
Euphorbe.	III. 622
EUPHORBES.	III. 620

F.

Fabagelle.	III. 139
Fagarier.	III. 581
Fagone.	III. 138
Falkie.	II. 170
Fenugrec.	III. 490
Fer à cheval.	III. 549

	T. pag.
Ferrare.	I. 516
Férule.	II. 626
Fétuque.	I. 383
Fève.	III. 543
Févier.	III. 423
Ficaire.	II. 674
Ficoïde.	III. 251
FICOÏDES.	III. 247
Figuier.	III. 674
Filao.	III. 745
Filaria.	I. 719
Flagellaire.	I. 411
Flaverie.	IV. 54
Fléau.	I. 350
Fléchière.	I. 434
Flouve.	I. 349
Fluteau.	I. 433
Fontainèse.	IV. 23
Fontinale.	I. 299
Forskale.	III. 690
Fothergil.	III. 699
Fougère.	I. 311
FOUGÈRES.	I. 301
Fragon.	I. 419
Fraisier.	III. 369
Framboisier.	III. 376
Franchipanier.	II. 209
Franquenne.	III. 185
Fraxinelle.	III. 144
Frêne.	I. 710
Fritillaire.	I. 445
Fromager.	III. 73
Froment.	I. 376
Fuchsie.	III. 280
Fumeterre.	II. 701
Fusain.	III. 591
Fustet.	IV. 13

G.

	T. pag.
Gainier.	III. 443
Galanga.	I. 544
Galane.	II. 187
Galanthine.	I. 508
Galardienne.	II. 518
Galé.	III. 715
Galéga.	III. 527
Galéope.	II. 47
Galienne.	I. 619
Galiet.	II. 543
Gardène.	II. 557
Garance.	II. 548
Garidelle.	II. 680
Garou.	I. 578
Gatilier.	I. 729
GATILIERS.	I. 727
Gaultherie.	II. 294
Gaura.	III. 279
Gayac.	III. 141
Genet.	III. 454
Genèvrier.	III. 749
Genipayer.	II. 559
Gentiane.	II. 197
GENTIANES.	II. 197
Géranion.	III. 5 et IV. 58
GÉRAINES, GÉRANIONS.	III. 5
Gérarde.	II. 91
Germaine.	II. 74
Germandrée.	II. 22 et IV. 44
Géropogon.	II. 347
Gesse.	III. 531
Gesnère.	II. 310
Géthyllide.	I. 490
Gingo.	IV. 17
Ginseng.	II. 595

	T. pag.		T. pag.
Giroflée.	II. 722	Gundèle.	II. 390
Gisèque.	III. 247	Gunnère.	III. 695
Glaucième.	II. 698	Guttiers.	II. 794
Glaux.	III. 309	Gypsophile.	III. 164
Glayeul.	I. 529	Gyroselle.	I. 675
Glinole.	III. 250		
Globbée.	I. 542 et IV. 37	H.	
Globulaire.	I. 677		
Glouteron.	II. 371	Halesie.	II. 247
Gluttier.	III. 651	Haller.	II. 86
Glycine.	III. 504	Hamamelis.	III. 104
Gnaphale.	II. 403	Hamel.	II. 568
Gnavelle.	III. 244	Haricot.	III. 498
Gaidienne.	I. 585	Harmale.	III. 144
Gômart.	III. 577	Hasselquistia.	II. 641
Goodenie.	II. 317	Hébenstrète.	I. 742
Gordone.	III. 71	Hédypnoïde.	II. 339
Gortère.	II. 458	Hélénie.	II. 515
Gouane.	III. 617	Hélonias.	I. 436
Gouet.	I. 328 et IV. 32	Hélianthe.	II. 513 et IV. 55
Goyavier.	III. 286	Hélianthême.	III. 127
Graminées.	I. 347	Hélictère.	III. 81
Grangée.	II. 473	Héliocarpe.	III. 111
Grassète.	I. 681	Héliophile.	II. 721
Gratgal.	II. 554	Héliotrope.	II. 153
Gratiole.	II. 102	Hellébore.	II. 676
Grémil.	II. 157	Helmintie.	II. 343
Grenadier.	III. 293	Hémanthe.	I. 496
Grenadille.	III. 667	Hémérocalle.	I. 491
Greuvier.	III. 115	Hémionite.	I. 310
Grignon.	I. 575	Hémithome.	II. 107
Gronove.	III. 654	Hépatique.	I. 296
Groseiller.	III. 225	Hépatiques.	I. 295
Guettard.	II. 566	Hermane.	III. 107
Guazume.	III. 78	Hernandier.	I. 599
Gui.	II. 578	Herniaire.	I. 648
Guimauve.	III. 46	Hêtre.	III. 724

	T. pag.		T. pag.
Heuchère.	III. 214	Irésine.	I. 643
Hippie.	II. 475	Iris.	I. 517 et IV. 36
Hippocrèpe.	III. 549	Iris.	I. 513
Hirtelle.	III. 384	Isnarde.	III. 308
Holostée.	III. 153	Isopyre.	II. 678
Hopée.	II. 248	Isote.	I. 317
Hortense.	II. 584	Itée.	II. 261
Hottone.	I. 668	Iva.	II. 528
Houblon.	III. 692	Ixie.	I. 525
Houque.	I. 360	Ixore.	II. 561
Houstone.	II. 551		
Houx.	III. 597	J.	
Hydrangée.	III. 223		
Hydraste.	II. 662	Jacée.	II. 376
Hydrocotyle.	II. 652	Jacinthe.	I. 470
Hydrophylle.	II. 149	Jacquier.	III. 685
Hyoséride.	II. 340	Jacquinier.	II. 234
Hypécoon.	II. 700	Jambosier.	III. 295
Hypociste.	I. 569	Jasione.	II. 316
Hypoxis.	I. 508	Jasmin.	I. 722
Hypne.	I. 298	Jasminée.	II. 232
Hysope.	II. 31	Jasminées.	I. 708
		Jérose.	II. 748
I.		Jonc.	I. 427
		Joncs.	I. 426
Ibéride.	II. 742	Jongermanne.	I. 295
Icaquier.	III. 384	Joubarbe.	III. 209
If.	III. 747	Joubarbes.	III. 191
Igname.	I. 423	Jujubier.	III. 608
Ilicioïde.	IV. 27	Julienne.	II. 716
Illecebrum.	I. 646	Jusquiame.	II. 111
Immortelle.	II. 401	Jussie.	III. 273
Impératoire.	II. 608		
Impériale.	I. 446	K.	
Indel.	I. 402		
Indigotier.	III. 529	Kalmie.	II. 249
Inule.	II. 437	Kénige.	I. 613

	T. pag.
Ketmie.	III. 61
Kiggellaire.	III. 637
Killingie.	I. 347
Kirganelle.	III. 636
Knautie.	II. 536
Knépier.	II. 772

L.

	T. pag.
Labiées.	II. 5
Lachenale.	I. 473 et IV. 35
Lachnée.	I. 584
Lagerstrome.	III. 302
Lagocie.	II. 652
Lagurier.	I. 359
Laiche.	I. 337
Laitron.	II. 327
Laitue.	II. 324
Lamier.	II. 45
Lampourde.	II 526
Lampsane.	II. 321
Lanaire.	I. 474
Lanquette.	III. 249
Lapulier.	III. 112
Larmille.	I. 398
Laser.	II. 623
Lauréole.	I. 578
Lausone.	III. 304
Laurier.	I. 594
Lauriers.	I. 594
Laurose.	II. 211
Lavande.	II. 36
Lavanèze.	III. 527
Lavatère.	III. 48
Ledier ou lède.	II. 259
Lée.	II. 240
Léflinge.	III. 153
Légumineuses.	III. 411
Lenticule, lentille d'eau.	I. 324
Léontice.	III. 102
Leptosperme.	III. 284
Leysère.	II. 410
Lichen.	I. 292
Liciet.	II. 137
Lidbeckia.	II. 472
Lierre.	II. 591
Lightfootia.	II. 185
Lilas.	I. 708
Liméole.	III. 245
Limodore.	I. 554
Limonellier.	II. 806
Limoselle.	I. 669
Lin.	III. 186
Linaigrette.	I. 343
Linaire.	II. 91 et IV. 47
Linnée.	II. 572
Liondent.	II. 341
Liparie.	III. 453
Liquidambar.	III. 739
Lis.	I. 447
Lis.	I. 440
Liserolle.	II. 181
Liseron.	II. 171
Liserons.	II. 171
Litchi.	II. 771
Litsé.	IV. 22
Littorelle.	I. 652
Livèche.	II. 621
Lobélie.	II. 312
Lopézie.	IV. 20
Lotier.	III. 491
Lucuma.	II. 238
Luduige.	III. 272
Lunaire.	II. 733

	T. pag.
Lunetière.	II. 734
Lupin.	III. 467
Luzerne.	III. 486
Lychnide.	III. 180
Lycope.	II. 6
Lycopode.	I. 300
Lycopside.	II. 162
Lygiste.	IV. 28
Lysimachie.	I. 666
LYSIMACHIES.	I. 664

M.

Maceron.	II. 602
Macre.	I. 561
Magnolier.	III. 88
MAGNOLIERS.	III. 84
Maherne.	III. 109
Mahogon.	II. 816
Maïs.	I. 395
Malacodre.	III. 70
Malachre.	III. 52
Malope.	III. 39
Malpighie.	II. 783
MALPIGHIES.	II. 781
MALVACÉES.	III. 38
Mamei.	II. 796
Mancenilier.	III. 649
Mandragore.	II. 118
Manguier.	III. 565
Manulée.	I. 694
Maqui.	IV. 9
Marronier d'Inde.	II. 773
Marrube.	II. 55
Marsile.	I. 316
Massette.	I. 335
MASSETTES.	I. 335
Massone.	I. 475
Matricaire.	II. 469
Mauve.	III. 39
Mauvisque.	III. 67
Médéole.	I. 415
Médicinier.	III. 643
Mélaleuque.	III. 282
Mélampire.	I. 698
Mélampode.	II. 512
Mélanthe.	I. 436
MÉLASTOMES.	III. 298
Mélastome.	III. 299
Melèze.	III. 770
Mélianthe.	III. 146
Mélilot.	III. 485
Melinet.	II. 151
Mélique.	I. 367
Mélisse.	II. 69 et IV. 46
Mélissot.	II. 74
Mélochie.	III. 69
Mélodin.	II. 228
Mélothrie.	III. 657
Ményanthe.	I. 681
MÉNISPERMES.	III. 97
Ménisperme.	III. 99
Menthe.	II. 42
Mercuriale.	III. 621
Méringine.	III. 157
Mérule.	I. 288
Michauxie.	IV. 26
Micocoulier.	III. 703
Micrope.	II. 486
Millet.	I. 354
MILLEPERTUIS.	II. 786
Millepertuis.	II. 787
Millerie.	II. 501
Mimule.	II. 103 et IV. 47

	T. pag.
Minuart.	III. 154
Mitchelle.	II. 568
Mitelle.	III. 221
Mnie.	I. 298
Mogori.	I. 721
Moisissure.	I. 283
Molène.	II. 108
Mollavi.	IV. 21
Mollé.	III. 573
Mollugo.	III. 154
Molucelle.	II. 62
Momordique.	III. 658
Monarde.	II. 8
Monbin.	III. 578
Monsone.	III. 31
Montie.	III. 241
Montin.	III. 271
MONOCOTYLÉDONES.	I. 325
Etamines hypogynes.	I. 326
Etamines périgynes.	I. 399
Etamines épigynes.	I. 535
Morée.	I. 524 et IV. 36
Morelle.	II. 124 et IV. 48
Morgeline.	III. 155
Morille.	I. 285
Morrènes.	I. 559
Morrène.	I. 559
Moscatelline.	III. 222
Moureiller.	II. 783
Mouron.	I. 665
Mousses.	I. 297
Moutarde.	II. 707
Mozambé.	II. 756
Muflier.	II. 96
Muguet.	I. 416
Murier.	III. 684
Murrai.	II. 798
Myosure.	II. 675
Myrrhide.	II. 608
Myrsine.	II. 239
Myrthe.	III. 287
Myrthes.	III. 281

N.

	T. pag.
Naïades.	I. 318
Naïade.	I. 320
Napée.	III. 54
Narcisses.	I. 490
Narcisse.	I. 504
Narthec.	I. 435
Néflier.	III. 327
Nénuphar.	I. 560
Nerprun.	III. 603 et IV. 63
Nerpruns.	III. 589
Nictages.	I. 653
Nictage.	I. 653
Nielle.	II. 679
Nigrine.	IV. 6
Niruri.	III. 634
Nissole.	III. 561
Nitraire.	III. 248
Noisettier.	III. 737
Nolane.	II. 169
Nolia.	IV. 24
Noyer.	III. 586

O.

	T. pag.
Œil de bœuf.	II. 498
Œillet.	III. 167
Œnanthe.	II. 613
Œrve.	I. 643
Oldenlandia.	II. 553
Olivier.	I. 716

	T. pag.
Olyra.	I. 397
Ombellifères.	II. 597
Omphale.	III. 652
Onagre.	III. 274
Onagres.	III. 269
Onoclée.	I. 302
Onosme.	II. 160
Ophioglosse.	I. 302
Ophrys.	I. 551
Orangers.	II. 797
Oranger.	II. 799
Orchidées.	I. 546
Orge.	I. 373
Origan.	II. 64
Orme.	III. 700
Ornithogale.	I. 480
Ornithope.	III. 548
Orobanche.	I. 699
Orobe.	III. 539
Oronce.	I. 334
Orpin.	III. 203
Orquis.	I. 547
Ortège.	III. 152
Orties.	III. 673
Ortie.	III. 687
Osmonde.	I. 362
Ostéosperme.	II. 460
Othonne.	II. 451

P.

	T. pag.
Pachire.	III. 83
Paliure.	III. 609
Palmiers.	I. 400
Panais.	II. 603
Panarine.	I. 647
Pancrais.	I. 502
Panis.	I. 352 et IV. 33
Panicaut.	II. 649
Papavéracées.	II. 693
Papayer.	III. 672
Paquerette.	II. 470
Pareire.	III. 98
Pariétaire.	III. 691
Parisette.	I. 416
Parkinset.	III. 428
Parnassie.	II. 765
Paronique.	I. 647
Parthénie.	II. 524
Paspal.	I. 352
Passerage.	II. 746
Passevelours.	I. 641
Pastel.	II. 754
Passerine.	I. 581
Passiflore. *Voyez* Grenadille.	
Patagonula.	II. 144
Patience.	I. 606
Paturin.	I. 385
Paullinie.	II. 767
Pavonie.	III. 52
Pavot.	II. 695
Pédane.	II. 364
Pédalium.	II. 196
Pêcher.	III. 402
Pédiculaire.	I. 696
Pédiculaires.	I. 683
Pélécine.	III. 521
Peltaire. *V.* Clypéole.	
Pénée.	IV. 5
Pentapètes.	III. 75
Penthorum.	III. 213
Péplide.	III. 310
Péragut.	I. 727 et IV. 41
Pereneige.	I. 507

	T.	pag.		T.	pag.
Percepier.	III.	363	Pivoine.	II.	688
Perdicium.	II.	440	Planère.	IV.	25
Pérille.	II.	36	Plantain.	I.	650
Périploque.	II.	217	Plantain d'eau.	I.	434
Pervenche.	II.	207	PLANTAINS.	I.	649
Persil.	II.	600	Plaqueminier.	II.	242
Pesse.	I.	319	PLAQUEMINIERS.	II.	242
Petivier.	I.	617	Platane.	III.	742
Peucédan.	II.	628	Plinie.	III.	408
Peuplier.	III.	711	Plocama.	IV.	19
Pézize.	I.	285	Podagraire.	II.	597
Phaca.	III.	521	Podophylle.	II.	692
Phalangère.	I.	467	Poincillade.	III.	438
Phalaris.	I.	351	Poirier.	III.	318
Pharnace.	III.	156	Pois.	III.	536
Phasque.	I.	300	Poivre.	III.	695
Phellandri.	II.	612	Polémoine.	II.	184
Phlomide.	II.	58	POLÉMOINES.	II.	182
Phlox.	II.	182	Policnème.	I.	618
Phylique.	III.	612	Pollichia.	IV.	18
Phyllis.	II.	552	Polycarpe.	III.	153
Phytheume.	II.	311	Polygale.	I.	683
Phytolacca.	I.	614	Polymnie.	II.	502
Picride.	II.	342	POLYGONÉES.	I	600
Pied de veau.	I.	328	Polypode.	I.	304
Pigamon.	II.	660	Polytric.	I.	298
Pilulaire.	I.	316	Pommier.	III.	311
Piment.	II.	135	Pontédéria.	I.	509
Pimprenelle.	III.	356	Populage.	II.	687
Pin.	III.	758	Porcelle.	II.	348
Piscidie.	III.	509	Portésie.	II.	812
Pisone.	I.	656	Portlande.	II.	559
Pissenlit.	II.	341	PORTULACÉES.	III.	238
Pistachier.	III.	575	Potentille.	III.	365
Pitcairne.	I.	453	Pothos.	I.	333
Pittone.	II.	148	Pourpier.	III.	239
Pittosporum.	IV.	24	Prasi.	II.	81

	T. pag.
Prêle.	I. 317
Prenanthe.	II. 322
Primevère.	I. 671
Protée.	I. 587
PROTÉES.	I. 586
Prunier.	III. 392
Psoralée.	III. 477
Ptéléa.	III. 583
Pteranthus.	III. 692
Ptérocarpe.	III. 561
Ptéronia.	II. 386
Pulicaire.	I. 649
Pulmonaire.	II. 159
Pyrole.	II. 292

Q.

Quamoclit.	II. 179
Quenouille.	II. 356
Quetmie. *V.* Ketmie.	
Quinquina.	II. 555

R.

Racle.	I. 365
Ragadiole.	II. 321
Rajane.	I. 426
Raifort.	II. 706
Raisinier.	I. 600
Ramontchi.	III. 114
Rapette.	II. 167
Rauvolfe.	II. 228
Réglisse.	III. 525
Renoncule.	II. 668
RENONCULACÉES.	II. 655
Renouée.	I. 602
Réséda.	II. 762
Rhaponticum.	II. 386
Rhexie.	III. 301
Rhodiole.	III. 203
Rhubarbe.	I. 610
Rhodore.	II. 259
Riccie.	I. 296
Ricin.	III. 642
Ricotie.	II. 732
Rivine.	I. 616
Riz.	I. 394
Robinier.	III. 510
Rocou.	III. 120
Roella.	II. 309
Romarin.	II. 10
Ronce.	III. 376
Rondelet.	II. 556
Rondier.	I. 405
ROSACÉES.	III. 310
Rosage.	II. 252
ROSAGES.	II. 249
Roseau.	I. 391
Rosier.	III. 336
Rossolis.	II. 764
Rottbolle.	I. 366
Rouvet.	I. 571
Royène.	II. 244
Rubanier.	I. 336
Rubeatia.	III. 597
RUBIACÉES.	II. 540
Rudbecke.	II. 516 et IV. 55
Rue.	III. 142
Ruellie.	I. 702
Ruppie.	I. 323
RUTACÉES.	III. 137

S.

	T. pag.
Sabot.	I. 556
Sablier.	III. 650
Sabline.	III. 160
Safran.	I. 533
Sagine.	III. 155
Sagittaire.	I. 434
Sainfoin.	III. 553
Salicaire.	III. 305
SALICAIRES.	III. 302
Salicorne.	I. 634
Salsifix.	II. 345
Samara.	III. 603
Samole.	I. 680
Samyda.	IV. 14
Sanguinaire.	II. 693
Sanguisorbe.	III. 357
Sanicle.	II. 647
Santoline.	II. 487
Sapin.	III. 773
Saponaire.	III. 166
Sapotillier.	II. 238
SAPOTILLIERS.	II. 233
Sarracénie.	IV. 10
Sarothra.	III. 184
Sarrette.	II. 384
Sarriette.	II. 30
Satyre.	I. 284
Satyrion.	I. 550
Sauge.	II. 11 et IV. 44
Saule.	III. 705
Saurure.	I. 321
Savonier.	II. 768
SAVONIERS.	II. 766
Saxifrage.	III. 215 et IV. 60
SAXIFRAGES.	III. 213
Scabieuse.	II. 531
Scheuchzère.	I. 435
Schinus.	III. 573
Scille.	I. 477
Scirpe.	I. 343
Scolyme.	II. 353
Scopaire.	II. 84
Scorpionne.	II. 163
Scorpiure. *V.* Chenille.	
Scorzonère.	II. 343
Scotie.	III. 429
Scrophulaire.	II. 87
SCROPHULAIRES.	II. 82
Scutellaire. *V.* Toque.	
Sébestier.	II. 145
Sécuridaca.	III. 563
Seigle.	I. 380
Selague.	I. 741
Selin.	II. 633
Seneçon.	II. 442
Septas.	III. 212
Seringa. *V.* Syringa.	
Sériole.	II. 348
Serissa.	II. 570
Serpentine.	II. 229
Sésame.	II. 188
Séseli.	II. 605
Sésuve.	III. 249
Shérard.	II. 541
Sibbaldie.	III. 364
Sibthorpie.	I. 692
Sicyos.	III. 655
Sida.	III. 55
Sigesbeckia.	II. 502
Silène.	III. 173
Simarouba.	III. 93
Silphide.	II. 511.

	T. pag.
Sison.	II. 617
Sisymbre.	II. 725
Smilace.	I. 421
Smithia.	IV. 21
Solandre.	III. 60
SOLANÉES.	II. 105
Soldanelle.	I. 675
Sophore.	III. 446
Sorbier.	III. 333
Souchet.	I. 345 et IV. 33
SOUCHETS.	I. 336
Souci.	II. 461
Spargoute.	III. 157
Sparte.	I. 395
Spathélie.	III. 574
Spermacoce.	II. 551
Sphaigne.	I. 300
Sphœranthus.	II. 389
Spigélie.	II. 204
Spilanthe.	II. 505
Spilman.	I. 737
Spirée.	III. 380
Splanc.	I. 297
Stachide.	II. 50
Staticée.	I. 659
Stapélie.	II. 215
Staphylée.	III. 590
Stébé.	II. 375
Stéline.	II. 387
Stellaire.	III. 163
Stellère.	I. 583
Sterculier.	III. 82
Stévie.	II. 399
Stillingie.	III. 649
Stipe.	I. 358
Stokésie.	II. 358
Stramoine.	II. 116
Stratiote.	I. 559
Struthiole.	I. 583
Subulaire.	II. 738
Sucepin.	IV. 7
Sucre.	I. 359
Sumac.	III. 566
Superbe.	I. 443
Sureau.	II. 586
Surelle.	III. 35
Svertie.	II. 202
Symphoricarpos.	II. 573
Syringa.	III. 295

T.

	T. pag.
Tabac.	II. 113
Tabernier.	II. 208
Tagète.	II. 454
Talin.	III. 240
Tamarinier.	III. 426
Tamarix.	III. 242
Tame.	I. 425
Tanaisie.	II. 475
Tarconanthe.	II. 483
Técoma.	II. 191
Tek.	I. 732
Télèphe.	III. 243
Téligone.	III. 694
TÉRÉBINTACÉES.	III. 563
Térébinthe.	III. 575
Ternstrome.	II. 806
Terrenoix.	II. 634
Terrète.	II. 45
Tétragone.	III. 268
Thapsie.	II. 605
Thé.	II. 807
Thésion.	I. 571

	T. pag.
Thlaspi.	II. 745
Thuya.	III. 756
Thym.	II. 66
Thymbra.	II. 69
THYMÉLÉES.	I. 577
Tiarelle.	III. 220
Tigride.	I. 515
TILIACÉES.	III. 105
Tillandsie.	I. 452
Tillée.	III. 192
Tilleul.	III. 117
Tithymale.	III. 622
Tolut.	III. 577
Toque.	II. 79
Tordyle.	II. 640
Tormentille.	III. 365
Tourrette.	II. 714
Trachélie.	II. 308
Tragia.	III. 648
Trèfle.	III. 480
Trémelle.	I. 290
Trianthême.	III. 245
Tribule.	III. 137
Trichilia.	II. 813
Trichomanes.	I. 313
Trichostema.	II. 78
Trientale.	I. 669
Trigonelle.	III. 490
Trillium.	I. 415
Trioste.	II. 572
Tripsaque.	I. 364
Troëne.	I. 726
Troscart.	I. 435
Trolli.	II. 675
Truffe.	I. 284
Tubalgia.	I. 495
Tubéreuse.	I. 510
Tulipe.	I. 441
Tulipier.	III. 91
Tupélo.	I. 574
Turnère.	III. 240
Turquette.	I. 648
Tussilage.	II. 441

U.

Ulve.	I. 291
Umari.	III. 560
Uniole.	I. 387
Urène.	III. 54
Utriculaire.	I. 680
Uvulaire.	I. 444

V.

Valériane.	II. 536
Varec.	I. 291
Varrone.	II. 147
Vélar.	II. 724
Vélézie.	III. 184
Vella.	II. 749
Vérâtre.	I. 438
Verbésine.	II. 507
Verge d'or.	II. 431
Vergerolle.	II. 420
Véronique.	I. 686 et IV. 39
Verveine.	I. 737
Vesce.	III. 540
Vesse de loup.	I. 283
Vigne.	II. 821
VIGNES.	II. 818
Vinettier.	III. 100
VINETTIERS.	III. 100
Violette.	III. 132
Viorne.	II. 579

	T. pag.
Vipérine.	II. 155
Volant d'eau.	I. 320
Volkamer.	I. 728
Vomique.	II. 231
Wachendorfe.	I. 534
Waltherie.	III. 106
Winterania.	II. 812
Vulpin.	I. 349

X.

Ximenia.	II. 798
Xylophyle.	III. 635
Xyménie.	IV. 28

	T. pag.
Y.	
Yucca.	I. 450
Yvraie.	I. 371
Z.	
Zacinthe. *V.* Hédypnoïde.	
Zanichellie.	I. 323
Zamie.	I. 314
Zanthorhize.	II. 689
Zédoaire.	I. 545
Zégée.	II. 379
Zinnia.	II. 510
Zisiphore.	II. 7
Zostère.	I. 327

Fin de la Table des noms français des genres.

TABLE

DES NOMS LATINS

DES GENRES.

A.

	T. pag.		T. pag.
Abies.	III. 773	*Ægopodium.*	II. 597
Abrus.	III. 507	*Ærua.*	I. 643
Acalypha.	III. 647	*Æschinomene.*	III. 558
Acanthi.	I. 700	*Æsculus.*	II. 773
Acanthus.	I. 701	*Æthusa.*	II. 611
Acer.	II. 776	*Agaricus.*	I. 287
Acera.	II. 773	Agaricus. *Vide* Amanita et Meralius	
Achania. *Vide* Malvaviscus.			
Achillea.	II. 492	*Agave.*	I. 457
Achras.	II. 238	*Ageratum.*	II. 400
Achyranthes.	I. 644	*Agrimonia.*	III. 360
Aconitum.	II. 685	*Agriphyllum.*	II. 518
Acorus.	I. 334	*Agrostemma.*	III. 182
Acrostichum.	I. 303	*Agrostis.*	I. 356
Actæa.	II. 691	Ajuga. *Vide* Bugula.	
Adansonia.	III. 74	*Aira.*	I. 366
Adelia.	III. 641	*Aizoon.*	III. 249
Adiantum.	I. 312	*Albuca.*	I. 476
Adonis.	II. 667	*Alcea.*	III. 50
Adoxa.	III. 222	*Alchimilla.*	III. 363
Ægilops.	I. 365	*Aletris.*	I. 459
Ægiphila.	I. 729	*Alevrites.*	III. 645

	T. pag.
Algæ	I. 289
Alisma.	I. 434
Alisma. *Vide* Damasonium.	
Allamanda.	II. 227
Allium.	I. 482
Alnus. *Vide* Betula.	
Aloe.	I. 461
Alopecurus.	I. 349
Alpinia.	I. 544
Alsine.	III. 155
Alstrœmeria.	I. 511
Althæa.	III. 46
Alyssum.	II. 736
Amanita.	I. 285
Amaranthi.	I. 637
Amaranthus.	I. 637
Amaryllis.	I. 497
Ambroma.	III. 77
Ambrosia.	II. 525
Amellus.	II. 522
Amentaceæ.	III. 698
Amethistea.	II. 6
Ammania.	III. 308
Ammi.	II. 635
Amomum.	I. 542
Amorpha.	III. 508
Amygdalus.	III. 399
Amyris.	III. 573
Anacardium. *Vide* Cassuvium.	
Anacyclus.	II 488
Anagallis.	I. 665
Anagyris.	III. 445
Anastatica.	II. 748
Anavinga.	IV. 14
Anchusa.	II. 164
Ancistrum.	III. 359
Andira.	III. 561
Andrachne.	III. 639
Andromeda.	II. 284
Andropogon.	I. 362
Androsace.	I. 670
Andryala.	II. 349.
Anemone.	II. 663
Anethum.	II. 601
Angelica.	II. 620
Anoda.	III. 59
Anona.	III. 94
Anonæ.	III. 93
Anthemis.	II. 489
Anthericum.	I. 465
Anthericum. *Vide* Phalangium.	
Antholiza.	I. 532
Anthospermum.	II. 550
Anthoxanthum.	I. 349
Anthyllis.	III. 474
Antirrhinum.	II. 96
Antirrhinum. *Vide* Linaria.	
Apeiba.	III. 113
Aphanes.	III. 363
Aphyllanthes.	I. 427
Apium.	II. 600
Apocineæ.	II. 206
Apocinum.	II. 219
Aponogeton.	I. 321
Aquilegia.	II. 681
Aquilicia.	II. 816
Arabis.	II. 715
Arachis.	III. 473
Aralia.	II. 594
Araliæ.	II. 593
Arbutus.	II. 288
Arctopus.	II. 648
Arctotis.	II. 519
Ardisia.	IV. 19

	T. pag.
Arduina, *Lin. Vide* Carissa.	
Areca.	I. 402
Arenaria.	III. 160
Aretia.	I. 669
Arethusa.	I. 556
Argemone.	II. 694
Aristolochia.	I. 564
ARISTOLOCHIÆ.	I. 564
Aristotelia.	IV. 9
Armeniaca.	III. 397
Arnica.	II. 456
AROIDEÆ.	I. 327
Artedia.	II. 642
Artemisia.	II. 477
Artocarpus.	III. 682
Arum.	I. 328 et IV. 32
Arundo.	I. 391
Asarum.	I. 568
Asclepias.	II. 222
Ascyrum.	II. 787
Aspalathus.	III. 451
ASPARAGI.	I. 407
Asparagus.	I. 411
Asperugo.	II. 167
Asperula.	II. 541
ASPHODELI.	I. 458
Asphodelus.	I. 468
Asplenium.	I. 308
Aster.	II. 422 et IV. 53
Astragalus.	III. 515
Astrantia.	II. 646
Athamanta.	II. 631
Athanasia.	II. 484
Atractylis.	II. 355
Atragene.	II. 659
Atraphaxis.	I. 602
ATRIPLICES.	I. 614
Atriplex.	I. 630
Atropa. *Vide* Mandragora.	
Atropa.	II. 119
Aucuba.	III. 618
Avena.	I. 388
Averrhoa.	III. 585
AURANTIA.	II. 797
Auricularia.	I. 288
Axyris.	I. 632
Ayenia.	III. 80
Aylanthus.	III. 579
Aytonia.	II. 812
Azalea.	II. 256
Azima.	IV. 7
B.	
Baccharis.	II. 415 et IV 52
Ballota.	II. 54
Baltimora.	II. 503
Banisteria.	II. 782
Banksia.	I. 592
Barleria.	I. 702 et IV. 40
Bartsia.	I. 695
Basella.	I. 619
Basilæa.	I. 469
Bauhinia.	III. 442
Befaria.	II. 261
Begonia.	IV. 11
Bellis.	II. 470
Bellium.	II. 455
BERBERIDES.	III. 100
Berberis.	III. 100
Besleria.	IV. 47
Beta.	I. 624
Betonica.	II. 48
Betula.	III. 718
Bidens.	II. 506
Bignonia.	II. 193

	T. pag.
Bignonia, *Lin.* *Vide* Catalpa, Tecoma, Bignonia et Gelsemi-num.	
Bignoniæ.	II. 186
Biscutella.	II. 734
Bixa.	III. 120
Blæria.	II. 263
Blakea.	III. 299 et IV. 61
Blechnum.	I. 310
Blitum.	I. 633
Bocconia.	II. 699
Boerhaavia.	I. 655
Boletus.	I 285
Boletus. *Vide* Agaricus.	
Bombax.	III. 73
Bontia.	II. 141
Borassus. *Vide* Lontanus.	
Borbonia.	III. 452
Borraginea.	II. 144
Borrago.	II. 166
Bosea.	I. 617
Brassica.	II. 709
Briza.	I. 387
Bromelia.	I. 452
Bromeliæ.	I. 450
Bromus.	I. 381
Broussonetia.	III. 686
Browallia.	II. 104
Brucea.	III. 588
Brunella.	II. 78
Brunia.	III. 615
Brunsfelsia.	II. 141
Bryonia.	III. 655
Bryum.	I. 299
Bubon.	II. 615
Bucida.	I. 575
Budleja.	II. 83
Bufonia.	III. 154
Bugula.	II. 21
Bulbocodium.	I. 491
Bunias.	II. 751
Bunium.	II. 634
Buphtalmum.	II. 498
Buplevrum.	II. 642
Bursera.	III. 577
Butomus.	I. 433
Butonica.	III. 297
Buxus.	III. 639
Byssus.	I. 289
Byttneria.	III. 79

C.

	T. pag.
Cacalia.	II 392
Cachrys.	II. 629
Cacti	III. 224
Cactus.	III. 229
Cadia.	IV. 26
Cæsalpinia.	III. 439
Calceolaria.	II. 100
Calcitrapa.	II. 373
Calea.	II. 484
Calendula.	II. 461
Calla.	I. 332
Callicarpa.	I. 731
Calligonum.	I. 613
Callisia.	I. 429
Callitriche.	I. 323
Caltha.	II. 687
Calycanthus.	III. 408
Camellia.	II. 809
Cameraria.	II. 211
Campanula.	II. 301

	T. pag.		T. pag.
CAMPANULACEÆ.	II. 300	*Ceanothus.*	III. 610
Camphorosma.	I. 618	*Cecropia.*	III. 681
Canarina.	II. 300	*Cedrela.*	II. 817
Canna.	I. 540	*Celastrus.*	III. 593
CANNÆ.	I. 540	*Celosia.*	I. 641
Cannabis.	III. 693	*Celsia.*	II. 106
Cantharellus.	I. 285	*Celtis.*	III. 703
Canthium.	II. 565	*Cenchrus.*	I. 365
Cantua.	II. 185	*Cenia.*	II. 471
CAPPARIDES.	II. 756	*Centaurea.*	II. 381
Capparis.	II. 759	*Centunculus.*	I. 665
Capraria.	II. 85	*Cephalanthus.*	II. 569
CAPRIFOLIA.	II. 571	*Cerastium.*	III. 158
Caprifolium.	II. 576	*Cerasus.*	III. 385
Capsicum.	II. 135	*Ceratonia.*	III. 426
Caragana.	III. 512	*Ceratophyllum.*	I. 320
Cardamine.	II. 729	*Cerbera.*	II. 230
Cardiospermum.	II. 766	*Cercis.*	III. 443
Carduus.	II. 365	*Cercodea.*	III. 270
Carex.	I. 337	*Cerinthe.*	II. 151
Carica. *Vide* Papaya.		*Ceropegia.*	II. 215
Carissa.	II. 231	*Cestrum.*	II. 139 et IV. 49
Carlina.	II. 359	*Chærophyllum.*	II. 606
Carolinéa. *Vide* Pachira.		*Chamærops.*	I. 406
Carpesium.	II. 474	*Chara.*	I. 319
Carpinus.	III. 722	*Cheiranthus.*	II. 782
Carthamus.	II. 356	*Chelidonium.*	II. 699
Carum.	II. 599	*Chelone.*	II. 187
CARYOPHYLLEÆ.	III. 151	*Chenopodium.*	I. 626
Cassia.	III. 430	*Cherleria.*	III. 160
Cassuvium.	III. 564	*Chiococca.*	II. 563
Castanea.	III. 726	*Chionanthus.*	I. 714
Casuarina.	III. 745	*Chironia.*	II. 203
Catalpa.	II. 189	*Chlora.*	II. 202
Catananche.	II. 350	*Chloranthus.*	IV. 6
Catesbea.	II. 553	*Chondrilla.*	II. 323
Caucalis.	II. 639	*Chrysanthemum.*	II. 464

	T.	pag.
Chrysobalanus.	III.	384
Chrysocoma.	II.	418
Chrysophyllum.	II.	236
Chrysosplenium.	III.	221
Cicer.	III.	547
Cichoraceae.	II.	320
Cichorium.	II.	351
Cicuta.	II.	633
Cicutaria.	II.	612
Cimicifuga.	II.	690
Cinchona.	II.	555
Cineraria.	II.	448
Cinna.	I.	349
Circea.	III.	272
Cissampelos.	III.	98
Cissus.	II.	819
Cisti.	III.	121
Cistus.	III.	122
Citrus.	II.	799
Clathrus.	I.	284
Clavaria.	I.	289
Claytonia.	III.	246
Clematis.	II.	656
Cleome.	II.	756
Cleonia. *Vide* Brunella.		
Clerodendrum.	I. 727 et IV.	41
Clethra.	II.	290
Cliffortia.	III.	361
Clinopodium.	II.	63
Clitoria.	III.	503
Clusia.	II.	796
Clutia.	III.	638
Clypeola.	II.	735
Cneorum.	III.	571
Cnicus.	II.	356
Coccoloba.	I.	600
Cochlearia.	II.	740
Cocos.	I.	403
Coffea.	II.	563
Coix.	I.	398
Colchicum.	I.	439
Coldenia.	II.	152
Collinsonia.	II.	20
Columnea.	II.	101
Colutea.	III.	522
Comarum.	III.	373
Commelina.	I.	430
Comocladia.	III.	572
Comptonia.	III.	740
Conferva.	I.	290
Coniferae.	III.	743
Conium. *Vide* Cicuta.		
Conocarpus.	I.	575
Convallaria.	I.	416
Convolvuli.	II.	171
Convolvulus.	II.	171
Conyza.	II.	412
Copaifera.	III.	562
Corchorus.	III.	110
Cordia.	II.	145
Coreopsis.	II.	508
Coriandrum.	II.	610
Coriaria.	IV.	13
Coris.	I.	668
Corispermum.	I.	635
Cornucopiae.	I.	397
Cornus.	II.	588
Cornutia.	I.	731
Coronilla.	III.	559
Corrigiola.	III.	243
Cortusa.	I.	674
Corylus.	III.	737
Corymbiferae.	II.	391
Corymbium.	II.	389

	T. pag.
Corypha.	I. 404
Costus.	I. 643
Cotula.	II. 472
Cotyledon.	III. 200
Coutarea.	II. 560
Crambe.	II. 752
Crassula.	III. 192
Cratægus.	III. 331
Crepis.	II. 336
Crescentia.	II. 142
Crinum.	I. 492
Crithmum.	II. 631
Crocodilium.	II. 372
Crocus.	I. 533
Crotalaria.	III. 464
Croton.	III. 646
Crucianella.	II. 546
CRUCIFERAE.	II. 705
Cucubalus.	III. 178
Cucumis.	III. 659
Cucurbita.	III. 664
CUCURBITACEAE.	III. 653
Cuminum.	II. 614
Cunila.	II. 7
Cunonia.	III. 223
Cupania.	II. 772
Cuphea.	III. 307
Cupressus.	III. 753
Curcuma.	I. 545
Curtisia.	IV. 18
Cyanella.	I. 475
Cyanus.	II. 378
Cyathus.	I. 291
Cycas.	I. 315 et IV. 31
Cyclamen.	I. 676
Cydonia.	III. 326
Cylista.	IV. 20
Cynanchum.	II. 229
Cynara.	II. 361
CYNAROCEPHALAE.	II. 354
Cynoglossum.	II. 167
Cynosurus.	I. 369
CYPEROIDEAE.	I. 336
Cyperus.	I. 345 et IV. 33
Cypripedium.	I. 556
Cyrilla.	II. 263
Cytharexylum.	I. 733 et IV. 43
Cytinus.	I. 569
Cytisus.	III. 459

D.

Dactylis.	I. 368
Dais.	I. 584
Dalbergia.	III. 560
Dalea.	III. 479
Dalechampia.	III. 652
Damasonium.	I. 433
Daphne.	I. 578
Datisca.	IV. 16
Datura.	II. 116
Daucus.	II. 636
Decumaria.	III. 293
Delphinium.	II. 683
Dentaria.	II. 731
Dianella.	I. 410
Dianthera. *Vide* Justicia.	
Dianthus.	III. 167
DICOTYLEDONES	I. 562
—— *APETALAE.*	I. 564
—— *MONOPET.*	I. 663
—— *POLYPET.*	II. 592
—— *DICLINES.*	III. 619
Dictamnus.	III. 144

	T. pag.
Didelta.	II. 453
Diervilla.	II. 574
Digitalis.	II. 98
Dionæa.	IV. 8
Dioscorea.	I. 423
Diosma.	III. 147
Diospyros.	II. 242
DIPSACEAE.	II. 529
Dipsacus.	II. 529
Dirca.	I. 577
Disandra.	I. 693
Dodartia.	II. 90
Dodecatheon.	I. 675
Dodonæa.	III. 584
Dolichos.	III. 495
Dombeya.	III. 78
Doronicum.	II. 455
Draba.	II. 739
Dracæna.	I. 408
Dracocephalum.	II. 71
Dracontium.	I. 332
Drepania.	II. 338
Drosera.	II. 764
Dryas.	III. 375
Drymis.	III. 85
Drypis.	III. 184
Duranta.	I. 734

E.

Echinophorus.	II 648
Echinops.	II 387
Echites.	II. 214
Echium.	II. 155
Eclypta.	II. 504
Elretia.	II. 146
ELAEAGNI.	I. 570
Elæagnus.	I. 573
Elais.	IV. 33
Elate.	I. 402
Elatine.	III. 157
Elephantopus.	II. 400
Ellisia.	II. 159
Elymus.	I. 372
Empetrum.	II. 299
Emplevrum.	III. 151
Encelia.	II. 500
Ephedra.	III. 744
Epidendrum.	I. 557
Epigæa.	II. 293
Epilobium.	III. 277
Epimedium.	III. 103
Equisetum.	I. 317
Eranthemum.	I. 741
ERICAE.	II. 262
Erica.	II. 264 et IV. 50
Erigeron.	II. 420
Erinus.	I. 693
Eriocephalus.	II. 497
Eriophorus.	I. 343
Ervum.	III. 545
Eryngium.	II. 649
Erysimum.	II. 724
Erythrina.	III. 502
Erythronium.	I. 443
Ethulia.	II. 474
Eucalyptus.	III. 297
Euclea.	IV. 9
Eugenia.	III. 291
Evolvulus.	II. 181
Evonymus.	III. 591
Eupatorium.	II. 395
EUPHORBIAE.	III. 620
Euphorbia.	III. 622

	T. pag.
Euphoria.	II. 771
Euphrasia.	I. 694
F.	
Faba.	III. 543
Falkia.	II. 170
Fagara.	III. 581
Fagonia.	III. 138
Fagus.	III. 724
Ferraria.	I. 516
Ferula.	II. 626
Festuca.	I. 383
Ficaria.	II. 674
Ficoideae.	III. 247
Ficus.	III. 674
Filago. *V.* Gnaphalium.	
Filices.	I. 301
Flacurtia.	III. 114
Flagellaria.	I. 411
Flaveria.	IV. 54
Fontanesia.	IV. 23
Fontinalis.	I. 299
Forskalea.	III. 690
Fothergilla.	III. 699
Fragaria.	III. 369
Frankenia.	III. 185
Francklinia. *V.* Gordonia.	
Fraxinus.	I. 710
Fritillaria.	I. 445
Fritillaria. *V.* Basilæa.	
Fuchsia.	III. 280
Fucus.	I. 291
Fumaria.	II. 701
Fungi.	I. 282
Fusanus. *V.* Evonymus.	

	T. pag.
G.	
Galanthus.	I. 508
Galardia.	II. 518
Galega.	III. 527
Galenia.	I. 619
Galeopsis.	II. 47
Gallium.	II. 543
Gardenia.	II. 557
Garidella.	II. 680
Gaultheria.	II. 294
Gaura.	III. 279
Gelseminum.	II. 232
Genipa.	II. 559
Genista.	III. 454
Gentianae.	II. 197
Gentiana.	II. 197
Geoffraea.	III. 560
Geraniae.	III. 5
Geranium.	III. 5 et IV. 58
Gerardia.	II. 91
Germanea.	II. 74
Geropogon.	II. 347
Gesneria.	II. 310
Gethyllis.	I. 490
Geum.	III. 374
Ginkgo.	IV. 17
Gisekia.	III. 247
Gladiolus.	I. 529
Glaucium.	II. 698
Glaux.	III. 309
Glechoma.	II. 45
Gleditsia.	III. 423
Glinus.	III. 250
Globba.	I. 542 et IV. 37
Globularia.	I. 677
Gloriosa. *V.* Methonica.	

	T. pag.
Glycine.	III. 504
Glycyrrhisa.	III. 525
Gnaphalium.	II. 403
Gnidia.	I. 585
Gomphrena.	I. 645
Goodenia.	II. 317
Gordonia.	III. 71
Gorteria.	II. 458
Gossypium.	III. 68
Gouania.	III. 617
GRAMINEÆ.	I. 347
Grangea.	II. 473
Gratiola.	II. 102
Grewia.	III. 115
Gronovia.	III. 654
GUAIACANÆ.	II. 242
Guaiacana. *Vide* Diospyros.	
Guaiacum.	III. 141
Guazuma.	III. 78
Guettarda.	II. 566
Guilandina.	III. 440
Gundelia.	II. 390
Gunnera.	III. 695
GUTTIFERÆ.	II. 794
Gymnocladus.	III. 424
Gypsophila.	III. 164

H.

Hæmanthus.	I. 496
Hæmatoxylum.	III. 437
Halesia.	II. 247
Halleria.	II. 86
Hamamelis.	III. 104
Hamelia.	II. 568
Hasselquistia.	II. 641
Hebenstretia.	I. 742
Hedera.	II. 591
Hedypnois.	II. 339
Hedysarum.	III. 553
Helenium.	II. 515
Helianthemum.	III. 127
Helianthus. II. 513 et	IV. 55
Helicteres.	III. 81
Heliocarpos.	III. 111
Heliophila.	II. 721
Heliotropium.	II. 153
Heliconia.	I. 539
Helleborus.	II. 676
Helmintia.	II. 343
Helonias.	I. 436
Hemerocallis.	I. 491
Hemionitis.	I. 310
Hemithomus.	II. 107
HEPATICÆ.	I. 295
Heracleum.	II. 625
Heritiera.	IV. 21
Hermannia.	III. 107
Hernandia.	I. 599
Herniaria.	I. 648
Hesperis.	II. 716
Heuchera.	III. 214
Hibiscus.	III. 61
Hieracium.	II. 331
Hippia.	II. 475
Hippocratea.	II. 780
Hippocrepis.	III. 549
Hippomane.	III. 649
Hippophae.	I. 572
Hippuris.	I. 319
Hirtella.	III. 384
Holcus.	I. 360
Holosteum.	III. 153

	T. pag.
Homalium.	III. 410
Hopea.	II. 248
Hordeum.	I. 373
Hortensia.	II. 584
Hottonia.	I. 668
Houstonia.	II. 551
Humulus.	III. 692
Hura.	III. 650
Hyacinthus.	I. 470
Hydnum.	I. 287
Hydrangea.	III. 223
Hydrastis.	II. 662
HYDROCHARIDES.	I. 559
Hydrocharis.	I. 559
Hydrocotyle.	II. 652
Hydrophyllum.	II. 149
Hymenea.	III. 441
Hyoscyamus.	II. 111
Hyoseris.	II. 340
Hypecoum.	II. 700
HYPERICA.	II. 786
Hypericum.	II. 787
Hypnum.	I. 298
Hypochœris.	II. 348
Hypoxis.	I. 508
Hyssopus.	II. 31

I.

	T. pag.
Jacea.	II. 376
Jacquinia.	II. 234
Jasione.	II. 316
JASMINEÆ.	I. 708
Jasminum.	I. 722
Jatropha.	III. 643
Iberis.	II. 742
Ilex.	III. 597
Ilicioides.	IV. 27
Illecebrum.	I. 646
Illicium.	III. 85
Impatiens.	III. 34
Imperatoria.	II. 608
Imperialis.	I. 446
Indigofera.	III. 529
Inula.	II. 437
Ipomœa.	II. 179
Iresine.	I. 643
IRIDES.	I. 513
Iris.	I. 517
Isatis.	II. 754
Isnardia.	III. 308
Isoetes.	I. 317
Isopyrum.	II. 678
Itea.	II. 261
Iva.	II. 523
Juglans.	III. 586
JUNCI.	I. 426
Juncus.	I. 427
Jungermannia.	I. 295
Juniperus.	III. 749
Jussiæa.	III. 273
Justicia.	I. 703 et IV. 40
Ixia.	I. 525
Ixora.	II. 561

K.

	T. pag.
Kœmpferia.	I. 545
Kalmia.	II. 249
Kiggellaria.	III. 637
Killingia.	I. 347
Kirganelia.	III. 636
Knautia.	II. 536
Kœnigia.	I. 613

	T. pag.		T. pag.
L.		*Ligusticum.*	II. 621
		Ligustrum.	I. 726
Labiatæ.	II. 5	*Lilac.*	I. 708
Lachenalia.	I. 473 et IV. 35	*Lilia.*	I. 440
Lachnæa.	I. 584	*Lilium.*	I. 447
Lactuca.	II. 324	*Limeum.*	III. 245
Lagerstromia.	III. 302	*Limodorum.*	I. 554
Lagoecia.	II. 652	*Limonia.*	II. 806
Lagurus.	I. 359	*Limosella.*	I. 669
Lamium.	II. 45	*Linaria.*	II. 91
Lampsana.	II. 321	*Linnæa.*	II. 572
Lanaria.	I. 474	*Linum.*	III. 186
Lantana.	I. 735	*Liparia.*	III. 453
Lappa.	II. 371	*Liquidambar.*	III. 739
Larix.	III. 770	*Liriodendrum.*	III. 91
Laserpitium.	II. 623	*Lithospermum.*	II. 157
Lathræa.	I. 699	*Litsea.*	IV. 22
Lathyrus.	III. 531	*Littorella.*	I. 652
Lavandula.	II. 36	*Lobelia.*	II. 312
Lavatera.	III. 48	*Læflingia.*	III. 153
Lauri.	I. 594	*Lolium.*	I. 371
Laurus.	I. 594	*Lontarus.*	I. 405
Lausonia.	III. 304	*Lopezia.*	IV. 20
Ledum.	II. 259	*Lotus.*	III. 491
Leea.	II. 240	*Lucuma.*	II. 238
Leguminosæ.	III. 411	*Ludwigia.*	III. 272
Lemma.	I. 316	*Lunaria.*	II. 753
Lenticula.	I. 324	*Lupinus.*	III. 467
Leontice.	III. 102	*Lychnis.*	III. 180
Leontodon.	II. 341	*Lycium.*	II. 137
Leonurus.	II. 57	*Lycoperdon.*	I. 283
Lepidium.	II. 746	*Lycopodium.*	I. 300
Leptospermum.	III. 284	*Lycopsis.*	II. 162
Leucoium.	I. 507	*Lycopus.*	II. 6
Leysera.	II. 410	*Lygeum.*	I. 395
Lichen.	I. 292	*Lygistum.*	IV. 28
Lightfootia.	II. 185	*Lysimachia.*	I. 666

	T.	pag.		T.	pag.
Lisimachiae.	I.	664	*Meliae.*	II.	811
Lythrum.	III.	306	*Melianthus.*	III.	146
			Melica.	I.	367
M.			*Melicocca.*	II.	772
			Melilotus.	III.	485
Magnolia.	III.	88	*Melissa.*	II.	69
Magnoliae.	III.	84	*Melittis.*	II.	74
Mahernia.	III.	109	*Melochia.*	III.	69
Malachodendrum.	III.	70	*Melodinus.*	II.	228
Malachra.	III.	52	*Melothria.*	III.	657
Malope.	III.	39	*Menispermа.*	III.	97
Malpighia.	II.	783	*Menispermum.*	III.	99
Malpighiae.	II.	781	*Mentha.*	II.	42
Malva.	III.	39	*Menyanthes.*	I.	681
Malvaceae.	III.	38	*Mercurialis.*	III.	621
Malvaviscus.	III.	67	*Meriilius.*	I.	288
Malus.	III.	311	*Mesembryanthemum.*	III.	251
Mammea.	II.	796	*Mespilus.*	III.	327
Mandragora.	II.	118	*Messerschmidia.*	II.	150
Mangifera.	III.	565	*Methonica.*	I.	443
Manulea.	I.	694	*Metrosideros.*	IV.	22
Maranta.	I.	544	*Michauxia.*	IV.	26
Marchantia.	I.	296	*Michelia.*	III.	87
Marrubium.	II.	55	*Micropus.*	II.	486
Marsilea.	I.	316	*Milium.*	I.	354
Martynia.	II.	195	*Mollera.*	II.	501
Massonia.	I.	475	*Mimosa.*	III.	412
Matricaria.	II.	469	*Mimulus.*	II. 103 et IV.	47
Medeola.	I.	415	*Miniusartia.*	III.	154
Medicago.	III.	486	*Mitchellia.*	II.	568
Melaleuca.	III.	282	*Mitella.*	III.	221
Melampodium.	II.	512	*Mnium.*	I.	298
Melampyrum.	I.	698	*Mœrhingia.*	III.	157
Melanthium.	I.	436	*Mogorium.*	I.	721
Melastoma.	III.	299	*Moluccella.*	II.	62
Melastomae.	III.	298	*Mollugo.*	III.	154
Melia.	II.	814	*Momordica.*	III.	658

	T.	pag.
Monarda.	II.	8
MONOCOTYLÉDONES.	I.	325
Monotropa.	IV.	7
Monsonia.	III.	31
Montia.	III.	241
Montinia.	III.	271
Moræa.	I. 524 et IV.	36
Moringa.	III.	436
Morus.	III.	684
Mucor.	I.	283
Muntingia.	III.	114
Murraya.	II.	798
Musa.	I.	536
MUSÆ.	I.	536
Musci.	I.	297
Myagrum.	II.	756
Myosotis.	II.	163
Myosurus.	II.	675
Myrica.	III.	715
Myriophyllum.	I.	320
Myrsine.	II.	239
MYRTI.	III.	281
Myrtus.	III.	287

N.

	T.	pag.
NAIADES.	I.	318
Naias.	I.	320
Napœa.	III.	54
NARCISSI.	I.	496
Narcissus.	I.	504
Narthecium.	I.	435
Nepeta.	II.	33
Nerium.	II.	211
Nicotiana.	II.	113
Nigella.	II.	679
Nissolia.	III.	561
Nitraria.	III.	248
Nolana.	II.	169
Nolia.	IV.	24
Nonatelia.	II.	567
NYCTAGINES.	I.	653
Nyctago.	I.	653
Nyctanthes. *Vide* Mogorium.		
Nymphæa.	I.	560
Nyssa.	I.	574

O.

	T.	pag.
Ocymum.	II.	75
Œnanthe.	II.	613
Œnothera.	III.	274
Œrua.	I.	643
Oldenlandia.	II.	553
Olea.	I.	716
Olyra.	I.	397
ONAGRÆ.	III.	269
Omphalea.	III.	652
Onoclea.	I.	302
Ononis.	III.	469
Onopordum.	II.	364
Onosma.	II.	160
Ophioglossum.	I.	302
Ophioxylon.	II.	229
Ophrys.	I.	551
ORCHIDEÆ.	I.	546
Orchis.	I.	547
Origanum.	II.	64
Ornithogalum.	I.	480
Ornithopus.	III.	548
Orobanche.	I.	699
Orobus.	III.	539
Orontium.	I.	334

	T.	pag.
Ortegia.	III.	152
Oryza.	I.	394
Osmunda.	I.	302
Osteospermum.	II.	460
Osyris.	I.	571
Othonna.	II.	451
Oxalis.	III.	35
P.		
Pachira.	III.	83
Pæderia.	II.	565
Paliurus.	III.	609
PALMÆ.	I.	400
Panax.	II.	595
Pancratium.	I.	502
Pandanus.	IV.	15
Panicum.	I.	352
Papaver.	II.	695
PAPAVERACEÆ.	II.	693
Papaya.	III.	672
Parietaria.	III.	691
Paris.	I.	416
Parkinsonia.	III.	428
Parnassia.	II.	765
Paronychia.	I.	647
Parthenium.	II.	524
Paspalum.	I.	352
Passerina.	I.	581
Passiflora.	III.	667
Pastinaca.	II.	603
Patagonula.	II.	144
Paullinia.	II.	767
Pavonia.	III.	52
Pedalium.	II.	196
PEDICULARES.	I.	683
Pedicularis.	I.	696
Peganum.	III.	144
Pelecinus.	III.	521
Peltaria. *Vide* Clypeola.		
Penæa.	IV.	5
Pentapetes.	III.	75
Penthorum.	III.	213
Peplis.	III.	310
Perdicium.	II.	440
Perilla.	II.	36
Periploca.	II.	217
Persica.	III.	402
Petiveria.	I.	617
Peucedanum.	II.	628
Peziza.	I.	285
Peziza. *Vide* Cyathus.		
Phaca.	III.	521
Phalangium.	I.	467
Phalaris.	I.	351
Phallus.	I.	284
Phallus. *Vide* Boletus.		
Pharnaceum.	III.	156
Phascum.	I.	300
Phaseolus.	III.	498
Phellandrium.	II.	612
Philadelphus.	III.	295
Phleum.	I.	350
Phlomis.	II.	58
Phlox.	II.	182
Phœnix.	I.	401
Phormium. *Vide* Lachenalia.		
Phylica.	III.	612
Phyllanthus.	III.	634
Phyllirea.	I.	719
Phyllis.	II.	552
Physalis.	II.	121
Phyteuma.	II.	311
Phytolacca.	I.	614

	T. pag.		T. pag.
Picris.	II. 342	*Polytrichum.*	I. 298
Pilularia.	I. 316	*Pontederia.*	I. 509
Pimpinella.	II. 598	*Populus.*	III. 711
Pinguicula.	I. 681	*Portesia.*	II. 812
Pinus.	III. 758	*Portlandia.*	II. 559
Piper.	III. 695	*Portulaca.*	III. 239
Piscidia.	III. 509	*PORTULACEAE.*	III. 238
Pisonia.	I. 656	*Potamogeton.*	I. 321
Pistacia. *Vide* Terebinthus.		*Potentilla.*	III. 365
Pisum.	III. 536	*Poterium.*	III. 356
Pitcairnia.	I. 453	*Pothos.*	I. 333
Pittosporum.	IV. 24	*Prasium.*	II. 81
Planera.	IV. 25	*Prenanthes.*	II. 322
PLANTAGINES.	I. 649	*Primula.*	I. 671
Plantago.	I. 650	*Prinos.*	III. 601
Platanus.	III. 742	*Protea.*	I. 587
Plinia.	III. 408	*PROTEAE.*	I. 586
Plocama.	IV. 19	Prunella. *Vide* Brunella.	
PLUMBAGINES.	I. 657	*Prunus.*	III. 392
Plumbago.	I. 657	*Psidium.*	III. 286
Plumeria.	II. 209	*Psoralea.*	III. 477
Poa.	I. 385	*Psyllium.*	I. 649
Podophyllum.	II. 692	*Ptelea.*	III. 583
Pæonia.	II. 688	*Pteranthus.*	III. 692
Poinciana.	III. 438	*Pteris.*	I. 311
POLEMONIA.	II. 182	*Pterocarpus.*	III. 561
Polemonium.	II. 184	*Pteronia.*	II. 386
Polyanthes.	I. 510	*Pulmonaria.*	II. 159
Pollichia.	IV. 18	*Punica.*	III. 293
Polycarpon.	III. 153	*Pyrola.*	II. 292
Polycnemum.	I. 618	*Pyrus.*	III. 318
Polygala.	I. 683		
POLYGONEAE.	I. 600	*Q.*	
Polygonum.	I. 602		
Polymnia.	II. 502	*Quassia.*	III. 93
Polypodium.	I. 304	*Quercus.*	III. 729

	T. pag.
R.	
Rajania.	I. 426
Randia.	II. 554
RANUNCULACEAE.	II. 655
Ranunculus.	II. 668
Raphanus.	II. 706
Rauwolfia.	II. 228
Reseda.	II. 762
Rhagadiolus.	II. 321
RHAMNI.	III. 589
Rhamnus.	III. 603 et IV. 63
Rhaponticum.	II. 380
Rheum.	I. 610
Rhexia.	III. 301
Rhinanthus.	I. 697
Rhodiola.	III. 203
RHODODENDRA.	II. 249
Rhododendrum.	II. 252
Rhodora.	II. 259
Rhus.	III. 566
Ribes.	III. 225
Riccia.	I. 296
Ricinus.	III. 642
Ricotia.	II. 732
Rivinia.	I. 616
Robinia.	III. 510
Roella.	II. 309
Rondeletia.	II. 556
Rosa.	III. 336
ROSACEAE.	III. 310
Rosmarinus.	II. 10
Rottboellia.	I. 366
Royena.	II. 244
Rubentia.	III. 597
Rubia.	II. 548
RUBIACEAE.	II. 540
Rubus.	III. 376
Rudbeckia.	II. 516 et IV. 55
Ruellia.	I. 702
Rumex.	I. 606
Ruppia.	I. 323
Ruscus.	I. 419
Ruta.	III. 142
RUTACEAE.	III. 137
S.	
Saccharum.	I. 359
Sagina.	III. 155
Sagittaria.	I. 434
SALICARIAE.	III. 302
Salicornia.	I. 634
Salix.	III. 705
Salsola.	I. 621
Salvia.	II. 11 et IV. 44
Samara.	III. 603
Sambucus.	II. 586
Samolus.	I. 680
Samyda.	IV. 14
Sanguinaria.	II. 693
Sanguisorba.	III. 357
Sanicula.	II. 647
Santolina.	II. 487
SAPINDI.	II. 766
Sapindus.	II. 768
Sapium.	III. 651
Saponaria.	III. 166
SAPOTAE.	II. 233
Sarothra.	III. 184
Sarracenia.	IV. 19
Satureia.	II. 30

	T.	pag.
Satyrium.	I.	550
Saururus.	I.	321
Saxifraga.	III. 215 et IV.	60
Saxifragae.	III.	213
Scabiosa.	II.	531
Scandix.	II.	608
Scheuchzeria.	I.	435
Schinus.	III.	573
Schœnus.	I.	342
Schotia.	III.	429
Scilla.	I.	477
Scirpus.	I.	343
Soleranthus.	III.	244
Scolymus.	II.	353
Scoparia.	II.	84
Scorpiurus.	III.	548
Scorzonera.	II.	343
Scrophularia.	II.	87
Scrophularieae.	II.	82
Scutellaria.	II.	79
Secale.	I.	384
Securidaca.	III.	563
Sedum.	III.	203
Selago.	I.	741
Selinum.	II.	633
Semperviveae.	III.	191
Sempervivum.	III.	209
Senecio.	II.	442
Septas.	III.	212
Serapias.	I.	553
Seridia.	II.	375
Seriola.	II.	348
Seriphium.	II.	411
Serissa.	II.	670
Serratula.	II.	384
Sesamum.	II.	188
Sesseli.	II.	605
Sesuvium.	III.	249
Sherardia.	II.	541
Sibbaldia.	III.	364
Sibthorpia.	I.	692
Sicyos.	III.	655
Sida.	III.	55
Sideritis.	II.	39
Sideroxylum.	II.	234
Sigesbeckia.	II.	502
Silene.	III.	173
Silphium.	II.	512
Sinapis.	II.	707
Sison.	II.	617
Sisymbrium.	II.	725
Sisyrinchium.	I.	514
Sium.	II.	618
Smilax.	I.	421
Smithia.	IV.	21
Smyrnium.	II.	602
Solandra.	III.	60
Solaneae.	II.	105
Solanum.	II. 124 et IV.	48
Soldanella.	I.	675
Solidago.	II.	432
Sonchus.	II.	327
Sophora.	III.	446
Sorbus.	III.	333
Sparganium.	I.	336
Spathelia.	III.	574
Spergula.	III.	157
Spermacoce.	II.	551
Sphœranthus.	II.	389
Sphagnum.	I.	300
Spielmannia.	I.	737
Spigelia.	II.	204
Spilanthus.	II.	505
Spinacia.	I.	622

	T. pag.
Spiræa.	III. 380
Splachnum.	I. 297
Spondias.	III. 578
Stachys.	II. 50
Stæhelina.	II. 387
Stapelia.	II. 215
Staphylea.	III. 590
Statice.	I. 659
Stellaria.	III. 163
Stellera.	I. 583
Sterculia.	III. 82
Stevia.	II. 399
Stewartia. *V.* Malachodendrum.	
Stillingia.	III. 649
Stipa.	I. 358
Stokesia.	II. 358
Stratiotes.	I. 559
Struthiola.	I. 583
Strychnos.	II. 231
Styrax.	II. 245
Subularia.	II. 738
Swertia.	II. 202
Swietenia.	II. 816
Symphoricarpos.	II. 573
Symphytum.	II. 161
Syringa. *Vide* Lilac.	

T.

Tabernæmontana.	II. 208
Tagetes.	II. 454
Talinum.	III. 240
Tamarindus.	III. 426
Tamarix.	III. 242
Tamnus.	I. 425
Tanacetum.	II. 475
Taraxacum.	II. 341
Tarchonanthus.	II. 483
Taxus.	III. 747
Tecoma.	II. 191
Tectona. *Vide* Theka.	
Telephium.	III. 243
Terebintaceæ.	III. 563
Terebinthus.	III. 575
Terminalia.	I. 576
Ternstromia.	II. 806
Tetragonia.	III. 268
Teucrium II. 22 et IV	45
Thalictrum.	II 660
Thapsia.	II. 605
Thea.	II. 807
Theka.	I. 732
Theligonum.	III. 694
Theobroma.	III. 75
Thesium.	I. 571
Thlaspi.	II. 745
Thuya.	III. 756
Thymbra.	II. 69
Thymeleæ.	I. 577
Thymus.	II. 66
Tiarella.	III. 220
Tigridia.	I. 515
Tilia.	III. 117
Tiliaceæ.	III. 105
Tillæa.	III. 192
Tillandsia.	I. 452
Toluifera.	III. 577
Tordylium.	II. 640
Tormentilla.	III. 365
Tournefortia.	II. 148
Trachelium.	II. 308
Tradescantia.	I. 431
Tragia.	III. 648

	T. pag.
Tragopogon.	II. 345
Trapa.	I. 561
Tremella.	I. 290
Trianthema.	III. 245
Tribulus.	III. 137
Trichilia.	II. 813
Trichomanes.	I. 313
Trichosanthes.	III. 666
Trichostema.	II. 78
Trientalis.	I. 669
Trifolium.	III. 480
Triglochin.	I. 435
Trigonella.	III. 490
Trillium.	I. 415
Triosteum.	II. 572
Tripsacum.	I. 364
Triticum.	I. 376
Triumfetta.	III. 112
Trollius.	II. 675
Tropæolum.	III. 32
Tubalgia.	I. 495
Tuber.	I. 284
Tulipa.	I. 441
Turnera.	III. 240
Turritis.	II. 714
Tussilago.	II. 441
Typha.	I. 335
TYPHAE.	I. 335

U.

Ulex.	III. 450
Ulmus.	III. 700
Ulva.	I. 291
UMBELLIFERAE.	II. 597
Uniola.	I. 387
Urena.	III. 54
Urospermum.	II. 346
Urtica.	III. 687
URTICAE.	III. 673
Utricularia.	I. 680
Uvularia.	I. 444

V.

Vaccinium.	II. 295
Valantia.	II. 547
Valeriana.	II. 536
Varronia.	II. 147
Velezia.	III. 184
Vella.	II. 749
Veratrum.	I. 438
Verbascum.	II. 108
Verbena.	I. 737
Verbesina.	II. 507
Veronica.	I. 686 et IV. 39
Viburnum.	II. 579
Vicia.	III. 540
Vinca.	II. 207
Viola.	III. 132
Viscum.	II. 578
VITES	II. 818
Vitex.	I. 729
VITICES.	I. 727
Vitis.	II. 821
Volkameria.	I. 728

W.

Wachendorfia.	I. 534
Waltheria.	III. 106
Winterania.	II. 812

	T. pag.
X.	
Xanthium.	II. 526
Xeranthemum.	II. 401
Ximenia.	II. 798
Xylophylla.	III. 635
Xylosteon.	II. 574
Xymenia.	IV. 28
Y.	
Yucca.	I. 450
Z.	
Zamia.	I. 314
Zanichellia.	I. 323
Zanthorhyza.	II. 689
Zanthoxylum.	III. 582
Zea.	I. 395
Zinnia.	II. 510
Zizyphora.	II. 7
Zizyphus.	III. 608
Zœgea.	II. 379
Zostera.	I. 327
Zygophyllum.	III. 139

Fin de la Table des noms latins des genres.

TABLE

DES NOMS SYNONIMES FRANCAIS

ET

DES NOMS VULGAIRES.

Les noms précédés d'une †, sont ceux que les habitans des campagnes donnent à ces plantes dans le département du Pas-de-Calais.

A.

Abécédaire. *Voyez* Spilanthe, 1 et 2.
Abricotier d'Amérique. — Mamei.
Absinthe (petite). — Armoise 5.
Absinthe commune. — Armoise 4.
Absinthe de Portugal. — Armoise 1.
Absinthe maritime. — Armoise 20.
Abutilon. — Sida.
Acacia. — Acacie.
Acacia (faux), ou blanc, ou des jardiniers. — Robinier 1.
Acacia rose. — Robinier 4.
Acacia triacanthos. — Févier.
Acacia nostras. Fruit du Prunier 2.
Acacia de Farnèze. — Acacie 25.
Acajou à meubles. — Mahogon.
Acajou à planches. — Cedrel.
Acajou à pommes. — Acajou.

Ache. *Voyez* Persil 2.
Ache de montagne. — Livèche 1.
Acore (faux). — Iris 18.
Adambé glabre, synonime de — Lagerstrome 2.
Adhatoda. — Garmantine 5.
Adragant. — Astragales 33, 34, 35.
Agapanthus, H. K. — *Crinum* 1.
Agnus castus. — Gattilier 1.
Aiau. — Narcisse 2.
Aiglantine. — Ancolie 1.
Aigle de l'Empire. — Fougère 1.
† Aiguillette. — Mirrhide 4.
Ail cultivé. — Ail 9.
Alaterne. — Nerprun 16.
Alaterne bâtard. — Céanothe 2.
Alberge. — Pêcher, syn. de Pavie.
Alcana ou Alcanette. — Lausone 2.
Alchimille des champs. — Percepier.
Alisier de Fontainebleau. — Alisier 2.
Alkékenge. — Coqueret 1.
Alguette. — Zanichelle.
Alleluya. — Surelle 2.
Alliaire. — Julienne 16.
† Alliance. — Sorbier 1.
Aloës artichaut. — Aloës II.
Aloës bec de canne. — Aloës VIII, variété 1.
Aloës caballin. — Aloës II, var. 9.
Aloës corne de bélier. — Aloës II, var. 1.
Aloës d'eau. — Stratiote.
Aloës dents de brochet. — Aloës II.
Aloës épi de blé. — Aloës XII.
Aloës faux succotrin. — Aloës IX.
Aloës hépatique. — Aloës II, var. 9.
Aloës langue de bœuf. — Aloës VIII.
Aloës minime. — Aloës III, var. 2.
Aloës peint, *Aloës picta*, Juss. — Aloës VII.
Aloës perroquet. — Aloës X.
Aloës pouce écrasé. — Aloës XIII.

Aloës triangulaire.	*Voyez* Aloës XI.
Alouche.	— Alisier 1, var.
Alpiste.	— Phalaris 1.
Althæa des jardiniers.	— Ketmie 7.
Althæa.	— Guimauve 1.
Aluyne.	— Armoise 4.
Alvarde.	— Sparte.
Alviez du Briançonnais.	— Pin 9.
Alype.	— Globulaire 2.
Amadou, amadouvier.	— Agaric 1.
Ambrette.	— Ketmie 13, et Centaurées 55 et 56.
Ambroisie.	— Ansérine 11.
Amelanchier.	— Alisier 7.
Amelanchier du Canada.	— Alisier 8.
Amelanchier de Choisy.	— Alisier 9.
Amome pétiolé.	— Alpinie.
Amomum.	— Morelle 6.
Amourette.	— Saxifrage 8.
Amourette d'Egypte.	— Reséda 10.
Amourettes.	— Brize.
Androselle.	— Androsace.
Anémone des jardins.	— Anémone 6.
Angélique épineuse.	— Aralie 1.
Angélique sauvage.	— Podagraire.
Angélique des prés et des bois.	— Angélique 2.
Angélique des jardins ou de Bohême.	— Angélique 1.
Angurie.	— Concombre 9.
Anis.	— Boucage 5.
Anis doux.	— Anet 2.
Anis étoilé.	— Badiane 1.
Anone.	— Corossol.
Antholyze de Perse.	— Antholyze 3.
Anthore.	— Aconit 4.
Apalachine.	— Houx 6.
Appétit.	— Ail 32.
Arack ou Rack (liqueur).	— Riz. Us.
Arbre à baume.	— Clusier.

Arbre à chapelet.	*Voyez*	Azédarack 1.
Arbre à cire.	—	Galé 2.
Arbre à éponge.	—	Acacie 25.
Arbre à franges.	—	Chionanthe 1.
Arbre à pain.	—	Jaquier 2.
Arbre à poison.	—	Sumac 8 et 9.
Arbre à soie de Virginie.	—	Périploque 1.
Arbre aux anémones.	—	Calycanthe 1.
Arbre aux fraises.	—	Arbousier 1.
Arbre aux savonettes.	—	Savonier.
Arbre aux tulipes.	—	Tulipier.
Arbre d'argent.	—	Protée 19.
Arbre de castor.	—	Magnolier 2.
Arbre de Judée.	—	Gaînier.
Arbre de neige.	—	Chionante 1.
Arbre de corail.	—	Erythrine 3.
Arbre de Dieu.	—	Figuier 3.
Arbre de soie.	—	Acacie 18.
Arbre de suif.	—	Gluttier.
Arbre de vie.	—	Thuya.
Arbre d'or des Pyrénées.	—	Rosage.
Arbre doré.	—	Caimitier et Argan 4.
Arbrisseau ambré.	—	Anthosperme.
Archangélique.	—	Angélique 1.
Argalou.	—	Paliure.
Argan de Maroc.	—	Argan 5.
Argentine.	—	Potentille 2 et Céraiste 8
† Arragonne.	—	Julienne 1 et var.
Arrête-bœuf.	—	Bugrane 2.
Arroche puante.	—	Anserine 15.
Arthanita.	—	Cyclame. Us.
Asarine.	—	Muflier 3.
Asperge d'Afrique.	—	Médéole 1.
Aspic.	—	Lavande 1.
Assa fœtida.	—	Férule 6.
Assiminier.	—	Corossol 10.
Astère de Raguse.	—	Conyze 7.
Astragalus Massiliensis.	—	Astragale 33.

Atti des Indiens. *Voyez* Figuier 12.
Attrape-mouche. — Silène 25 et Dionée.
Aubépine. — Néflier 11.
Aubergine. — Morelle 37.
Aubifoin. — Bleuet 40.
Aubours — Cytise 1.
Aune. — Bouleau.
Aune commun. — Bouleau 10.
Aune de montagne. — Bouleau 12.
Aunée. — Inule 1.
Aune lacinié. — Bouleau 10, var.
Aune noir. — Nerprun 8.
Aveline. — Fruit des Noisettiers 1, et var. 3.
Avelinier. — Noisettier.
Avocat. — Laurier 7.
Auricule. — Primevère 4.
Aurone. — Armoise 9.
Aurone femelle. — Santoline 1.
Azarero. — Cerisier 11.
Azarine. — Mufflier 3.
Azérolier. — Neflier 12.
Azérolier d'Italie. — Neflier 16.
Azérolier du Canada. — Neflier 3.
Azul ou Azoul. — Ficoïde 1.

B.

Baguette d'or. — Giroflée 1, var. 2.
Baillard. — Orge 2.
Balaustes (fleurs). — Grenadier 1.
Balsamite du Levant. — Chrysanthème 8.
Bambou. — Roseau 1.
Barbarée. — Vélar 2.
Barbarine. — Courge 3, var. 3.
Barbeau. — Bleuet 40.
Barbe de bouc ou de chèvre. — Spirée 9.
Barbe de Jupiter. — Anthyllide 5.

Barbe de renard.	*Voyez* Astragale 33.
Barbe de vieillard.	— Géropogon.
Bardane (petite).	— Lampourde 1.
Basilic sauvage.	— Clinopode 1.
Bassinet.	— Renoncule 29.
Barras.	— Pin. Us.
Batate de Virginie.	— Morelle 33.
Baume.	— Menthe.
Baume de Copahu.	— Copahu.
Baume de Tolut.	— Tolut.
Baume des jardins.	— Menthe 8.
Baume du Pérou (faux).	— Mélilot 1.
Baume sauvage.	— Menthe 1.
Baumier (grand).	— Peuplier 6.
Baumier du Canada.	— Peuplier 5.
Beccabunga.	— Véronique 20.
Bec de cigogne.	— Géranion 41.
Bec de grue.	— Géranion.
Bédéguar.	Excroissance du Rosier, surtout du 29e.
Behen blanc.	— Cucubale 2.
Behen rouge.	— Staticée 4.
Belladonna.	— Amaryllis 9.
Belladone du Pérou.	— Belladone 3.
Belle de jour.	— Liseron 9.
Belle de nuit.	— Nictage.
Belvédère.	— Ansérine 18.
Belvédère de Sibérie.	— Ansérine 20.
Benjoin.	— Badamier 2.
Benjoin (faux).	— Laurier 10.
Benjoin de France.	— Impératoire.
Bergamotte.	— Oranger, var. 17.
Bétoine d'eau.	— Scrophulaire 3.
Bétoine de montagne.	— Arnique 1.
Bette-rave.	— Bette.
† Bibreul.	— Berce 1.
Bicorne.	— Cornaret.
Bigarade.	— Oranger, var. 9.

Bigareautiers.	*Voyez* Cerisiers. SECT. III.
Bilimbi.	— Carambolier.
† Bisaille.	— Pois, var. 7.
Bistorte.	— Renouée 2.
† Blanc aune.	— Alisier 1.
Blanc de Hollande.	— Peuplier 1, var.
Blanchette.	— Valériane 11.
Blattaire.	— Molène 13.
Blé d'abondance.	— Froment 2.
Blé de Barbarie.	— Froment, var. 14.
Blé de miracle.	— Froment 2.
Blé de providence.	— Froment, var. 7.
Blé de Turquie.	— Maïs.
Blé de vache.	— Mélampyre.
Blé noir.	— Renouée 17.
Blé pétanielle	— Froment, var. 12.
Bleuet (grand).	— Bleuet 39.
Bleuet de montagne.	— Bleuet 39.
Bois à cochon.	— Gomart 1.
Bois à lardoire.	— Fusain 1.
Bois à petites feuilles.	— Jambosier 3.
Bois à poudre.	— Nerprun 8.
Bois baguette.	— Raisinier 2.
Bois blanc.	— Peuplier 1.
Bois béni.	— Buis.
Bois bouton.	— Céphalante.
Bois cabril.	— Ægiphile.
Bois couleuvre.	— Nerprun 6.
Bois d'aloës.	— Sébestier, (le vrai est un Agalloche).
Bois de Brésil.	— Brésillet 1.
Bois de Campêche.	— Campêche.
Bois de capitaine.	— Malpighie 3.
Bois de chandelle.	— Dragonier (autre espèce cultivée).
Bois de colophane.	— Gomart.
Bois de cuir.	— Dirca.
Bois de demoiselle.	— Kirganelle.

Bois de fer.	*Voyez*	AEgiphile.
Bois de fer d'Afrique.	—	Argan 1.
Bois de fer de la Jamaïque.	—	Fagarier 1.
Bois de Fernambouc.	—	Brésillet 1.
Bois de guittare ou de guitard.	—	Cotelet 1.
Bois de lance.	—	Gratgal.
Bois de lettres.	—	Argan 1.
Bois de merle.	—	Célastre 5.
Bois de Nicarague.	—	Campêche.
Bois de plomb.	—	Dirca.
Bois de reinette.	—	Dodonée 2.
Bois de Sainte-Lucie.	—	Cerisier 6.
Bois de sang.	—	Campêche.
Bois de Sapan.	—	Brésillet 4.
Bois de Savannes.	—	Agnante 1.
Bois de soie.	—	Calabure.
Bois d'Inde.	—	Brésillet et Campêche.
Bois du petit baume.	—	Croton 5.
Bois gentil.	—	Lauréole 1.
Bois immortel.	—	Erythrine 3.
Bois jaune.	—	Laurier 2. Bignone 2. Tulipier, Sumac 21 et Broussonnet 2.
Bois joli.	—	Lauréole 1.
Boisivrant.	—	Piscidie.
Bois néphrétique.	—	Ben.
Bois noir du Malabar.	—	Acacie 19.
Bois puant.	—	Anagyre.
Bois punais.	—	Cornouiller 5.
Bois trompette.	—	Coulequin.
Bon-Henri.	—	Ansérine 1.
Bonne-Dame.	—	Arroche 12.
Bonnet d'Electeur.	—	Courge 3, var. 5.
Bonnet de prêtre.	—	Fusain 1.
† Boquettier.	—	Pommier 1.
Bouillard.	—	Bouleau.
Bouillon blanc.	—	Molène 1.
Bouillon noir.	—	Molène 9.

Bouis. *Voyez* Buis.
Bouleau de Constantinople. — Bouleau 9.
Boule de neige. — Viorne 10, var.
Bouquet parfait, ou tout fait. — Œillet 1.
Bouquette. — Renouée 17.
Bourbonnaise. — Lychnide 3.
Bourdaine ou bourgène. — Nerprun 8.
Bourdaine blanche. — Viorne 9.
Bourg épine. — Nerprun 1.
Bourrache (petite). — Cynoglosse 5.
Bourreau des arbres. — Célastre 2.
Bourse à pasteur ou à berger. — Thlaspi 8.
Bouton d'argent. — Achillée 13, var. et Renoncule 9, var.
Bouton d'or. — Renoncule 10, var.
Boyau de chat. — Ulve et Froment 12.
Brai liquide. — Pin. Us.
Branc ursine. — Acanthe.
Branc ursine (fausse). — Berce 1.
Brésillet, faux Brésillet. — Comoclade 2.
Brocolis. — Chou, var. 4.
Brossière. — Barbon 4.
Brugnon. — Pêcher, var. 15.
Brunette. — Brunelle 1.
†Brunk épine. — Nerprun 1.
Bruyère du Cap. — Phylique 1.
Buis de la Chine. — Murrai.
Buisson ardent. — Néflier 2.
Buisson ardent du Malabar. — Ixore 1.
Bulbonack. — Lunaire 2.
Bupariti. — Ketmie 3, et Stercullier 1.
†Buret. — Ficaire.
Busserole. — Arbousier 4.

C.

Caapeba. — Parcire.

Cabaret.	*Voyez* Asaret.
Cacao.	— Cacaoyer.
Cachimentier.	— Corossol 1.
Cachou.	— Extrait de l'arec.
Cade.	— Genèvrier 2.
Caillelait.	— Galiet.
Caillelait blanc.	— Galiet 7.
Caillelait jaune.	— Galiet 6.
Calament.	— Mélisse 2.
Calament des champs.	— Menthe 10.
Calamus aromaticus.	— Acore 1.
Calebasse.	— Courge 1.
Caméléon blanc.	— Carline 1.
Camomille.	Nom corrompu de Cameline 1.
Camomille puante.	— Camomille 8.
Camomille Romaine.	— Camomille 2.
Camphrier.	— Laurier 3.
Canamine.	— Cameline 1.
Caneficier.	— Casse 10.
Canillée.	— Lenticule.
Cannamelle.	— Sucre 1.
Canneberge.	— Airelle 18.
Canne d'Inde.	— Basilier 1.
Cannelier.	— Laurier 1.
Cantaloup.	— Concombre-melon, var. 6.
Capillaire usuel.	— Doradille 10.
Capillaire noir.	— Capillaire 2.
Caprifiguier.	— Figuier.
Caquilier.	— Bunias.
Caragate.	— Tillandsie.
Carambosse (à Malthe).	— Houque 1, var. 1.
Cardamine.	— Cresson.
Cardasse.	— Cactier 18.
Carde.	— Bette 1.
Cardinale.	— Lobélie 6.
Cardinale bleue.	— Lobélie 8.
Cardon d'Espagne.	— Artichaut 2.

Cardon de Tours.	*Voyez* Artichaut 2.
Caret.	— Laiche.
Caroline.	— Pachire.
Carouge.	— Caroubier.
Caryophyllata.	— *Geum.*
Cascarille.	— Croton 1,
Cassave.	— Médicinier 3.
Casse des boutiques.	— Casse 10.
Casse-lunette.	— Bleuet 40.
Cassie des jardiniers.	— Acacie 25.
Cassine.	— Houx 5 et 6.
Cassis.	— Groseiller 5.
Casuarine.	— Filao.
Catapuce.	— Euphorbe 28.
†Catherinette.	Fruit de la Ronce 5.
†Catimuron.	Fruit de la Ronce 2.
Cavalam.	— Sterculier 2.
†Caveron.	Fruit du Prunier 2.
†Caure.	— Noisettier.
Cédrat.	— Citronier, var. 15.
Cèdre acajou.	— Mahogon.
Cèdre blanc.	— Cyprès 3.
Cèdre de la Caroline.	— Genèvrier 6.
Cèdre de la Jamaïque.	— Guazume
Cèdre d'encens.	— Genèvrier 3.
Cèdre des Bermudes.	— Genèvrier 5.
Cèdre d'Espagne	— Genèvrier 3.
Cèdre de Virginie.	— Genèvrier 6.
Cèdre du Liban.	— Mélèze 2.
Cèdre Lycien.	— Genèvrier 8,
Cèdre odorant.	— Cédrel.
Cèdre Phénicien.	— Genèvrier 8. var.
Céleri.	— Persil 2.
Célestine.	Var. plus petite de la chicorée 2.
Centaurée. (grande)	— Centaurée 49.
Centaurée. (petite)	— Gentiane 11.
Centaurée bleue.	— Brunelle 1 et Toque 6.
Centaurée de Constantinople.	— Centaurée 55 et 56.

Centaurée des sultancs.	*Voyez*	Centaurée 55 et 56.
Centaurée jaune (petite).	—	Chlore.
Centaurelle.	—	Gentiane 11.
Centinode.	—	Renouée 13.
Cereus.	—	Cactus.
Cerfeuil cultivé.	—	Myrrhide 1.
Cerise de Juif.	—	Coqueret 1.
Cerisier d'hiver.		
Cerisier des Antilles.	—	Malpighie 1.
Cerisier des Hottentots. (petit)	—	Célastre 10.
Cerisiers.	—	Cerisiers, SECT. 4.
Cétérach.	—	Doradille 4.
Chambreule.	—	Galéope.
Champignon de couche.	—	Amanite 7.
Champignon à lames roses.	—	Amanite 7.
Chandelier de la Vierge.	—	Molène 1.
Chapeau d'évêque.	—	Epimède.
Chardon à foulon.	—	Cardère 1.
Chardon aux ânes.	—	Chardon 17.
Chardon bonnetier.	—	Cardère 1.
Chardon étoilé.	—	Chaussetrape 11.
Chardon hémorrhoïdal.	—	Chardon 26.
Chardon Marie.	—	Carthame 8.
Chardon Roland.	—	Panicaut 6.
Chasse punaise.	—	Cimicaire.
Châtaigne d'eau.	—	Macre.
Châtaigne de terre.	—	Terrenoix.
Chélidoine. (petite)	—	Ficaire.
Chêne (petit)	—	Germandrée 6.
Chêne cyprès.	—	Chêne 2, var. 6.
Chêne d'Espagne à glands doux.	—	Chêne 15.
Chêne noir d'Amérique.	—	Catalpa. 2.
Chêne pyramidal.	—	Chêne 2, var. 6.
Chêne vert à feuilles de houx.	—	Chêne 14, var. 1.
Chervi.	—	Berle 4.
Chevelure blonde.	—	Stipe 1.
Cheveux de Vénus.	—	Capillaire 3 et Nielle 1.
Chicon.	—	Laitue, var. 3.

Chicorée de Zante.	*Voyez*	Hédipnoïde 1.
Chicorée sauvage.	—	Chicorée 1.
Chiendent.	—	Froment 12 et Panis 9.
Chincapin.	—	Châtaignier 2.
Chou Caraïbe.	—	Gouet 11.
Choufleur.	—	Chou, var. 4.
Chou navet.	—	Chou, var. 6.
Chou marin.	—	Crambé 1.
Chou palmiste.	—	Arec.
Chou rave.	—	Chou, var. 5 et espèce 10.
Chrysène.	—	Chrysanthème.
Chrystophoriane.	—	Actée.
Ciboulette.	—	Ail 32.
Cigue. (petite)	—	Œthuse 3.
Cigue. (grande)	—	Cigue 1.
Cierge lézard.	—	Cactier 16.
Cierge.	—	Cactier.
Cierge du Pérou ou épineux.	—	Cactier 8.
Cinnamomum.	—	Laurier 1.
Cirier.	—	Galé 2 et var.
Citronelle.	—	Mélisse 1, Armoise 9.
Citrouille.	—	Courge 3.
Civette, Cive.	—	Ail 32.
†Clave (du nom anglais *Clover*).	—	Trèfle 7.
Cloche.	—	Campanule 8.
Cochêne.	—	Sorbier 1 et 3.
Cocotier de mer.	—	Espèce de Rondier.
Cœur de bœuf.	—	Corossol 4.
Cœur de St.-Thomas.	—	Acacie 14.
Colasseau.	—	Barrelière et suppl.
Collis des Chinois.	—	Dragonier 6.
Colombo.	—	Ménisperme ?
Coloquinte.	—	Concombre 7.
Colsa.	—	Chou, var. 1.
Concombre d'âne.	—	Momordique 5.
Conielle.	—	Cunile.
†Consoli.	—	Consoude 1.
Consoude. (petite)	—	Bugle 5.

Consoude royale.	*Voyez*	Dauphinelle 1.
Conyze d'Afrique.	—	Tarconante.
Conyze des prés.	—	Inule 5.
Copal ou Copalme.	—	Résine des liquidambar.
Coq.	—	Tanaisie 4.
Coquelourde.	—	Anémone 3.
Coquelourde des jardins.	—	Coquelourde 2.
Coquelicot.	—	Pavot 2.
† Coquille.	—	Mâche.
Coquiole.	—	Fétuque 2.
Corail des jardins.	—	Piment 1.
Corbeille d'or.	—	Alysse 2.
Corinthe.	—	Vigne 12 et Groseiller 7.
Corme.	—	Fruit du Sorbier 3.
Cormier.	—	Sorbier 3.
Corne, Cornouille.	—	Fruit du Cornouiller 1.
Corne de cerf.	—	Plantain 4.
Corneille.	—	Lysimachie 1.
Cornichon.	—	Concombre. Us.
Cornuelle.	—	Macre.
Cornuet.	—	Bident 1.
Cotylédon.	—	Cotylet.
† Coucou.	—	Primevère 1.
Coudrier.	—	Noisettier.
Cougourdette.	—	Courge 3, var. 2.
Couis.	—	Calebassier.
Couleuvrée.	—	Bryone 2.
Couronne impériale.	—	Impériale.
†Cranquillier.	—	Chèvre-feuille 3.
Cranson.	—	Cochlearia.
† Cravinchon.	—	Fruit du prunier 2.
Crépide barbue.	—	Drépanie.
Créquier.	—	Prunier 2.
Cresson alénois.	—	Passerage 4.
Cresson de fontaine.	—	Cresson 1.
Cresson de Para.	—	Spilanthe 4.
Cresson des prés.	—	Cresson 4.
Cresson de roche.	—	Dorine 2.

Crête de coq.	*Voyez* Corète 1, et passe-velours 2.
Criste marine.	— Bacille 1.
Crocus.	— Safran.
Croix de Calatrava.	— Amaryllis 5.
Croix de chevalier.	— Tribule 1.
Croix de Jérusalem.	— Lychnide 1.
Croix de Lorraine.	— Cactier 21.
Croix de Saint-André.	— Ascyre 1.
Crustolle.	— Ruellie.
Cumin cornu.	— Hypécoon.
Cumin des prés.	— Carvi.
Cumin sauvage.	— Lagocie.
Curage.	— Renouée 8.
Cururu.	— Paullinie.
Cymbalaire.	— Linaire 1.
Cynorrhodon.	Fruit du rosier 29.
Cynosure.	— Cretelle.
Cyrthanthus, Lin. fils.	— *Crinum* 6, 7.
Cytise de Virgile.	— Luzerne 1.

D.

Dame d'onze heures.	— Ornithogale 3.
Dartier.	— Casse 18.
Dent de lion.	— Pissenlit et Liondent.
Dictame blanc.	— Fraxinelle.
Dictame de Crète.	— Origan 2.
Dictame (faux).	— Marrube 11.
† Dogue (du nom anglais *Dock*).	— Patience.
Dogue à gratelle.	— Inule 1.
Dogue à quelton.	— Bardane 1.
Doigts d'enfant.	— Ficoïde 53.
Dompte venin.	— Asclépiade 13.
Double feuille.	— Iris 18, et Ophrys 18.
Douce-amère.	— Morelle 15.
Doucette.	— Valériane 11.
Doucin.	— Pommier 1, var. 1.

Douve (grande). *Voyez* Renoncule 2.
Douve (petite). — Renoncule 1.
† Drienne. — Terrète.
Droue. — Brôme.

E.

Eau de la reine d'Hongrie. — Romarin. Us.
Eau de Mantes de la Martinique. — Croton. Us.
Ebène de Crète. — Anthyllide 6.
Ebène jaune. — Bignone 2.
Ebène noire. — Plaqueminier 4.
Ebenier. — Plaqueminier 4.
Ebenier (faux). — Cytise 1.
Ebenier des Alpes. — Cytise 1.
Ecbolie. — Carmantine 3.
Echalotte. — Ail 22.
Eclaire. — Chélidoine.
Ecorce de Winter. — Drymis.
Ecorce Elutérienne. — Croton 1.
Ecuelle d'eau. — Hydrocotyle 1.
Eglantier odorant. — Rosier 26.
Elaterium. — Momordique 5.
Ellébore blanc. — Vérâtre.
Elæodendron. — *Rubentia.*
Emerus. — Coronille 1.
Endive. — Chicorée 3.
Endormie. — Stramoine.
Enula campana. — Inule 1.
Epeautre. — Froment 3.
Epeautre (petite). — Froment 5.
Epi de la Vierge. — Ornithogale 2.
Epi fleuri. — Stachide 5.
Epiaire. — Stachide.
Epicia d'Amérique. — Sapin 5.
Epicia du Maryland. — Sapin 6.
Epinard fraise. — Blète.
Epinard des Indes. — Baselle.

Épinard des Juifs. *Voyez* Corète 1.
Epinard sauvage. — Ansérine 1.
Epine blanche. — Pédane 1, et Néflier 11.
Epine de Christ. — Paliure.
Epine de Glastombury. — Néflier 11, var. 5.
Epine de lis. — Catesbée.
Epine du Levant. — Néflier 15.
Epine jaune. — Scolyme 1.
† Epine marante. — Argoussier 1.
Epine marine. — Argoussier 1.
Epine noire. — Prunier 3.
Epine pinchaw. — Néflier 16.
Epine vinette. — Vinettier.
Epurge. — Euphorbe 28.
Erable à main crochue. — Erable 3, var.
Erable de Charles Wager. — Erable 5.
Erable de Pensylvanie. — Erable 7.
Ergot de coq. — Néflier 10.
Erlot. — Narcisse 2.
† Ernotte. — Terrenoix.
Escourgeon. — Orge 3.
Esparcette. — Sainfoin 17.
Esquine. — Smilace 4.
Estragon. — Armoise 12.
Esule. — Euphorbe 48.
Eupatoire aquatique. — Bident 1.
Eupatoire d'Avicenne. — Eupatoire 6.
Eupatoire de Mesué. — Achillée 2.

F.

Fabago. — Fabagelle 1.
Faîne. Fruit du hêtre.
Fau. Hêtre.
Fausse Brancursine. — Berce 1.
Fausse guimauve. — Sida 15.
Faux acacia. — Robinier 1.
Faux acore. — Iris 18.
Faux baume du Pérou. — Melilot 1.

Faux benjoin.	*Voyez* Laurier 10.
Faux brésillet.	— Comoclade 2.
Faux dictame.	— Marrube 11.
Faux Ebenier.	— Cytise 1.
Faux jalap.	— Nictage 1.
Faux pistachier.	— Staphylé 1.
Faux quinquina.	— Iva.
Faux réglisse.	— Abrus.
Faux riz de montagne.	— Orge 4.
Faux séné.	— Baguenaudier 1.
Faux sycomore de Provence.	— Azédarach 1.
Fenouil de porc.	— Peucédan 1.
Fenouil marin.	— Bacille 1.
Fenouil tortu.	— Séseli 3.
Fenouil usuel.	— Anet 2,
Fenu grec.	— Trigonelle.
Fer à cheval.	— Hippocrèpe.
† Ferquères.	— Fougères.
Fève de marais.	— Fève.
Fève de Saint-Ignace.	— Vomique.
† Fève de senteur.	— Lupin 7.
Feuille percée.	— Draconte 1.
Figue banane.	— Bananier 2.
Figue caque.	— Plaqueminier 3.
Figuier d'Adam.	— Bananier 1.
Figuier des Hottentots.	— Ficoïde 44.
Figuier d'Inde.	— Cactier 18.
Filipendule.	— Spirée 10.
Fin houssy.	— Trèfle 2.
Flambe.	— Iris 3.
Fleur de coucou.	— Lychnide 3.
Fleur de crapaud.	— Stapélie 2.
Fleur de la passion.	— Grenadille.
Fleur de moine.	— Mimule 1.
Fleur de Saint-Thomé.	— Guettard.
Fleur de veuve.	— Scabieuse 18.
Fleur du soleil.	— Hélianthème 18.
Fluteau.	— Hottone.

† Fort Jean. — *Voyez* Tame et Bryone 2.
† Fourdaine. — Fruit du prunier 3.
† Fourdinier. — — Prunier 3.
Fougère femelle. — — Polypode 12.
Fougère fleurie. — — Osmonde 2.
Fougère mâle. — — Polypode 10.
Foyard. — — Hêtre.
Fraisier à chassis — — Fraisier, var. 4.
Fraisier breslingues. — — Fraisier, var. 9, 10, 11, 12.
Fraisier caperon. — — Fraisier, var. 13 et 14.
Fraisier capiton. — — Fraisier, var. 5.
Fraisier des bois. — — Fraisier 2.
Fraisier en arbre. — — Arbousier 1.
Fraisier majaufe. — — Fraisier, var. 7.
Fraisier quoimios. — — Fraisier, var. 16, 17, 18, 19 et 20.
Framboisier. — — Ronce 1.
Frêne épineux. — — Clavalier 1.
Frêne de Montpellier. — — Frêne 5.
Fromental d'Angleterre. — — Yvraie 1.
Fromental de France. — — Avoine 2.
Fruit à 4 angles. — — Tétragone.
Frutillier. — — Fraisier, var. 15.
Fumeterre vivace. — — Fumeterre 11.
Fustet des corroyeurs — — Sumac 1 et 21, et Fustet.

G.

Galant de nuit. — — Cestreau 1.
Galant de jour. — — Cestreau 2.
Galant du soir. — — Cestreau 3.
Galant d'hiver. — — Galantine.
Galbanum. — — Bubon 3.
Galiote. — — Benoite 1.
Galipot. — — Pin. Us.
† Gannelle. — — Populage.
Gantelée ou gants de Notre-Dame. — — Digitale 1 et Campanule 19.

Garderobe.	*Voyez* Santoline 1.
Garou.	— Lauréole 2.
Gaude.	— Réséda 4.
Gazon d'Olympe ou d'Espagne.	— Staticée 1.
†Genelle.	Fruit du néflier 11, épine blanche.
Genet à balais.	— Genet 22.
Genet des teinturiers.	— Genet 9.
Genet épineux.	— Ajonc.
Genet de Sibérie.	— Genet 9, var.
Genet de Montpellier.	— Cytise 7.
Genipi des Savoyards.	— Armoise 8.
Gentiane (grande).	— Gentiane 1.
Géraine.	— Géranion.
Germandrée d'eau.	— Germandrée 4.
Germandrée en arbrisseau.	— Germandrée 26.
Gingembre.	— Amome 1.
Gingembre sauvage.	— Amome 2.
Girandole.	— Amaryllis 16.
Giraumon.	— Courge 3, var. 4.
Giroflée de muraille.	— Giroflée 1.
Giroflée de Mahon.	— Julienne 10.
Giroflée des jardins.	— Julienne 7.
Giroflée musquée.	— Julienne 1.
Girouille.	— Caucalide.
Glaciale.	— Ficoïde 4.
Glayeul des marais.	— Iris 18.
Glayeul puant.	— Iris 19.
Glouteron.	— Bardane 1.
Glouteron (petit).	— Lampourde 1.
Gobe-mouche.	— Apocin 1 et Gouet 1.
Goblet d'eau.	— Hydrocotyle 1.
†Goguier.	— Noyer 1.
Gombo.	— Ketmie 15.
Goudron.	— Pin. Us.
Gouais.	— Vigne, var. 13.
Graine d'Avignon.	— Nerprun 2.
Graines à chapelet.	— Abrus.
Graine d'écarlate.	— Chêne 19.

Graine de Paradis.	*Voyez* Amome 3.
Graine de perroquet.	— Carthame 6.
Graine musquée.	— Ketmie 13.
Grand baumier.	— Peuplier 6.
Grand bleuet.	— Bleuet 39.
Grande centaurée.	— Centaurée 49.
Grande cigue.	— Cigue 1.
Grande douve.	— Renoncule 2.
Grande gentiane.	— Gentiane 1.
Grande marjolaine.	— Origan 8.
Grande marguerite.	— Chrysanthème 6.
Grande pimprenelle d'Afrique.	— Mélianthe 1.
Grand mouron.	— Séneçon 8.
Grand pin maritime.	— Pin 2.
Grand raifort.	— Cochléaria 8.
Grand Séneçon d'Afrique.	— Arctotide 4.
Grand soleil.	— Hélianthe 1.
Gratte-cul.	Fruit du Rosier 29.
Gratteron.	— Gallet 15 et Croisette 3.
Grenésienne.	— Amaryllis 19.
Grenouillette.	— Renoncule 17.
Griot.	— Genet 5.
Gris de lin.	— Ibéride 6.
Griset.	— Argoussier.
Griotier.	— Cerisiers. Sect. V.
Groseiller à maquereaux.	— Groseiller 8.
Groseiller rouge et blanc à grappe.	— Groseiller 1.
Groseiller des Barbades.	— Cactier 23.
Gros millet.	— Houque 1.
Grossularia.	— *Ribes.*
Gruau.	— Avoine. Us.
Guède.	— Pastel.
Guenic.	— Bonduc 1.
Gueule de chien.	— Ficoïde 65.
Gueule de lion.	— Muflier 1.
Guigniers.	— Cerisiers. Sect. II.
Guimauve (fausse).	— Sida 15.
Guimauve en arbre.	— Lavatère 1.

Guittarin. *Voyez* Côtelet.

H.

Hannebane. — Jusquiame.
Haricot en arbre. — Glycine 8.
†Harponnier. — Rosier 29.
Hellébore noir. — Hellébore 2.
Hépatique des jardins. — Anémone 1.
Hépatique officinale. — Hépatique.
Herbe à coton. — Gnaphale 26 et 27.
Herbe à cousin. — Lapulier 1.
†Herbe à couteau. — Yvraie.
†Herbe à deux bouts. — Froment 12.
Herbe à éternuer. — Achillée 13.
Herbe à gale. — Morelle 35.
Herbe à jaunir. — Réséda 4 et Genet 9.
Herbe à lait. — Polygale 1.
†Herbe à la coupure. — Valériane 6 et Achillée 19.
Herbe à la ouatte. — Asclépiade 17.
Herbe à l'épervier. — Epervière.
Herbe à l'Esquinancie. — Aspérule 5 et Géranion 26.
Herbe à pauvre homme. — Gratiole 1.
Herbe à Robert. — Géranion 26.
Herbe aux ânes. — Onagre 1.
Herbe aux cancers. — Dentelaire 1.
Herbe aux chats. — Germandrée 19 et Chataire 1.
Herbe aux charpentiers. — Achillée 19.
Herbe aux cuillers. — Cochléaria.
Herbe aux curedents. — Ammi 2.
Herbe aux écrouelles. — Scrophulaire 2.
Herbe aux écus. — Lysimachie 10.
Herbe aux gouteux. — Podagraire.
Herbe aux gueux. — Clématite 9.
Herbe aux mamelles. — Lampsane.
Herbe aux mites. — Molène 13.

Herbe aux panaris. *Voyez* Panarine 3 et 4.
Herbe aux perles. — Grémil 1.
Herbe aux poumons. — Pulmonaire 2.
Herbe aux poux. — Dauphinelle 7.
Herbe aux puces. — Pulicaire 1, Conyze 1 et Inule 1.
Herbe aux sorciers. — Stramoine.
Herbe aux teigneux. — Tussilage 6.
Herbe aux verrues. — Héliotrope 4.
Herbe aux vers. — Tanaisie 1.
Herbe aux vipères. — Vipérine 8.
Herbe chaste. — Gattilier 1.
† Herbe de feu. — Armoise 16 et Ellébore 4.
Herbe de la Trinité. — Violette 19 et Anémone 1.
†Herbe de Saint-Antoine. — Hellébore 4.
Herbe de St.-Christophe. — Actée.
Herbe de Ste.-Barbe. — Vélar 2.
Herbe de St.-Etienne. — Circée 1.
†Herbe de St.-Jacques. — Senéçon 20.
†Herbe de St-Jean. — Armoise 16 et Chrysanthême 6.
Herbe de St.-Julien. — Sarriette 1.
Herbe de St.-Laurent. — Sanicle 1.
Herbe de St.-Pierre. — Souci 1.
Herbe des teinturiers. — Réséda 4.
Herbe d'or. — Hélianthême 18.
Herbe du chantre. — Vélar 1.
Herbe du siége. — Scrophulaire 3.
Herbe du vent. — Phlomis 5 et Anémone 3.
†Herbe endovoire. — Achillée 19.
†Herbe foireuse. — Senéçon 8.
Herbe magique. — Orpin 3.
Herbe maure. — Réséda 8.
Herbe musquée. — Moscatelline.
Herbe sans couture. — Ophioglosse.
Hermodactes. — Iris 32.
Herniaire. — Turquette.
Herse. — Tribule.

Hieracium d'Hongrie. *Voyez* Epervière 7.
Houx frélon. — Fragon 1.
Houx (petit) — Fragon 1.
Hyssope des garigues. — Hélianthème 18.

I.

Immortelle blanche des jardins. — Gnaphale 5.
Immortelle d'Orient. — Gnaphale 17.
Immortelle jaune. — Gnaphale 13 et 17.
Immortelle rouge. — Amaranthine 1.
Indigo. — Indigotier 1.
Indigo bâtard. — Amorpha.
Ivette. — Germandrée 28 et 30.

J.

Jacée. — Centaurées 21, 42 et Violette 19.
Jacée des jardiniers. — Lychnide 4.
Jacinthe de mai. — Scille 4.
Jacinthe du Pérou. — Scille 3.
Jacobée. — Senéçon 20.
Jacobée maritime. — Cinéraire 10.
Jalap. (faux) — Nictage 1.
Jalap. (vrai) — Liseron 37.
Jalousie. — Amaranthe 3.
Jamrose. — Jambosier 2.
Jarnotte. — Terrenoix.
Jasmin à feuilles de houx. — Spilman.
Jasmin d'Afrique. — Spilman et Lyciet 4.
Jasmin d'Arabie ou de Toscane. — Mogori.
Jasmin d'Espagne. — Jasmin 2.
Jasmin de Virginie. — Técoma 2.
Jasmin du Cap. — Gardène 1.
Jasmin odorant de la Caroline. — Jasminée.
Jasminoïde. — Lyciet 2.
Jasmin rouge. — Quamoclit 1.

Jasmin vénéneux. *Voyez* Cestreau 4.
Jonc fleuri. — Butome.
Jonciole. — Bragalou.
Jonc marin. — Ajonc.
Jonc odorant. — Barbon 7.
Jonquille. — Narcisse 9.
Jonthlaspi. — Clypéole 1.
† Jonbarbe. — Joubarbe 6.
Joubarbe des vignes. — Orpin 3.
Julibrisin. — Acacie 18.
Julienne des Jardins. — Julienne 1, var. 1 et 2.
Julienne jaune. — Vélar 2.

K.

Kali. — Soude 1 et 3.
Kermès. — Chêne 19.
Kælreuteria. — Sapindus 3.

L.

Labrusque. — Vigne 1.
Ladanum. — Ciste 11 et 12.
Laitier. — Polygale 1.
Lampette. — Lychnide.
† Lancheron. — Laitron 7.
Landes. — Ajonc.
Langit. — Aylanthe.
Langue de cerf. — Doradille 3.
Langue de chat. — Eupatoire 13.
Langue de chien. — Cynoglosse 1.
† Langue de vache ou de bœuf. — Scabieuse 10.
Larme de Job. — Larmille.
Lasseron. — Laitron 7.
Lavanèze. — Galéga 1.
Laurelle. — Laurose.
Lauréole. — Lauréole 5.
Laurier alexandrin. — Fragon 2.

Laurier amandier. *Voyez* Cerisier 12.
Laurier à pâté. — Laurier 4.
Laurier cerise. — Cerisier 12.
Laurier d'Afrique. — Argan 2.
Laurier de Bourbon. — Laurier 8.
Laurier de Portugal. — Cerisier 11.
Laurier de St-Antoine. — Epilobe.
Laurier des triomphateurs. — Laurier 4.
Laurier maritime. — Xylophylle 1.
Laurier rose. — Laurose.
Laurier royal. — Laurier 5.
Laurier tin. — Viorne 1.
Laurier tulipier. — Magnolier 1.
Lède. — Lédier.
Lentille. — Ers 1.
Lentille d'eau. — Lenticule.
Lentisque. — Térébinthe 3.
Leucanthème. — Chrysanthème. SECT. 1.
Liane à crabes. — Bignone 5.
Liane à paniers. — Bignone 5.
Liane à réglisse. — Abrus.
Liège. — Chêne 15.
Lierre à 5 feuilles. — Vigne 5.
Lierre terrestre. — Terrète.
Lilas des Indes. — Azédarach 2.
Lilas de terre. — Jacinthe 10 et Valériane 1 †.
Limon. — Citronnier, var. 7.
Lis asphodèle. — Hémérocalle.
Lis de mathiole. — Pancrais 3.
Lis des étangs. — Nénuphar 2 et 3.
Lis de St.-Bruno. — Phalangère 9.
Lis des Incas. — Alstrœmère 1.
Lis des vallées. — Muguet 1.
Lis jacinthe. — Scille 2 et 4.
Lis jaune. — Hémérocalle 1.
Lis narcisse. — Pancrais 3 et Amaryllis 2.
Lis St.-Jacques. — Amaryllis 5.

Lis turban. — Lis 3.
Lontar. — Rondier.
Lotier des anciens. — Jujubier 4.
Lotier odorant. — Mélilot 4.
Lyciet du Japon. — Serissa.

M.

Mâche. — Valériane 11.
Magicienne. — Circée.
Magnolier bleu ou des marais. — Magnolier 2.
Mahaleb. — Cerisier 6.
†Mahon. — Pavot 2.
Malherbe. — Thapsie 1 et dentelaire 1.
Mammée. — Lucuma.
Manne de Briançon. — Mélèze. Us.
Manne de Calabre. — Frêne. Us.
†Manchettes de la Vierge. — Liseron 2.
Manioc. — Médicinier 3.
Mansienne. — Viorne 9.
Marguerite. — Chrysanthème.
Marguerite. (grande) — Chrysanthème 6.
Marguerite (petite) — Paquerette 1.
Marguerite dorée. — Chrysanthème 11.
†Margueritelle. — Paquerette 1.
Marceau ou Marsault. — Saules 26 et 27.
Marjolaine. — Origan 5.
Marjolaine. (grande) — Origan 8.
Marjolaine à coquilles. — Origan 1.
Maroute. — Camomille 8.
Marronier. — Châtaignier, var.
Marrube aquatique. — Lycope 1.
Marrube noir. — Ballote 1.
†Marselle. — Viorne 9.
Marsès. — Bacchante du Levant. Suppl.
Martagon. — Lis.
Martagon écarlate. — Lis. 4.

Marum.	*Voyez*	Germandrée 19.
Masse au bedeau.	—	Bunias 2.
Masse d'eau.	—	Massette.
Mastic de Chio.	—	Térébinthe 3. Us.
† Mau.	—	Mauve.
Mauve en arbre.	—	Lavatère 6.
Mauve des Indes.	—	Sida 15.
Mauret.	—	Airelle 17.
Mayenne.	—	Morelle 37.
Médaille.	—	Lunaire 2.
Médicinier sauvage.	—	Médicinier 5.
Mélier.	—	Blakée.
Mélisse de Moldavie.	—	Dracocéphale 9.
Mélisse puante.	—	Mélissot.
Mélisse Romaine.	—	Mélisse 1, var.
Mélisse sauvage ou des bois.	—	Mélissot.
Melon.	—	Concombre 1.
Melon d'eau.	—	Courge 4.
Melon épineux.	—	Cactier 2.
Melongène.	—	Morelle 37.
Menthastre.	—	Menthe 4.
Menthe coq.	—	Tanaisie 4.
Menthe de cimetière.	—	Menthe 4.
Menthe Romaine.	—	Menthe 2.
Menthe rouge.	—	Menthe 6.
Mériane.	—	Antholyze 5.
Mérianelle.	—	Antholyze 6.
Merisier.	—	Cerisier 1,
† Merlier ou Meslier.	—	Néflier 1.
Méthonique.	—	Superbe.
Méum.	—	Œthuse 1.
Mézéréon.	—	Lauréole 1.
Mignardises.	—	Œillet 11.
Mignonette.	—	Saxifrage 8.
Millefeuille.	—	Achillée 19.
Millepertuis usuel.	—	Millepertuis 18.
Millet d'Afrique.	—	Houque 1.
Millet. (gros)	—	Houque 1.

Millet des oiseaux.	*Voyez*	Phalaris 1 et Panis 13.
Millet. (petit)	—	Panis 4 et 13.
Milzadella des Italiens.	—	Lamier 6.
†Minette.	—	Luzerne 5.
Mirlilot.	—	Mélilot 4.
Miroir de Vénus.	—	Campanule 30.
Moldavique.	—	Dracocéphale 9.
Mollé.	—	Schinus.
Monjoli.	—	Varrone.
Montjoli.	—	Camara 6.
Morgeline.	—	Alsine.
Mors du diable.	—	Scabieuse 7.
Mort aux rats.	—	Hamel.
Moureiller.	—	Malpighie.
Mouron d'eau.	—	Samolé
Mouron des oiseaux.	—	Alsine 1.
Mousseron.	—	Amanite 3.
Moutarde du Levant.	—	Mozambé 8.
Moutarde de capucin.	—	Cochléaria 8.
Moxa des Chinois.	—	Armoise 24.
Muffle de veau.	—	Mufflier 1.
Muguet (petit).	—	Aspérule 1.
Munchause.	—	Lagerstrome 2.
Muret.	—	Giroflée 1.
Mûrier à papier.	—	Broussonet 1.
Mûrier des teinturiers.	—	Broussonet 2.
Muscari.	—	Jacinthe 9, 10, 11, 12, 13.
Myrobolan.	—	Monbin.
Myrtille.	—	Airelle 1.

N.

Napel.	—	Aconit 2.
Narcisse à bouquet	—	Narcisse 7.
Nard sauvage.	—	Asaret 1.
Nasitor.	—	Passerage 4.
Navet.	—	Chou 9.

Navette des serins. — Moutarde 1.
Navette. — Chou 9.
Négundo. — Gattilier 3.
Nélumbo. — Nénuphar 5.
Nériette. — Epilobe.
Nez coupé. — Staphylée 1.
Nicotiane. — Tabac.
Nid d'oiseau. — Ophrys 2.
Nielle des bleds. — Coquelourde 1.
† Noble épine. — Vinettier.
Noisette purgative. — Médicinier 2.
Noix d'acajou. — Fruit de l'acajou à pommes.
Noix de bancoul. — Alevrit.
Noix de galle. — Chêne. Us.
Noix de Saint-Gratien. — Noisettier, var. 2.
Noix de terre. — Terrenoix
Noix vomique. — Vomique.
Noli tangere. — Balsamine 1.
Nombril de Vénus. — Cynoglosse 6 et Cotylet 8.
Non feuillée. — Bragalon.
Nostoc. — Trémelle.
Noyer des Indes ou de Ceylan. — Carmantine 5.
Nummulaire. — Lysimachie 10.

O.

Obier. — Viorne 10.
Ocre. — Pois 3.
Œil de bœuf. — Buphtalme.
Œil de chat. — Bonduc 1.
Œil de Christ. — Astère et Inule 6.
Œillet des Chartreux. — Œillet 3.
Œillet de la Chine. — Œillet 10.
Œillet de la Régence. — Œillet 10.
Œillet d'Espagne ou de poète. — Œillet 2.
Œillet des fleuristes. — Œillet 6.
Œillet d'Inde. — Tagète 1.
† Œillet de Dieu. — Coquelourde 1.

Œillette.	*Voyez*	Pavot 1.
Œufs fricassés.	—	Lotier 12.
Oignon.	—	Ail 28.
Oignon de mer.	—	Scille 1.
Oléandre.	—	Laurose.
Olivier bâtard.	—	Daphnot.
Olivier sauvage ou de Bohême.	—	Chalef 1.
Opale.	—	Erable 10.
Opopanax.	—	Panais 3.
Oranger pompadour.	—	Oranger 3.
Orcanette.	—	Buglose 5.
Oreille d'âne.	—	Consoude 1.
Oreille de lièvre.	—	Buplèvre 6.
Oreille de rat.	—	Epervière 2.
Oreille de souris.	—	Scorpionne 1 et Céraiste 8.
Oreille d'homme.	—	Asaret 1.
Oreille d'ours.	—	Primevère 4.
Oreille d'ours de Mycone.	—	Molène 15.
Orme à moyeu.	—	Orme 1, var. 7.
Orme de Samarie.	—	Ptéléa.
Orme d'Amérique.	—	Guazume.
Ormille.	—	Orme 1, var. 2.
Ormille de Sibérie.	—	Orme 4.
Ormin.	—	Sauge 34.
Oronge.	—	Amanite 4.
Orpin de Sibérie.	—	Orpin 5.
Orpin rose.	—	Rhodiole.
Orseille.	—	Lichen 4.
Ortie blanche.	—	Lamier 5.
Ortie grièche.	—	Ortie 3.
Ortie jaune.	—	Galéope 3.
Ortie morte.	—	Galéopes 2 et 3.
Ortie puante ou rouge.	—	Stachide 1.
Orvalle.	—	Lamier 1 et Sauge 36.
Oseille commune.	—	Patience 22.
Oseille (petite).	—	Patience 22.
Oseille en arbre.	—	Patience 13.
Oseille de Guinée.	—	Ketmie 10.

Oseille ronde. *Voyez* Patience 17.
Osier de la Seine. — Saule 10.
Osier jaune. — Saule 4.
Osier rouge. — Saules 16 et 9.
Oxalide. — Surelle.
Oxycèdre. — Genèvrier 2.
†Oyat. — Roseau 5.

P.

Padus. — Cerisier 7.
Pain de coucou. — Surelle 2.
Pain de crapaud. — Gouet 22.
Pain de pourceau. — Cyclame.
Pain de singe. — Baobab.
Palais de lièvre. — Laitron 7.
Palomier. — Gaulthérie.
Palma Christi, ou Palme de Christ. — Ricin.
Palmier éventail. — Camérope.
Pamelle. — Orge 22.
Pampel mousse. — Oranger 3.
Panicaut marin. — Panicaut 5.
Papier des Egyptiens. — Souchet 8.
Paradis. — Pommier 1, var. 2.
Parasol Chinois. — Sterculier 1.
Parasol de Chine. — Souchet 7.
Pareira brava. — Pareire ou Ménisperme.
Parelle. — Lichen 4 et Patience 5.
Parisolle. — Trillium.
Paronique. — Panarine.
Pas de cheval ou d'âne. — Tussilage 2.
Passe-pierre. — Salicorne 2.
Passerose. — Alcée.
Passe-velours. — Tagète 1 et Amarante 18.
Pastenade. — Panais 1.
Pastèque. — Courge 4.

Patate. *Voyez* Liseron 33.
Patience violon. — Patience 11.
Patte d'araignée. — Nielle 1.
Patte de chat. — Ficoïde 64.
† Patte de loup. — Orquis et Lycope 1.
Patte d'oie. — Ansérine.
Paullinia aurea. — Savonier 3.
Pavia. — Marronnier d'Inde 2 et 3.
Pavie. — Pêcher, var. 4.
Pavot blanc ou des jardins. — Pavot 1.
Pavot cornu. — Glaucienne 1.
Pavot épineux ou du Mexique. — Aigémone.
Pavot de Tournefort ou du Levant. — Pavot 5.
Peau de serpent. — Alétris 6.
Pégane. — Harmale.
Peigne de Vénus. — Myrrhide 4.
Peltaire à odeur d'ail. — Clypéole 2.
Pensée. — Violette 19 et 20.
Perce-feuille. — Buplèvre 1.
Perce-pierre. — Bacille 1.
Perce-mousse. — Polytric.
Persil de Macédoine. — Bubon 1
Persil de montagne. — Peucédan 6.
Persil des marais. — Œnanthe 1.
Persil sauvage. — Maceron 1.
Persicaire. — Renouées 9 et 11.
Pétasite. — Tussilage 6.
Petit Cerisier des Hottentots. — Célastre 10.
Petit Chêne. — Germandrée 6.
Petite Bardane. — Lampourde 1.
Petite Bourrache. — Cynoglosse 5.
Petite Centaurée. — Gentiane 11.
Petite Centaurée jaune. — Chlore.
Petite Cigue. — Œthuse 3.
Petite Consoude. — Bugle 5.
Petite Chélidoine. — Ficaire.
Petite Douve. — Renoncule 1.

Petite Epeautre. *Voyez* Froment 5.
Petite Marguerite. — Paquerette 1.
Petite Oseille. — Patience 22.
Petit Gazon. — Staticée 1.
Petit Glouteron. — Lampourde 1.
Petit Houx. — Fragon 1.
Petit Millet. — Panis 4 et 13.
Petit Muguet. — Aspérule 1.
Petun. — Tabac.
Peuplier d'Italie. — Peuplier 4.
Pied d'alouette. — Dauphinelle 1 et 2.
Pied de chat. — Gnaphale 7.
Pied de lièvre. — Trèfle 13.
Pied de griffon. — Ellébore 4.
Pied de lion. — Alchymille 1.
Pied de pigeon. — Géranion 7.
†Pied de poule. — Panis 13 et Renoncule 19.
Pied de vache. — Gouet 12.
Pied de veau d'Afrique. — Calle.
Pied d'oiseau. — Ornithope.
† Pied pou. — Renoncule 19.
Pignon d'Inde. — Ricin et médicinier 1.
Pignons. — Amandes du pin 5.
Piloselle. — Epervière 2.
Piment royal. — Galé 1.
Piment de la Jamaïque. — Myrthe 5.
Pimprenelle cultivée. — Sanguisorbe 1.
Pimprenelle des salades. — Pimprenelle 1.
Pimprenelle d'Afrique (grande). — Mélianthe 1.
Pin Cambro. — Pin 9.
Pin d'Ecosse. — Pin 1.
Pin de Genève. — Pin 1.
Pin de Jersey. — Pin 6.
Pin de Jérusalem. — Pin 4.
Pin de Russie. — Pin 1, var. 5.
Pin de Virginie. — Pin 6 et 7, var. 1.
Pin de Weymouth. — Pin 10.
Pin maritime (grand). — Pin 2.

Pin Mugho. *Voyez* Pin 1, var. 2.
Pin pignier. — Pin 5.
Pinsot. — Pin 2, var. 1.

Pin suffis. — Pin 1, var. 2.
Pione. — Pivoine.
Pipal. — Figuier 5.
Pishamin. — Laurier 10.
† Pisse sang. — Fumeterre.
Pistache de terre. — Arachide.
Pistachier noir de Virginie. — Hamamélis.
Pistachier. — Térébinthe.
Pistachier (faux). — Staphylé 1.
Pistoloche. — Aristoloche 7.
Pitte. — Agavé 6.
Plane. — Erable 3.
Plantain, Plantanier. — Bananier 1.
Plante à œufs. — Morelle 37, var.
Poherne. — Paturin.
Poireau. — Ail 1.
Poirée. — Bette.
Poirier avocat. — Laurier 7.
Poirier des Antilles. — Técoma 1.
Pois à bouquet — Gesse 19.
† Pois à craquois. — Vessie du Cucubale 2.
Pois à gratter. — Dolic 5.
Pois d'angole. — Cytise 12.
Pois de Congo. — Cytise 12.
Pois de merveille. — Corindé.
Pois de senteur. — Gesse 12.
Pois doux d'Amérique. — Acacie 13.
Pois chiche. — Ciche.
Pois sabre. — Dolic 12.
Pois sucrin. — Acacie 14.
Pois vivace. — Gesse 19.
Poivre d'eau. — Renouée 8.
Poivre de Guinée ou d'Inde. — Piment 1.
Poivre des murs. — Orpin 16.

Poivre sauvage.	*Voyez* Gattilier 1.
Poivrier du Pérou.	— Schinus 1.
Poivrier du Japon.	— Fagarier 2.
Poix.	— Sapin. Us.
Polche.	— Ketmie 3.
Polium.	— Germandrées 5, 11, 12 et 13.
Polytric.	— Doradille 5.
Pomme canelle.	— Corossol 1.
Pomme d'amour.	— Morelle 34.
Pomme de liane.	— Grenadille 5.
Pomme de mai.	— Podophylle.
Pomme de merveille.	— Momordique 1.
Pomme de terre.	— Morelle 33.
Pomme épineuse.	— Stramoine.
Pommette.	— Stramoine 2.
Pommier des Savannes.	— Goyavier,
Pomme pêche.	— Mamei.
Pomme rose.	— Jambosier.
Pompadoure ou pompadoura.	— Calycanthe 1.
Pompoleum.	— Oranger 3.
Poncire.	— Citronier, var. 17.
Porte-chapeau.	— Paliure.
Porte-feuille.	— Rapette.
Porte-suif.	— Gluttier.
Potelée.	— Jusquiame 1.
† Potelet.	— Jacinthe 1.
Potiron..	— Courge 2.
Poudre à vers.	— Armoise 25.
Pouillot.	— Menthe 11.
† Poulieux.	— Thym 3.
Pourpier de mer.	— Arroche 1.
Prune coton.	— Icaquier.
Prunellier.	— Prunier 3.
Ptarmique.	— Achillée 13.
† Pucelage.	— Pervenche.
Puine.	— Cornouiller 5.
Pulicaire.	— Inule 7.

Pulmonaire de chêne.	*Voyez* Lichen 10.
Pulmonaire des Français.	— Epervière 12.
Pulsatille.	— Anémone 3.
Putier.	— Cerisier 7.
Pyracantha.	— Néflier 2.
Pyramidale.	— Campanule 9.
Pyrethre.	— Camomille 3.
Pyrethre des Canaries.	— Chrysanthème 1.

Q.

Quadrète.	— Rhexie.
Quarantain.	— Julienne 9.
Quassi.	— Simarouba.
† Quenneçon.	— Camomille 8.
Queue de cheval.	— Prêle.
Queue de lion.	— Phlomide 5.
Queue de pourceau.	— Peucédan 1.
Queue de rat.	— Myosure.
Queue de renard.	— Fléau 1 et Amaranthe 18.
Queue de souris.	— Cactier 15.
Quinquina aromatique.	— Croton 1.
Quinquina (faux).	— Iva.
Quintefeuille.	— Potentille 17.
Quintefeuille des marais ou rouge.	— Comaret.
Quintefeuille en arbre.	— Potentille 1.

R.

Rabioule.	— Chou 10.
Racine à odeur de rose.	— Rhodiole.
Racine vierge.	— Tame.
Rack (liqueur).	— Riz. Us.
Radiaire.	— Astrance.
Radis.	— Raifort 1.
Ragouminier.	— Cerisier 5.
Raifort (grand).	— Cochléaria 8.
Raiponce.	— Campanule 7.

Raisin d'Amérique	*Voyez*	Phytolacca 1.
Raisin de Corinthe.	—	Vigne, var. 12.
Raisin de renard.	—	Parisette.
Raisin de mer.	—	Ephedra 1.
Raisin d'ours.	—	Arbousier 4.
Raisin noir des bois.	—	Airelle 17.
Raquette.	—	Cactier 18 et suivans.
Ratoncule.	—	Myosure.
Rave.	—	Raifort 1.
Raygrass d'Angleterre.	—	Yvraie 1.
Raygrass de France.	—	Avoine 2.
Récise.	—	Benoîte 1.
Redoul.	—	Fustet.
Réglisse (faux).	—	Abrus.
Réglisse des campagnes.	—	Polypode 1.
Réglisse d'Amérique.	—	Abrus.
Reine des bois.	—	Dianelle.
Reine des prés.	—	Spirée 11.
Reine marguerite.	—	Astère 46.
Renoncule des jardins.	—	Renoncule 10.
Reprise.	—	Orpin 1.
Réséda des jardins.	—	Réséda 10.
Réveil-matin.	—	Euphorbe 39.
Rhamnoïde.	—	Argoussier 1.
Rhapontic.	—	Rhubarbe 1.
Rhubarbe de Chine.	—	Rhubarbe 3.
Rhubarbe de moine.	—	Rhubarbe 1 et Patience 19.
Rhubarbe de Moscovie.	—	Rhubarbe 2 ou 4.
Rhum, rum, (liqueur).	—	Sucre. Us.
Rima.	—	Jacquier 2.
Riz de montagne (faux).	—	Orge 4.
Robinet.	—	Lychnide 4.
Rocambole.	—	Ail 10.
Rondelle.	—	Asaret 1.
Roquette (cultivée).	—	Chou 6.
Roseau à balais.	—	Roseau 3.
Roseau à papier.	—	Souchet 8.
Roseau des étangs.	—	Massette.

Rose changeante de Cayenne. *Voyez* Ketmie 11.
Rose de chien. — Rosier 29.
Rose de la Chine. — Ketmie 5.
Rose de Jéricho. — Jérose.
Rose de mer. — Alcée.
Rose de mer de la Chine. — Alcée 2.
Rose de Noël. — Ellébore 2.
Rose du Japon. — Camelli.
Rose muscade. — Rosier 27.
Rose pione. — Pivoine.
Rose trémière. — Alcée.
Rose unique. — Rosier 17, var. 4.
Rosier capucine. — Rosier 1, var.
Rosier couleur de chair. — Rosier 23.
Rosier cuisse de nymphe. — Rosier 23.
Rosier d'Autriche. — Rosier 1, var.
Rosier de Bordeaux. — Rosier 17, var. 2.
Rosier de Bourgogne. — Rosier 17, var. 3.
Rosier de Champagne. — Rosier 1.
Rosier d'Ecosse. — Rosier 8.
Rosier de Francfort. — Rosier 25.
Rosier de Hollande. — Rosier 17.
Rosier de mai. — Rosier 4.
Rosier de Provins. — Rosier 15.
Rosier du Saint-Sacrement. — Rosier 4.
Rosier églantier. — Rosier 26.
Rosier gros pompon. — Rosier 17, var. 2.
Rosier nain d'Autriche. — Rosier 24.
Rosier ponceau. — Rosier 1, var.
Rosier pompon. — Rosier 17, var. 3.
Rosier sans épine. — Rosier 28.
Rosier sauvage. — Rosier 29.
† Rouche. — Ronce 2.
† Rouge herbe. — Mélampyre 1.
Roure — Chêne 2.
Rouvre des corroyeurs. — Sumac 1.
Rue de chèvre. — Harmale 1, et Galega.
Rue de murailles. — Doradille 9.

Rue des prés. *Voyez* Pigamon 20.
Rue sauvage. — Harmale 1.
Ruta muraria. — Doradille 9.

S.

Sabdariffa. — Ketmie 10.
Sabot de Vénus. — Sabot.
Sabine. — Genèvrier 7.
Safran bâtard. — Carthame 6.
Sain bois — Lauréole 8.
Sainfoin à manne. — Sainfoin 1.
Sainfoin cultivé. — Sainfoin 17.
Sainfoin d'Espagne. — Sainfoin 15.
Saligot. — Macre.
Salsepareille. — Smilace 3.
Salsifix d'Espagne. — Scorzonère 3.
Sandaraque (résine). — Thuya. Us.
Sang de dragon. — Patience 2.
Sang dragon. — Dragonier 1.
† Sanve. — Moutarde 1.
Sapi. — Gluttier.
Sapin à feuilles d'If. — Sapin 1.
Sapin à odeur de baume de Gilead. — Sapin 2.
Sapin commun. — Sapin 1.
Sapinette. — Sapin 3.
Sapotille. — Lucuma.
Sarrète des teinturiers. — Sarrète 1.
Sarrazin. — Renouée 17.
Sassafras. — Laurier 11.
Satin blanc. — Lunaire 2.
Sauge (grande). — Sauge 3.
Sauge (petite). — Sauge 3, var. 3.
Sauge de Catalogne. — Sauge 3, var. 4.
Sauge de Provence. — Sauge 3, var. 4.
Sauge en arbre. — Phlomide 1.
Sauge sauvage. — Germandrée 6.
Saule commun des vanniers. — Saule 30.

Saule de la Louisiane.	*Voyez*	Chêne 13.
Saule parasol.	—	Saule 8.
Saule pleureur ou de Babylone.	—	Saule 8.
† Saux.	—	Saule.
† Saux boquette.	—	Saule 26.
Savonaire.	—	Saponaire.
Saxifrage dorée.	—	Dorine.
Saye. (liqueur)	—	Dolic 15. Us.
Scabioselle.	—	Knautie.
Scammonée d'Alep.	—	Périploque 3.
Scammonée de Syrie.	—	Liseron 3.
Scammonée de Montpellier.	—	Cynanque 2.
Scarole.	—	Chicorée, var. 1.
Sceau de Salomon.	—	Muguet 3, 4 et 5.
Sceau de Notre-Dame.	—	Tame.
Schénanthe.	—	Barbon 7.
Sclarée.	—	Sauge 36.
Scolopendre.	—	Doradille 3.
Scordium.	—	Germandrée 4.
Scorion.	—	Orge 3.
Secher.	—	Cerisier 1.
Securidaca des jardiniers.	—	Coronille 1.
Sedon.	—	Orpin.
Sedon pyramidal.	—	Saxifrage 1.
† Sehu.	—	Sureau 1.
† Sehu sauvage.	—	Sureau 3.
Semen contra.	—	Armoise 25.
Semi double.	—	Renoncule 10.
Séné. (faux)	—	Baguenaudier 1.
Séné bâtard.	—	Coronille 1.
Séné.	—	Casse 12.
Séné des Provençaux.	—	Globulaire 2.
Senéçon d'Afrique.	—	Senéçon 20.
Senéçon arbrisseau,	—	Baccbante 3.
Seneka.	—	Polygale 8.
Senevé.	—	Moutarde.
Sensitive.	—	Acacie 12.
Sensitive paresseuse.	—	Acacie 17.

Seringa. *Voyez* Syringa.
Serpent. — Cactier 14.
Serpentaire. — Gouet 2 et Cactier 15.
Serpolet. — Thym 1.
Séseli d'Ethiopie. — Buplèvre 13.
Séseli de Marseille. — Séseli 3.
Séseli de montagne. — Livêche 4.
Shaddock. — Oranger 3.
Sigaline. — Parkinset.
Sinara. — Ixore 1.
Snowdrop. (Anglais) — Chionanthe 1.
Soldanelle. — Liseron 10.
Soleil. — Hélianthe.
Soleil. (grand) — Hélianthe 1.
Sophia chirurgorum. — Sisymbre 15.
Sorbier des oiseaux. — Sorbier 3.
Sorbier de Suède. — Sorbier 2.
Sorgho. — Houque 1.
Souchet odorant. — Souchet 3.
Souchet rond. — Scirpe 10.
Souci d'Afrique. — Othonne 7.
Souci en arbre. — Othonne 7.
Souci des marais. — Populage.
Soucrion. — Orge 3.
Soufre végétal. — Lycopode.
Soulier de Notre-Dame. — Sabot.
Souvenez vous de moi. — Scorpionne 2.
Soyeuse. — Asclépiade 7.
Spargelle. — Genet 10.
Spatule. — Iris 19.
Spergule. — Spargoutte.
Squine, Esquine. — Smilace 4.
Staphysaigre. — Dauphinelle 7.
Stoechas Citron. — Gnaphale 13.
Storax. — Alibousier 1.
Storax odorant ou liquide. — Liquidambar 1.
Strelitzia. — Bihai.
Succise. — Scabieuse 7.

Succotrin.	*Voyez*	Aloës 4.
Sucre du Canada.	—	Erable 6.
Sucrier de montagne.	—	Gomart 1.
Suron.	—	Terrenoix.
Sycomore de Provence. (faux)	—	Azédarach.
Sycomore. (faux)	—	Erable 2.
Sycomore. (vrai)	—	Figuier 5, autres espèces cultivées.
Sylvie.	—	Anémone 12.

T.

Tabac des Vosges.	—	Arnique 1.
Tabouret.	—	Thlaspi 8.
Tacamahaca.	—	Peuplier 5.
Tafia.	—	Sucre. Us.
Talictron.	—	Pigamon.
Talictron des boutiques.	—	Sisimbre 15.
Talipot de Ceylan.	—	Coryphe.
Taperier.	—	Caprier.
Tartonraire.	—	Lauréole 3.
Tendre à caillou franc.	—	Acacie 31.
† Teraspic.	—	Iberide 1 et 2.
Térébenthine.	—	Pin, Sapin, Mélèze, Térébinthe 2. Us.
Térébenthine de Venise.	—	Mélèze. Us.
Tête de Méduse.	—	Euphorbe 9.
Thé à foulon du Japon.	—	Psoralée 9.
Thé d'Amérique.	—	Capraire 1.
Thé de la mer du Sud.	—	Houx 6.
Thé d'Europe.	—	Véronique 12.
Thé des campagnes.	—	Grémil 1.
Thé des Isles.	—	Capraire 1.
Thé des pauvres de la Chine.	—	Nerprun, vol. 4, page 63.
Thé des Vosges.	—	Lichen 10.
Thé d'Oswégo.	—	Monarde 4.
Thé du Cap.	—	Céanothe 2.
Thé du Labrador.	—	Lédier 2.

Thé du Mexique. *Voyez* Ansérine 11.
Thé du Paraguai — Houx 6.
Thlaspi. — Ibéride 6.
Thym citron. — Thym 1, var. 1.
Thym de Crête. — Sarriète 2.
Thymélée. — Lauréole 2.
Thymélée d'Ethiopie. — Gnidienne 1.
Thymoty des Anglais. — Fléau 1.
Tillau. — Tilleul.
† Tinion. — Froment 12.
Tithymale. — Euphorbe.
Tomate. — Morelle 34.
Topinambour. — Hélianthe 3.
Torchepin. — Pin 1, var. 2.
Tortelle. — Vélar 2.
† Toupiole. — Muguet 3.
Tournesol. — Hélianthe 1 et Croton 3.
Toutebonne. — Sauge 36.
Toutebonne des prés. — Sauge 10.
Toute épice. — Myrthe 5 et Nielle 2.
† Tout venu. — Seneçon 8.
Toxicodendron. — Sumac 8 et 9.
Traînasse ou traîne. — Renouée 13.
Trèfle bitumineux. — Psoralée 8.
Trèfle d'eau. — Ményanthe.
Trèfle hémorrhoïdal. — Lotier 10.
Trèfle jaune. — Trèfle 23 et lotier 12.
Tremble. — Peuplier 2.
Tricolore des jardiniers. — Amaranthe 3.
Trifolium des jardiniers. — Cytise 5.
Trique madame. — Orpin 11.
Troësne d'Egypte. — Lausone 1.
Trolli. — Trolle.
Trompette du jugement. — Stramoine 5.
†Truftier. — Troësne.
Tsubaki. — Camelli.
Tubéreuse bleue. — Crinole 1.
Tue chien, — Colchique 1.

Tue loup. *Voyez* Aconit 1.
Tulipe du Cap. — Hémanthe 1.
Turbith. — Liseron 35.
Turbith bâtard. — Thapsie 1.
Turbith blanc. — Globulaire 2.
Turnep. — Chou 10.

U.

Usnées. — Lichen. SECT. 8.

V.

Vaciet. — Airelle.
Valériane des marais. — Valériane 4.
Valériane des parterres. — Valériane 1.
Valériane Grecque. — Polémoine 1.
† Vaquette. — Gouet 12.
Velvotté. — Linaire 2.
Véraire. — Vérâtre.
Verdure d'hiver. — Pyrole.
Verge à pasteur. — Cardère 3.
Verge de Jacob. — Asphodèle 1.
Verjus. — Vigne var. 15.
Vermiculaire. — Orpin 15 et 16.
Vernis. — Sumac.
Vernis du Japon. — Aylanthe.
Véronique d'eau. — Véronique 20.
Véronique des jardiniers. — Lychnide 2.
Verveine à odeur de citron. — Verveine 12.
Vesseron. — Ers 8.
Vigne blanche. — Bryone 2.
Vigne de Judée. — Morelle 15.
Vigne du Nord. — Houblon.
Vigne vierge. — Vigne 5.
† Vincre. — Pervenche.
Violette de Sibérie. — Violette 18.
Violier. — Giroflée 1.
Violier bulbaux. — Perceneige.

Violier jaune. *Voyez* Giroflée 1.
Viorne à manchettes. — Viorne 7.
Visnague. — Ammi 2.
Vouede. — Pastel.
†Vrogne. — Armoise 9.
†Vroncelle. — Liseron 1.
Vulnéraire. — Anthyllide 2
Vulvaire. — Ansérine 15.

Y.

Yèble. — Sureau 3.
Yeuse. — Chêne vert.
Yeux de bourrique. — Dolio 6.
Ypreau. — Orme 1 et peuplier 1.

Z.

Zénicole à lier. — Saule 29.

Fin de la table des noms synonimes français et des noms vulgaires.

TABLE

TABLE

DES NOMS ANGLAIS

LES PLUS USITÉS.

A.

Abele-Tree.	*Voyez*	Peuplier 1.
Adder's tongue.	—	Ophioglosse.
African Marygold.	—	Tagète.
Agrimony.	—	Aigremoine.
Alder-Tree.	—	Bouleau. Section 2.
Alecoast.	—	Tanaisie 4.
Alexanders.	—	Maceron.
Alkanet.	—	Buglose.
Alligator-Pear.	—	Laurier 7.
Almond-Tree.	—	Amandier.
Amber-Tree.	—	Anthosperme.
Angelica-Tree.	—	Aralie 1.
Apple-Tree.	—	Pommier (cultivé).
Archangel.	—	Lamier.
Ash.	—	Frêne.
Asp.	—	Peuplier 2.
Avens.	—	Benoite.

B.

Balm.	—	Mélisse.

Balsam-tree.	*Voyez*	Clusier.
Barbadoës-cherry.	—	Malpighie.
Berberry.	—	Vinetier.
Barley.	—	Orge.
Barrer-wort.	—	Epimède.
Basil.	—	Basilic.
Bastard-cress.	—	Thlaspi.
Bastard-hare's ear.	—	Phyllis.
Bastard hemp.	—	Cannabine.
Bastard knot-grass.	—	Corrigiole.
Bastard orpine.	—	Andrachné.
Bastard plantain.	—	Bihai.
Batchelor's button.	—	Lychnide 4.
Bay.	—	Laurier.
Bead-tree.	—	Azedarach.
Bean.	—	Fève.
Bean-caper.	—	Fabagelle.
Bear-berry.	—	Arbousier 4.
Bedstraw.	—	Galiet.
Beech-tree.	—	Hêtre.
Beet.	—	Bette.
Bell-flower.	—	Campanule
Bell-pepper.	—	Piment.
Benjamin tree.	—	Laurier 10.
Betony.	—	Bétoine.
Bind weed.	—	Liseron.
Birch-tree.	—	Bouleau.
Bird-cherry.	—	Cerisier 7.
Bird's foot.	—	Ornithope.
Birth-worth.	—	Aristoloche.
Bishop's weed.	—	Ammi.
Bitter-vetch.	—	Orobe.
Bladder-nut.	—	Staphylée.
Bladder-senna.	—	Baguenaudier.
Blood-flower.	—	Hémanthe.
Blue-bottle.	—	Centaurées 39, 40.
Bog-rush.	—	Choin.
Borage.	—	Bourrache.

Borecole. *Voyez* Chou, var. 4
Box. — Buis.
Box thorn. — Lyciet.
Bramble. — Ronce.
Briony. — Brisine.
Broom. — Genet.
Buck-bean. — Ményanthe.
Buckthorn. — Nerprun.
Burnet. — Pimprenelle.
Burnet-saxifrage. — Sanguisorbe.
Butcher's broom. — Fragon.
Butter-wort. — Grassette.
Button-word. — Céphalanthe.

C.

Cabbage. — Chou.
Cabbage-tree. — Arec.
Cattrops. — Herse.
Cammock. — Bugrane.
Camphire-tree. — Camphrier.
Campion. — Cucubale.
Candleberry-myrtle. — Galé.
Candy-tuft. — Ibéride.
Cane. — Roseau 1.
Caper-bush. — Caprier.
Caraway. — Carvi.
Carob-tree. — Caroubier.
Cassioberry-bush. — Viorne 5.
Catchfly. — Silène et Lychnide 3.
Caterpillar. — Chenille.
Catmint. — Chataire.
Cat-thyme. — Germandrée 19.
Cauliflower. — Chou, var. 4.
Celandine. — Chélidoine.
Charlock. — Moutarde.
Chaste-tree. — Gattilier
Cherry-tree. — Cerisier.

Chervil.	*Voyez* Cerfeuil et Myrrhide 1.
Chesnut-tree.	— Châtaignier.
Chick-pea.	— Ciche.
Chick weed.	— Alsine.
Chocolatnut-tree.	— Cacaotier.
Christmas-rose.	— Ellébore 2.
Christ-thorn.	— Paliure.
Chulan.	— Nigrine.
Cicely.	— Cerfeuil.
Cinnamon-tree.	— Laurier 1.
Cinquefoil	— Potentille.
Clary.	— Sauge 36.
Cleavers.	— Galiet 15.
Clove-pink.	— Œillet 6.
Clover.	— Trèfle 7.
Cockle.	— Coquelourde 1.
Cock's comb.	— Célosie.
Cocoa-nut tree.	— Cocotier.
Cocoa-plum tree.	— Icaquier.
Coffee-tree.	— Caffeyer.
Colewort.	— Crambé.
Colt's.	— Tussilage.
Columbine.	— Ancolie.
Comfrey.	— Consoude.
Coral-tree.	— Erythrine.
Cork-tree.	Chêne 15.
Cornelian-cherry.	— Cornouiller 1.
Corn-flag.	— Glayeul.
Corn-marygold.	— Chrysanthème 11.
Cost-mary.	— Tanaisie 4.
Cowslip.	— Primevère 1 et 2.
Crab-tree.	— Pommier 1 et espèces suivantes.
Crane's-bill.	— Géranion.
Cress.	— Passerage 4.
Cross-wort.	— Croisette.
Crow-berry.	— Camarine.
Crow-foot.	— Renoncule.

Cudweed.	*Voyez*	Gnaphale. SECT. 4.
Currant.	—	Groseiller. SECT. 1.
Custard-apple.	—	Corossol.

D.

Daffodit.	—	Narcisse.
Daisy.	—	Paquerette.
Dame's violet.	—	Julienne 1.
Dandelion.	—	Pissenlit et Liondent.
Date-Palm-Tree.	—	Dattier.
Date-Plum.	—	Plaqueminier.
Day-Tily.	—	Hémérocalle.
Deadly Nightshade.	—	Belladone.
Dead-Nettle.	—	Lamier.
Dew-Berry.	—	Ronce 5.
Dill.	—	Anet.
Dittany.	—	Origan 2.
Dock.	—	Patience.
Dodder.	—	Cuscute.
Dog's banc.	—	Apocin.
Dog's grass.	—	Froment 12.
Dog's mercury.	—	Mercuriale 1.
Dog's tooth violet.	—	Dent de chien.
Dog's wood.	—	Cornouiller.
Dragon.	—	Gouet 2 et Draconte.
Dragon-Tree.	—	Dragonier 1.
Dropwort.	—	Spirée 10.
Duck'sfoot.	—	Podophylle.
Dyers-Weed.	—	Réséda 4.

E.

Earth-Nut.	—	Terrenoix.
Egg-Plant.	—	Morelle 37.
Elder-Tree.	—	Sureau.
Ele campane.	—	Inule 1.
Elm-Tree.	—	Orme.

Enchanter's Nightshade. *Voyez* Circée.
Eryngo. — Panicaut.
Evergreen-Thorn. — Néflier 2.
Everlasting. — Gnaphale.
Everlasting-Pea. — Gesse 19.
Eye brigt. — Euphraise.

F.

Feather-Grass. — Stipe 1.
Fennel. — Anet 2.
Fennel-Flower. — Nielle.
Fescue-Grass. — Fétuque.
Fever few. — Matricaire.
Fever-Root — Trioste.
Fiddle-Wood. — Cotelet.
Fig-Marygold. — Ficoïde.
Fig-Tree. — Figuier.
Fig-Wort. — Scrophulaire.
Filbert. — Noisetier.
Fir-Tree. — Sapin.
Flax. — Lin.
Flea-Banc. — Conyze.
Flix-Weed. — Sisimbre.
Flower-de-Luce. — Iris.
Flover-Fence. — Poincillade.
Flowering-Rush. — Butome.
Fox-Glove. — Digitale.
French heneysuckle. — Sainfoin.
French marygold. — Tagete.
Frier's cowl. — Gouet 13.
Fringe-Tree. — Chionanthe.
Frog-bit. — Morrène.
Fumitory. — Fumeterre.
Furze. — Ajonc.
Fustick-wood. — Broussonnet 2.

G.

Garlick.	*Voyez* Ail.
Gigantic-fennel.	— Férule.
Gillyflower.	— Julienne 7, 8, 9, 10.
Ginger.	— Amome.
Globe-amaranth.	— Gomphrène 1.
Globe-flower.	— Trolle.
Globe-thistle.	— Boulette.
Goat's beard.	— Salsifis.
Goat's rue.	— Galéga.
Golden-rod.	— Verge d'or.
Golden-rod tree.	— Bosé.
Golden-thistle.	— Scolyme.
Gold of pleasure.	— Caméline.
Goldy-locks.	— Chrysocome.
Gooseberry.	— Groseiller. SECTION 2.
Goose-foot.	— Ansérine.
Gout-weed.	— Podagraire.
Grape.	— Vigne.
Grass of parnassus.	— Parnassie.
Grass-wetch.	— Gesse.
Gromwell.	— Gremil.
Ground-isy.	— Terrète.
Groundsel.	— Seneçon.
Guava.	— Goyavier.
Guinea hen-weed.	— Pétivier.
Gum-succory.	— Condrille.

H.

Hair-grass.	— Canche.
Hard-grass.	— Egilope.
Hare's ear.	— Buplèvre.
Hart-wort.	— Tordyle.
Hawkweed.	— Epervière.
Hawthorn.	— Néflier.

Hazel nut-tree.	*Voyez* Noisetier.
Heart's ease.	— Violettes 19 et 20.
Heart-seed.	— Corinde.
Heath.	— Bruyère.
Hedge-hyssop.	— Gratiole.
Hedge-mustard.	— Vélar.
Hedge-nettle.	— Galéope.
Hemlock.	— Cigue.
Hemp.	— Chanvre.
Hemp-agrimony.	— Eupatoire.
Henbane.	— Jusquiame.
Herb-bennet.	— Benoite.
Hickery.	— Noyer 2.
Hip-tree.	— Rosier 29.
Hog-plum.	— Monbin.
Hog-weed.	— Boerhaave.
Holly.	— Houx.
Holly-hock.	— Alcée.
Honesty.	— Lunaire.
Horse-wort.	— Berle.
Honey-flower.	— Mélianthe.
Honey-suckle.	— Chèvrefeuille.
Honey-wort.	— Melinet.
Hops.	— Houblon.
Hornbeam-tree.	— Charme.
Horn'd rampion.	— Phyteume.
Horse-chesnut.	— Marronier d'Inde.
Horse-radish.	— Cochlearia.
Horse-shoe vetch.	— Hippocrèpe.
Horse-tait.	— Prêle.
Hound's tongue.	— Cynoglosse.
Houseleek.	— Orpin.

I.

Jaca-tree.	— Jaquier.
Jack in a box.	— Hernandier.
Jamaica-birch-tree.	— Gomart.

Jamaica-pepper.	*Voyez* Myrte 5.
Japan-rose.	— Camelli.
Ice-plant.	— Ficoïde 4.
Jerusalem artichoke.	— Hélianthe 3.
Indian arrow-root.	— Galanga.
Indian corn.	— Maïs.
Indian cress.	— Capucine.
Indian fig.	— Cactier 18 et suivans.
Indian-reed.	— Balisier.
Job's tears.	— Larmille.
Iron-wood.	— Argan.
Iron-wort.	— Crapaudine.
Judas tree.	— Gainier.
Juniper.	— Genèvrier.
Jupiter's beard.	— Anthyllide 5.
Ivy.	— Lierre.

K.

Kidney-bean.	— Haricot.
Kidney-bean-tree.	— Glycine 8.
King's spear.	— Asphodèle.
Knapweed.	— Centaurées 21, 42.
Knawel.	— Gnavelle.
Knot-grass.	— Renouée.

L.

Ladies bedstraw.	— Galiet.
Ladies mantle.	— Alchemille.
Ladies slipper.	— Sabot.
Ladies smock.	— Cresson.
Ladies traces.	— Ophrys 3.
Lamb's lettuce.	— Valériane 11.
Larch-tree.	— Mélèze.
Larkspur.	— Dauphinelle.
Lavender-cotton.	— Santoline.
Lauret.	— Laurier 2 et 6, et cerisier 10, 11, 12.

Laurestine.	*Voyez*	Viorne 1.
Leadwort.	—	Dentelaire.
Leek.	—	Ail 1, Poireau.
Lime-tree.	—	Citronier 1.
Leopard's bane.	—	Doronic.
Lily.	—	Lis et autres plantes de cette famille.
Lily-thorn.	—	Catesbée.
Lion's tail.	—	Phlomide 10.
Liquorice.	—	Réglisse.
Loblolly-bay.	—	Gordone.
Locust-tree.	—	Courbaril.
Logwood.	—	Campèche.
London-pride.	—	Saxifrage 8.
Loose-strife.	—	Salicaire.
Lovage.	—	Livêche.
Love-apple.	—	Morelle 34.
Louse-wort.	—	Pédiculaire.
Lung-wort.	—	Pulmonaire.
Lychnidea.	—	Phlox.
Lyme-grass.	—	Elyme.

M.

Macaw-tree.	—	Cocotier.
Madder.	—	Garance.
Mad-wort.	—	Alysse.
Mahogany-tree.	—	Mahogon.
Maidenhair.	—	Doradille 5 et Capillaire 3
Maindenhair-tree.	—	Gingo.
Maiden-plumb.	—	Comoclade.
Malabar-nut.	—	Carmantine 5.
Mallow.	—	Mauve.
Manchineet-tree.	—	Mancenillier
Mandrake.	—	Mandragore.
Mango-tree.	—	Manguier.
Maple.	—	Erable.
Mare's tail.	—	Pesse.

Marjoram.	*Voyez*	Origan.
Marrowfat.	—	Pois, var.
Marsh-mallow.	—	Guimauve.
Marsh-marygold.	—	Populage.
Marsh-trefoil.	—	Méniante.
Marvet of Perou.	—	Nictage.
Marygold.	—	Souci.
Master-wort.	—	Impératoire.
Mastick-tree.	—	Térébinte 3.
Maudlin.	—	Achillée 2.
May-apple.	—	Podophylle.
May-weed.	—	Camomille 8.
Meadow-grass.	—	Paturin.
Meadow-rue.	—	Pigamon.
Meadow-saffron.	—	Colchique.
Meadow-sweet.	—	Spirée 11.
Medick.	—	Luzerne.
Medlar.	—	Néflier 1.
Mercury.	—	Mercuriale 2 et 3.
Milfoi.	—	Achillée.
Milk-vetch.	—	Astragale.
Milk-wort.	—	Polygale.
Mint.	—	Menthe.
Misseltoe.	—	Gui.
Money-wort.	—	Lysimachie 10.
Monkey-flower.	—	Mimule.
Monk's rhubarb.	—	Patience 19.
Moon-seed.	—	Ménisperme.
Moon-wort	—	Lunaire.
Mother-wort.	—	Agripaume.
Mountain ebony.	—	Bauhine.
Mouse-ear.	—	Epervière 2.
Mouse-tail.	—	Myosure.
Mug-wort.	—	Armoise 16.
Mulberry-tree.	—	Mûrier.
Mullein.	—	Molène.
Mustard.	—	Moutarde.
Myrte.	—	Myrte.

Myrte-leaved-sumach. *Voyez* Fustet.

N.

Navel-wort. — Cotylet.
Nawer. — Chou 9.
Nectarine-tree. — Pêcher, var. 15.
Nettle. — Ortie.
Nettle-tree. — Micocoulier.
New Jersey-tea. — Céanothe 1.
Nicker-tree. — Bonduc.
Nichtshade. — Morelle.
Nipple-wort. — Lampsane.
Nut-tree. — Noisetier.

O.

Oak-tree. — Chêne.
Oat. — Avoine.
Oily-grain. — Sésame.
Oleander. — Laurose.
Oleaster. — Chalef.
Olive. — Olivier.
Onion. — Ail 28.
Orache. — Arroche.
Orange-tree. — Citronier-Oranger.
Orpirie. — Téléphe et Orpin 1 et 3.
Ox-eye. — Buphtalme.
Ox-eye daisy. — Chrysanthème 6.
Oxslip. — Primevère 1, var.

P.

Pæony. — Pivoine.
Pansies. — Violette-pensée.
Papaw-tree. — Papayer.
Parsley. — Persil 1.
Parsley-piert. — Percepier.

Parsnep.	*Voyez*	Panais.
Passion-flower.	—	Grenadille.
Pea.	—	Pois.
Peach-tree.	—	Pêcher.
Pearl-wort.	—	Sagine.
Pear-tree.	—	Poirier.
Pellitory.	—	Pariétaire.
Pellitory of spain.	—	Camomille 3.
Penny-wort.	—	Hydrocotyle.
Pepper.	—	Poivre.
Pepper-wort.	—	Passerage.
Periwinckle.	—	Pervenche.
Peruvian mastick-tree.	—	Schinus.
Petty-whin.	—	Ajonc.
Physic-nut.	—	Médicinier.
Pigeon-pea.	—	Cytise 12.
Piments.	—	Myrte 5.
Pimpernel.	—	Mouron.
Pine-apple.	—	Ananas.
Pine-tree.	—	Pin.
Pink.	—	OEillet.
Pistachia-tree.	—	Térébinte 1.
Plane-tree.	—	Platane.
Plantain-tree.	—	Bananier.
Plum-tree.	—	Prunier.
Poet's casia.	—	Osyris.
Poison-nut.	—	Vomique.
Poison-oak.	—	Sumac 8 et 9.
Pomegranate-tree.	—	Grenadier.
Poplar-tree.	—	Populus.
Poppy.	—	Pavot.
Primrose.	—	Primevère 2, 3, 6,
Privet.	—	Troëne.
Purslane.	—	Pourpier.

Q.

Quaking-grass.	—	Brize.
Quince-tree.	—	Coignassier.

R.

Radish.	*Voyez* Raifort 1, var.
Rag-wort.	— Othonne.
Rampions.	— Campanule 7. Raiponce.
Rape.	— Raifort 1 var.
Raspberry.	— Ronce 1. Framboisier,
Red cedar.	— Genèvrier 6.
Red-wood.	— Nerprun 6.
Reed-grass.	— Roseau.
Reed-mace.	— Massette.
Rest-harrow.	— Bugrane.
Rice.	— Riz.
Rock-rose.	— Ciste.
Rose-bay.	— Laurose.
Rose-campion.	— Coquelourde.
Rosemary.	— Romarin.
Rose-root.	— Rhodiole.
Rupture-wort.	— Herniaire.
Rush.	— Jonc.
Rye.	— Seigle.
Rye-grass.	— Yvraie 1.

S.

Sage.	— Sauge.
St.-John'swort.	— Millepertuis.
Sallow.	— Saule.
Salt-wort.	— Soude et Salicorne.
Samphire.	— Bacille.
Sand-box-tree.	— Sablier.
Sand-wort.	— Sabline.
Sapota.	— Sapotillier.
Sauce-alone.	— Julienne 16.
Savin.	— Genèvrier 7, Sabine.
Savory.	— Sarriette.
Saw-wort.	— Sarrette.

Scorpion-senna. *Voyez* Coronille 1.
Screw-pine. — Baquois.
Scurey-grass. — Cochlearia.
Sea-buckthorn. — Argoussier.
Sea-lavender. — Staticée 4.
Sea-milkwort. — Glaux.
Sea-purslane. — Arroche 1.
Sea-sidegrape. — Raisinier.
Sea-side lauret. — Xylophylle.
Self-heal. — Brunelle.
Senna. — Casse 12, Séné.
Service-tree. — Sorbier.
Shallot. — Ail 22, Échalotte.
Shepherd's needle. — Myrrhide 4.
Shepherd's purse. — Thlaspi 8.
Shrubby horse-tail. — Symphoricarpos.
Shrubby trefoi. — Ptélée.
Sidesaddle-flower. — Sarracénie.
Silk cotton-tree. — Fromager.
Skirret. — Berle 4.
Skull-cap. — Toque.
Sloe-tree. — Prunier 3.
Smallage. — Persil 2.
Smake-gourd. — Anguine.
Snap-dragon. — Linaire 20 et 21.
Snap-tree. — Carmantine 7.
Sneeze-wort. — Achillée 13.
Snow-drop. — Galantine.
Snowdrop-tree. — Halésie.
Soap-berry. — Savonier.
Soap-wort. — Saponaire.
Sorrel. — Patience 22, Oseille.
Sour-sop. — Anone 1.
Southernwood. — Armoise 9.
South-sea-tea. — Houx 6.
Sow-thistle. — Laitron.
Spanish hedge-nettle. — Prasi.
Sparrow-wort. — Passerine.

Speedwell.	*Voyez*	Véronique.
Spider-wort.		Ephémerine et Phalangère 9.
Spignel.	—	Athamanthe.
Spinage.	—	Epinard.
Spindle-tree.	—	Fusain.
Spleen-wort.	—	Doradille.
Spring-grass.	—	Flouve.
Spurge.	—	Euphorbe.
Spurge-olive.	—	Daphné 1.
Spurrey.	—	Spergule.
Stass-tree.	—	Célastre.
Star-apple.	—	Caimitier.
Star of bethleem.	—	Ornithogale.
Star-wort.	—	Astère.
Stichwort.	—	Stellaire.
Stock.	—	Julienne et giroflée.
Stone-crep.	—	Orpin.
Strawberry.	—	Fraisier.
Strawberry-tree.	—	Arbousier.
Succory.	—	Chicorée.
Sugar-cane.	—	Sucre.
Sulphur-wort.	—	Peucedan.
Sund-dew.	—	Rossolis.
Sun-flower.	—	Hélianthe.
Swallow-wort.	—	Asclépiade.
Sweet-brier.	—	Rosier 26.
Sweet-pea.	—	Gesse 12.
Sweet-williams.	—	OEillet 1.
Syrian rue.	—	Harmale.

T.

Tallow-tree.	—	Sapi.
Tamarind-tree.	—	Tamarinier.
Tansey.	—	Tanaisie.
Tarre.	—	Vesce 8 (cultivée).
Tarragon.	—	Armoise 12, Estragon.

Tea.	*Voyez* Thé.
Teak-wood.	— Teck.
Teasel.	— Cardère.
Thistle.	— Chardon.
Thorn-apple.	— Stramoine.
Thrift.	— Staticée.
Throat-wort.	— Trachélie.
Thyme.	— Thym.
Tick-seed.	— Corisperme.
Toad-flax.	— Linaire.
Toothach-tree.	— Clavalier.
Tooth-wort.	— Dentaire.
Tower-mustard.	— Tourette.
Traveller's joy.	— Clématite 9.
Tree-primerose.	— Onagre 1.
Trefoil.	— Trèfle.
True-love.	— Parisette.
Trumpet-flower.	— Bignone, Técoma.
Turmerick.	— Curcuma.
Turnep.	— Chou 10.
Turnsole.	— Héliotrope.
Turpentine-tree.	— Térébinte 2.
Tutsan.	— Millepertuis 4.
Twayblade.	— Ophrys 1.

V.

Venus's fly trap.	— Dionée.
Venus's looking glass.	— Campanule 30.
Venus's navel wort.	— Cynoglosse 6.
Vetch.	— Vesce.
Vine.	— Vigne.
Viper's Bugloss.	— Vipérine.
Viper's grass.	— Scorzonère.
Virginian cowslip.	— Gyroselle.
Virginian gilder-rose.	— Spirée 7.
Virginian silk.	— Périploque 1.
Virgin's bower.	— Clématis.

W.

Wake robin.	*Voyez*	Gouet 12.
Wall-cress.	—	Arabette.
Wall-flower.	—	Giroflée 1.
Wall-penny wort.	—	Cotylet 8.
Wall-rue.	—	Doradille 9.
Walnut-tree.	—	Noyer.
Wart-wort.	—	Euphorbe 39.
Water-caltrops.	—	Macre.
Water-chick weed.	—	Montie.
Water-cress.	—	Cresson.
Water-dropwort.	—	OEnanthe.
Water-hemlock.	—	Cicutaire 1.
Water-hemp agrimony.	—	Bident.
Water-horehound.	—	Lycope.
Water-leaf.	—	Hydrophylle.
Water-lily.	—	Nénuphar.
Water-milfoil.	—	Volant d'eau.
Water-parsinep.	—	Berle.
Water-pepper.	—	Renouée 8.
Water-pimpernel.	—	Samole.
Water-plantain.	—	Plantain d'eau.
Water-violet.	—	Hottone.
Way-faring-tree.	—	Viorne 9
Way-thistle.	—	Chardon 26.
Wheat.	—	Froment.
Whin.	—	Ajonc.
White-beam-tree.	—	Alisier 1.
White hellebore.	—	Vératre.
White hore hound.	—	Marrube.
Whitlow-grass.	—	Drave.
Whortle-berry.	—	Airelle.
Widow-wail.	—	Camélée.
Wild-bugloss.	—	Lycopside.
Wild-liquorice.	—	Abrus.
Wild-service.	—	Alisier 2.

Willow-tree.	*Voyez* Saule.
Willow-herb.	— Salicaire.
Winter-berry.	— Apalachine.
Winter-cherry.	— Coqueret.
Winter-green.	— Pyrole.
Witch-harel.	— Hamamelis.
Woad.	— Pastel.
Wolf's bane.	— Aconit.
Wood-roof.	— Aspérule.
Wood-sage.	— Germandrée 5.
Wood-sorrel.	— Surelle.
Worm-grass.	— Spigélie.
Wormwood.	— Armoise.

Y.

Yam.	— Igname 2.
Yarrow.	— Achillée 19.
Yellow rattle.	— Cocrète.
Yellow-root.	— Hydraste.
Yellow-wort.	— Chlore.
Yew-tree.	— If.

On a supprimé dans cette table plusieurs noms anglais synonimes, ceux qui sont les mêmes que les noms latins, et ceux qui se prononcent comme les français, ou à très-peu de chose près.

Fin de la Table des noms anglais les plus usités.

AUTRES ADDITIONS.

Tome I, pag. 542, et IV, pag. 37. Globbée.

Cette plante se multiplie facilement par ses graines qui naissent dans nos serres. On les sème dans des pots ou des terrines qu'on plonge dans la tannée ou dans une couche chaude. Elles lèvent au bout de trois semaines.

Tome I, pag. 734, et IV, pag. 43. Cotelet.

Cette espèce est, je crois, celle nommée par Ventenat, *cytharexylum pentandrum*.

Tome I, pag. 548. Orquis mâle. *Ajoutez* variété à fleurs blanches.

Tome I, pag. 741. Eranthème bleu. 2. *Pulchellum*. Hort. Lond.

Tige droite, anguleuse, presque sexangulaire, renflée au-dessus des nœuds, glabre et un peu rude au toucher par de petits points élevés. Rameaux opposés. Feuilles opp., pét., ovales-oblongues-lancéolées, acuminées, de 8 à 9 pouces de longueur, et de 3 et demi de largeur, marquées de nervures parallèles et saillantes en-dessous, glabres, un peu rudes, vertes en-dessus, pâles en-dessous, très-entières. Fleurs disposées en épis tétragones, qui terminent la tige et les rameaux. L'épi terminal souvent accompagné de deux autres axillaires.

Les épis sont entièrement couverts de bractées de la même forme en petit que les feuilles, à nervures aussi parallèles, dont les intervalles sont tachetés de blanc. Une seule fleur sort du sein de chaque bractée; elle est infundibuliforme, à tube grêle, long d'un pouce un peu courbé. Le limbe d'un beau bleu a 10 lignes environ de diamètre; il est divisé en 5 parties arrondies et régulières. Deux étamines portent chacune une anthère jaunâtre. Le stigmate est bifide. Chaque épi est composé d'environ 24 fleurs et d'autant de bractées embriquées, joliment variées de blanc.

Lieu.... ♄ Toujours vert. fl. en janvier et février.

Cult. Serre chaude—tannée. Terre substantielle, consistante. Mult. par boutures faites en pot dans la tannée, avec les jeunes pousses après que la plante a fleuri. Elles prennent aisément racine.

Cette plante est fort agréable à la vue dans le tems de ses fleurs qui paroissent dans une saison où elles sont rares.

Tome II, pag. 70. Mélisse globulaire.

Fleurs petites, blanches, ramassées en têtes globuleuses, portées sur des pédoncules assez longs et axillaires.

Tome II, pag. 283.

Les bruyères se multiplient aussi de boutures; c'est même le seul moyen que les jardiniers anglais emploient. On les fait en terrines remplies de terreau léger de bruyère, très-courtes, dans le tems de la pousse, sous cloches ombragées et plongées dans une couche de chaleur modérée, ou mieux dans la tannée de serre chaude.

Tome III, pag. 22. Géranion 75, et tome IV, pag. 58.

Fleurs moyennes blanches; les deux pétales supérieurs marqués à leur base d'une petite tache rameuse, d'un pourpre léger; les trois inférieurs très-étroits, linéaires, lavés à leur base de la même couleur; la base de la colonne des étamines, d'un beau pourpre, réunies au nombre de 9 à 12 en têtes pédonculées et ombellées. Les pédoncules communs et les particuliers, ainsi que les calices abondamment garnis de poils doux et blancs.

Tome III, pag. 618. *Aucuba.*

Fleurs petites, d'un brun-rouge, pédonculées, disposées en petits bouquets presque ombellés, terminaux et accompagnés de bractées caduques.

Cette plante est bien véritablement d'orangerie. Elle paroît même assez rustique pour passer en pleine terre, et y supporter nos hivers ordinaires sans couverture. On la multiplie aussi de bouture.

Tome IV, pag. 32. Gouet à feuilles de balisier.

Cette plante qui m'a été envoyée sous le nom d'*arum*, n'est rien moins qu'une espèce de ce genre. Ne l'ayant vue, lorsque je l'ai décrite, qu'en feuilles, et sa manière de pousser ayant beaucoup de rapports à celle des gouets, j'ai cru que ce pouvoit

être l'*arum cannæfolium* de Linné; mais pendant le cours de l'impression des tables de cet ouvrage, cette plante a fleuri dans ma serre, et ce n'a pas été sans surprise que j'ai reconnu mon erreur.

Elle est de l'ordre des balisiers de Jussieu, et de la monandrie monogynie de Linné.

Ses fleurs paroissent avant la sortie des feuilles qui les entourent ensuite. Elles sont nombreuses, toutes radicales, sessiles, et chacune enfermée d'abord dans un spathe lavé de rouge. Calice double, ou à 6 divisions; l'extérieur a trois languettes minces, très-étroites, blanches, dont les bords sont roulés en dedans, et un peu plus longues que le calice intérieur; celui-ci labié, à trois divisions; les deux supérieures ovales, blanches, concaves, droites, de 27 lignes de longueur et 10 de largeur; l'inférieure de la même longueur, profondément bifide, pourpre et rayée de cette même couleur des deux côtés de sa base; chaque partie a 11 lignes de largeur, et est arrondie à son sommet. Le filament est en forme de spatule pétaliforme, bifide, lavé de pourpre avec deux pointes latérales; il est appuyé contre le rapprochement des deux divisions supérieures; il porte une anthère géminée, et renferme dans sa partie moyenne un style simple avec un stigmate arrondi.

La forme et le caractère de ces fleurs, leur consistance mince, leur durée d'environ 24 heures, et leur situation radicale ne me laissent aucun doute que cette plante ne soit une espèce du genre *kæmpferia*, et je la rapporterois au *kæmpferia rotunda*, si ses feuilles étoient moins grandes. On pourroit la nommer *kæmpferia longa*.

Lieu.... ♃ fl. en mai.

Cult. La même que celle du *kæmpferia galanga* et la même multiplication.

Voyez, pour le port et les feuilles, l'article, gouet à feuilles de balisier.

Fin du quatrième et dernier Tome.

H. L. PERRONNEAU, IMPRIMEUR, RUE DU BATTOIR, N°. 8.

FAUTES A CORRIGER.

TOME QUATRIÈME.

Page	14, ligne	dernière ne doit; *lisez* ne dût.
	28, l.	12 enceloides; *lisez* encelioides.
	39, l.	3 (transposition); *lisez* la ligne 7 immédiatement après la ligne 2, et ensuite les lignes 5 et 6.
	152, l.	dernière III. 715; *lisez* III. 695.
	258, l.	8 eav.; *lisez* ear.
	261, l.	4 Daffodit.; *lisez* Daffodil.
	id, l.	10 Tily.; *lisez* Lily.
	id, l.	18 banc.; *lisez* bane.
	262, l.	6 brigt.; *lisez* bright.
	id, l.	20 Banc.; *lisez* Bane.
	id, l.	26 heneysuckle.; *lisez* honeysuckle.
	263, l.	22 isy.; *lisez* ivy.
	264, l.	30 tait.; *lisez* tail.
	265, l.	dernière Lauret.; *lisez* Laurel.
	267, l.	6 Marvet; *lisez* Marvel.
	id, l.	20 Milfoi.; *lisez* Milfoil.
	268, l.	3 Nawer.; *lisez* Nawew.
	id, l.	21 Orpirie.; *lisez* Orpine.
	269, l.	17 Piments.; *lisez* Pimento.
	271, l.	3 Scurey; *lisez* Scurvey.
	id, l.	9 lauret.; *lisez* laurel.
	id, l.	17 trefoi.; *lisez* trefoil.
	id, l.	24 Smake; *lisez* Snake.
	272, l.	11 Stass; *lisez* Staff.
	274, l.	18 parsinep.; *lisez* parsnep.

3 2044 102 884 798

3 2044 102 884 798